THỰC PHẨM BẢO VỀ SỰC KHỎE **GMP** FlexoMAX® ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỂ XA TẦM TAY TRỂ EM. THÀNH PHẦN CẤU TẠO: Viên số 1 (01 viên nang cứng) chứa:

(tương ứng khoảng 30 mg)

Acid hyaluronic ......3,3 mg

Phụ liệu: Ethylcellulose, Cellulose vi tinh thể, Magnesi stearat vừa đủ một viên.

Viên số 2 (01 viên nang cứng) chứa:

Salix alba extract (chiết xuất vỏ cây liễu trắng) (white willow bark extract) ...... 125 mg

Zingiber officinale extract (chiết xuất gừng) ......85 mg

Boswellia serrata extract gum

(chiết xuất cây nhũ hương)......75 mg Turmeric extract (chiết xuất nghệ) ......50 mg

Phụ liệu: Magnesi stearat, Colloidal anhydrous silica vừa đủ một viên.

Viên số 3 (01 viên nén bao phim) chứa: Glucosamin ......125 mg Natri chondroitin sulfat ......100 mg

Methyl Sulfonyl Methan ......25 mg Phụ liệu: Cellulose vi tinh thể, Copovidon, Croscarmellose natri, Magnesi stearat, Colloidal anhydrous silica, Sepifilm LP 770 vừa đủ một viên.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Vỉ 12 viên, gồm: 4 viên số 1, 4 viên số 2, 4 viên số 3. Hộp 3 vỉ. CÔNG DUNG: Giúp tăng sinh dịch khớp, hỗ trợ làm giảm đau do khô khớp, viêm khớp. Giúp làm chậm quá trình thoái hóa khớp.

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. ĐỐI TƯƠNG SỬ DUNG: Người bị thoái hóa khớp (gối, háng, tay, vai); đau khớp do khô

khớp, viêm khớp. LIỀU DÙNG: Người lớn: ngày uống 2 lần (sáng - chiều), mỗi lần uống gồm 3 viên: 1 viên số 1, 1 viên số 2, 1 viên số 3. Ưống sau bữa ăn, uống với nhiều nước.

CẢNH BÁO VỀ SỰC KHỎE: Không nên dùng sản phẩm cho người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú, người có tiền sử dị ứng với aspirin và các

sulfonamide.

- Không sử dụng nếu mẫn cảm với một trong các thành phần của

sản phẩm.

HAN SỬ DUNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Han sử dụng in trên bao bì. BẢO QUẢN: Không quá 30°C, tránh ẩm và ánh sáng.

Cơ sở sản xuất và chịu trách nhiệm về hàng hoá: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỚC PHẨM IMEXPHARM Số 04, Đường 30/4, Phường 1, TP Cao Lãnh, IMEXPHARM Tỉnh Đồng Tháp Hotline: 1800 555 535

E-mail: imp@imexpharm.com

TTP0035-2

TTP0035-2