I LICEUM OGLNOKSZTAŶCĄCE IM. EDWARDA DEMBOWSKIEGO W GLIWICACH

Grzegorz Koperwas

Badanie przebiegu zmienouci funkcji

$$f(x) = x^4 - 6x^2 + 8x + 24$$

Gliwce

1. Analiza wzoru funkcji

Dana jest funkcja:

$$f(x) = x^4 - 6x^2 + 8x + 24$$

Funkcja jest wielomianem wiĬc dziedzna jest zbiorem liczb rzeczywistych:

$$D_f = \mathbb{R}$$

1.1. Miejsca zerowe:

Miejscem zerowym danej funkcji jest -2.

1.2. Przeci \check{I} cie z osią OY

$$f(0) = 0^4 - 6 \cdot 0^2 + 8 \cdot 0 + 24 = 24$$

Funkcja przecina où 0Y w punkcie (0; 24).

1.3. Granice na krańcach dziedziny

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = \lim_{x \to -\infty} \underbrace{x^4}_{\to +\infty} \cdot \left(1 - \underbrace{\frac{6}{x^2} + \frac{8}{x^3} + \frac{24}{x^4}}_{\to 0} \right) =$$

$$= +\infty$$

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} \underbrace{x^4}_{\to +\infty} \cdot \left(1 - \underbrace{\frac{6}{x^2} + \frac{8}{x^3} + \frac{24}{x^4}}_{\to 0} \right) =$$

$$= +\infty$$

Funkcja nie posiada asymptot.

2. Analiza pierwszej pochodnej

Obliczamy pierwszą pochodną:

$$f'(x) = 4x^3 - 12x + 8$$