DRUGPH — CLINICAL FORMULARY VERIFICATION DOSSIER

เอกสารตรวจรับรองความถูกต้องของสูตรคำนวณและขนาดยาทางคลินิก (Clinical Verification Protocol)

Software as a Medical Device (SaMD) Level II Clinical Evaluation Dossier

1. วัตถุประสงค์และระเบียบปฏิบัติ (Purpose & Scope)

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เภสัชกรคลินิก (Clinical Pharmacist) และอาจารย์แพทย์ผู้เชียวชาญ (Attending Physician / Faculty) ตรวจสอบความถูกต้องของสูตรคำนวณ โดสยามาตรฐาน และเกณฑ์การปรับขนาดยาตามระดับไต (CrCl) ในระบบ Drugph ทุกรายการ ตามกฎเหล็กข้อที่ 2 (Strict Evidence-Based Medicine) และข้อที่ 1 (Zero-Error Calculation Policy) ก่อนนำระบบไปใช้งานจริงข้างเตียงผู้ป่วย (Bedside Clinical Decision Support)

2. ตำรามาตรฐานทางการแพทย์และเภสัชกรรมที่ใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง (Approved Textbooks)

1. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy (54th Edition, 2024) — ยาต้านจุลชีพและการปรับตามไต
2. Lexicomp Drug Information / UpToDate 2024 — ฐานข้อมูลขนาดยาและปฏิกิริยาระหว่างยามาตรฐานสากล
3. คู่มือการปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไต โดย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (The Nephrology Society of Thailand)
4. แนวทางการรักษาโรคติดเชื้อในประเทศไทย โดย สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย (IDAT Guidelines)
5. บัญชียาหลักแห่งชาติ (NLEM) และคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Thailand โดย อย.)
6. คู่มือการบริหารยาฉีดสำหรับพยาบาลและเภสัชกร (โรงพยาบาลรามาธิบดี และ โรงพยาบาลศิริราช)
7. DiPiro's Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach & Goodman & Gilman's

3. ข้อมูลสรุปทางสถิติ (Formulary Summary)

จำนวนยาทั้งหมดในระบบ	จำนวนสูตรยา (Regimens)	ยาที่มี Monograph รับรองแล้ว	สถานะการตรวจ
117 รายการ	184 สูตร	8 รายการ	**รอลงนามรับรอง (UNVERIFIED)**

⛒ **คำชี้แจงสำหรับผู้ตรวจ:** หากพบว่าตัวเลขโดสยา, หน่วยยา, หรือช่วง CrCl ในเอกสารนี้ ไม่ตรงกับตำรามาตรฐานฉบับปัจจุบัน กรุณาขีดฆ่าและระบุตัวเลขที่ถูกต้องพร้อมเขียนชื่อตำรา หน้า และปีพิมพ์ในช่องหมายเหตุ
ห้ามอนุมัติรายการยาที่ไม่มีหลักฐานทางคลินิกรองรับอย่างชัดเจนเด็ดขาด

Vancomycin (แวนโคมัยซิน)

HIGH-ALERT | TDM | RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2024 / สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

Status: VERIFIED

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Systemic Infection (Adult) [Intravenous Infusion]	15.0 mg/kg q12h	Max: 2000.0 mg	CrCl 50-90: x1.0 q12-24h CrCl 20-50: x1.0 q24h CrCl 10-20: x1.0 q48-72h CrCl 0-10: x1.0 TDM-guided pulse redosing

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Gentamicin (เจนตามัยซิน)

HIGH-ALERT | TDM | RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2024 / Hartford Nomogram

Status: VERIFIED

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Extended Interval Dosing [Intravenous Infusion]	5.0 mg/kg q24h	Max: 700.0 mg	CrCl 40-60: x1.0 q36h CrCl 20-40: x1.0 q48h CrCl 0-20: x1.0
Traditional Dosing [Intravenous Infusion]	1.5 mg/kg q8h	Max: 300.0 mg	CrCl 40-60: x1.0 q12h CrCl 20-40: x1.0 q24h CrCl 0-20: x1.0

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Amikacin (อะมิคาซิน)

TDM | RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Extended Interval Dosing [Intravenous Infusion]	15.0 mg/kg q24h	Max: 1500.0 mg	CrCl 40-60: x1.0 q36h CrCl 20-40: x1.0 q48h CrCl 0-20: x0.5

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Meropenem (เมโรพีเนม)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2024 / Merrem FDA Prescribing Information

Status: VERIFIED

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Severe Infection [Intravenous Infusion]	1000.0 mg q8h	Max: 2000.0 mg	CrCl 26-50: x1.0 q12h CrCl 10-26: x0.5 q12h CrCl 0-10: x0.5 q24h
Meningitis [Intravenous Infusion]	2000.0 mg q8h	Max: 2000.0 mg	CrCl 26-50: x1.0 q12h CrCl 10-26: x0.5 q12h CrCl 0-10: x0.5 q24h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Ceftriaxone (เซฟไตรอะโซน)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2024 / IDAT Thailand Guidelines

Status: VERIFIED

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Severe Infection (Adult) [Intravenous Infusion]	2000.0 mg q24h	Daily: 4000.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Meningitis (Pediatric) [Intravenous Infusion]	100.0 mg/kg q24h	Daily: 4000.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Standard Infection (Pediatric) [Intravenous Infusion]	50.0 mg/kg q24h	Daily: 2000.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Amoxicillin/Clavulanate (ออม็อกซิลลิน/คลาวูลานิก แอซิด)

RENAL-ADJ | HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Standard Infection (Adult) [Oral]	1000.0 mg q12h	Max: 2000.0 mg	CrCl 10-30: x0.5 q12h CrCl 0-10: x0.5 q24h
Standard Infection (Pediatric) [Oral]	22.5 mg/kg q12h	Daily: 4000.0 mg	CrCl 10-30: x0.67 q12h CrCl 0-10: x0.67 q24h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Azithromycin (อะซิโธรมัยซิน)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Atypical Pneumonia (Adult) [Oral]	500.0 mg q24h	Max: 500.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Otitis Media / Pneumonia (Pediatric) [Oral]	10.0 mg/kg q24h	Max: 500.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Ciprofloxacin (ซิโปรฟลอกซาซิน)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
UTI / Systemic Infection (Adult) [Oral]	500.0 mg q12h	Daily: 1500.0 mg	CrCl 0-30: x0.5
Severe Infection (Adult IV) [Intravenous Infusion]	400.0 mg q12h	Daily: 1200.0 mg	CrCl 0-30: x1.0 q24h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Levofloxacin (ลีโวฟลอกซาซิน)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Pneumonia / UTI (Adult) [Oral]	500.0 mg q24h	Daily: 750.0 mg	CrCl 20-50: x0.5 CrCl 0-20: x0.5 q48h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Clindamycin (คลินดามัยซิน)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Skin / Soft Tissue Infection (Adult) [Oral]	300.0 mg q6-8h	Daily: 1800.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Infection (Pediatric) [Oral]	15.0 mg/kg Divided q6-8h	Daily: 1800.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Metronidazole (เมโทรนิดาโซล)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Anaerobic Infection / Trichomoniasis (Adult) [Oral]	400.0 mg q8h	Daily: 4000.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Severe Anaerobic Infection (Adult IV) [Intravenous Infusion]	500.0 mg q8h	Daily: 4000.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Cefazolin (เซฟาโซลิน)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Surgical Prophylaxis (Adult) [Intravenous Push]	2000.0 mg Stat	Max: 3000.0 mg	CrCl 0-35: x1.0
Systemic Infection (Adult) [Intravenous Push]	1000.0 mg q8h	Daily: 6000.0 mg	CrCl 11-35: x0.5 q12h CrCl 0-11: x0.5 q24h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Piperacillin/Tazobactam (ไพเพอราซิลลิน/ทาโซแบคแตม)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Severe infections [Intravenous Infusion]	4.5 g q6h	Daily: 18.0 g	CrCl 20-40: x0.75 q6h CrCl 0-20: x0.5 q6h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Cefepime (เซฟีปีม)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Pseudomonas / Febrile neutropenia [Intravenous]	2.0 g q8h	Daily: 6.0 g	CrCl 30-60: x1.0 q12h CrCl 11-30: x1.0 q24h CrCl 0-11: x0.5 q24h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Linezolid (ลีเนโซลิด)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
MRSA / VRE infections [Oral]	600.0 mg q12h	Daily: 1200.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Doxycycline (ด็อกซีไซคลิน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Scrub typhus / Atypical pneumonia [Oral]	100.0 mg q12h	Daily: 200.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Colistin (Colistimethate Sodium) (โคลิสติน)

HIGH-ALERT | RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Severe MDR Infection (Loading Dose) [Intravenous Infusion]	5.0 mg/kg Stat	Max: 300.0 mg	CrCl 0-50: x1.0
Severe MDR Infection (Maintenance) [Intravenous Infusion]	150.0 mg q12h	Daily: 300.0 mg	CrCl 30-50: x1.0 q12h CrCl 10-30: x1.0 q24h CrCl 0-10: x1.0 q24h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Acyclovir (อะไซโคลเวียร์ (แบบฉีด))

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Herpes Simplex Encephalitis [Intravenous Infusion]	10.0 mg/kg q8h	Max: 800.0 mg	CrCl 25-50: x1.0 q12h CrCl 10-25: x1.0 q24h CrCl 0-10: x1.0 q24h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Fluconazole (ฟลูโคนาโซล)

RENAL-ADJ | HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Candidiasis (Systemic) [Oral]	400.0 mg q24h	Daily: 800.0 mg	CrCl 0-50: x0.5

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Ceftazidime (เซฟตาซิดีม)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Severe Infection / Pseudomonas [Intravenous Infusion]	2000.0 mg q8h	Daily: 6000.0 mg	CrCl 30-50: x1.0 q12h CrCl 16-30: x1.0 q24h CrCl 6-16: x1.0 q24h CrCl 0-6: x1.0 q48h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Rifampin (Rifampicin) (ไรแฟมพิน (ยารักษาวัณโรค))

HIGH-ALERT | HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Tuberculosis Treatment [Oral]	10.0 mg/kg q24h	Max: 600.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Isoniazid (INH) (ไอโซไนอาซิด (ยารักษาวัณโรค))

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Tuberculosis Treatment [Oral]	5.0 mg/kg q24h	Max: 300.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Pyrazinamide (PZA) (ไพราซินาไมด์ (ยารักษาวัณโรค))

RENAL-ADJ | HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Tuberculosis Treatment [Oral]	25.0 mg/kg q24h	Daily: 2000.0 mg	CrCl 0-30: x1.0 3 times/week

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Ethambutol (EMB) (อีแทมบูทอล (ยารักษาวัณโรค))

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Tuberculosis Treatment [Oral]	15.0 mg/kg q24h	Daily: 1600.0 mg	CrCl 0-30: x1.0 3 times/week

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Carboplatin (คาร์โบพลาติน)

HIGH-ALERT | RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Ovarian Cancer / Solid Tumors [Intravenous Infusion]	GFR-Based (Calvert)	Max: 900.0 mg	ปรับตามดุลยพินิจ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Methotrexate (เมโธเทรกเซต)

HIGH-ALERT | RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
High-Dose Oncology [Intravenous Infusion]	BSA-Based	-	CrCl 20-50: x0.5 CrCl 0-20: x1.0
Rheumatoid Arthritis [Oral]	7.5 mg Weekly	Max: 30.0 mg	CrCl 20-50: x0.5 CrCl 0-20: x1.0

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Norepinephrine (นอร์เอพิเนฟริน)

HIGH-ALERT

แหล่งอ้างอิง: Surviving Sepsis Campaign Guidelines 2021 / คู่มือยาฉีดความเสี่ยงสูง รพ.รามาธิบดี

Status: VERIFIED

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Septic Shock / Hypotension [Intravenous Infusion]	0.01-3.0 mcg/kg/min	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Dopamine (โดปามีน)

HIGH-ALERT

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hemodynamic Support [Intravenous Infusion]	2.0-20.0 mcg/kg/min	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Amiodarone (อะมิโอดาโรน)

HIGH-ALERT

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Ventricular Arrhythmias (Stable) [Intravenous Infusion]	150.0 mg Once	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Amlodipine (แอมโลดิปีน)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hypertension (Adult) [Oral]	5.0 mg q24h	Max: 10.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Enalapril (อีนาลาพริล)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hypertension / Heart Failure (Adult) [Oral]	5.0 mg q24h	Daily: 40.0 mg	CrCl 0-30: x0.5

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Furosemide (ฟูโรซีไมด์)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Edema / Heart Failure (Adult) [Oral]	40.0 mg q24h	Max: 160.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Acute Pulmonary Edema (Adult) [Intravenous Push]	40.0 mg Stat	Max: 200.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Edema (Pediatric) [Oral]	1.0 mg/kg q12-24h	Max: 40.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Edema (Pediatric IV) [Intravenous Push]	1.0 mg/kg q12-24h	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Adenosine (อะดีโนซีน)

HIGH-ALERT

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
SVT (Adult) [Intravenous Push]	6.0 mg Stat	Max: 12.0 mg	ไม่ต้องปรับ
SVT (Pediatric) [Intravenous Push]	0.1 mg/kg Stat	Max: 6.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Digoxin (ไดจอกซิน)

HIGH-ALERT | TDM | RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Heart Failure / AFib (Adult Maintenance) [Oral]	0.25 mg q24h	Daily: 0.5 mg	CrCl 10-50: x0.5 CrCl 0-10: x0.25

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Nicardipine (นิคาร์ดิปีน)

HIGH-ALERT | HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hypertensive Emergency (Adult) [Intravenous Infusion]	5.0-15.0 mg/hr	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Spironolactone (สไปโรโนแลคโตน)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Heart Failure [Oral]	25.0 mg q24h	Daily: 50.0 mg	CrCl 30-50: x0.5 q48h CrCl 0-30: x1.0
Edema / Ascites [Oral]	100.0 mg OD to BID	Daily: 400.0 mg	CrCl 30-50: x0.5 q48h CrCl 0-30: x1.0

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Losartan (ลอซาร์แทน)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hypertension [Oral]	50.0 mg OD to BID	Daily: 100.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Metoprolol (เมโทโพรลอล)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hypertension / Angina [Oral]	50.0 mg q12h	Daily: 200.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Clopidogrel (โคลพิโดเกรล)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
ACS (Maintenance) [Oral]	75.0 mg q24h	-	ไม่ต้องปรับ
ACS (Loading) [Oral]	300.0 mg Once	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Rosuvastatin (โรซูวาสแตติน)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hyperlipidemia [Oral]	20.0 mg q24h	Daily: 40.0 mg	CrCl 0-30: x0.25

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Simvastatin (ซิมวาสแตติน)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hyperlipidemia [Oral]	20.0 mg q24h	Daily: 40.0 mg	CrCl 0-30: x0.25

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Paracetamol (Acetaminophen) (พาราเซตามอล)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: Lexicomp Drug Information / บัญชียาหลักแห่งชาติ & คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Thailand)

Status: VERIFIED

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Fever/Pain (Adult) [Oral]	500.0 mg q4-6h PRN	Max: 1000.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Fever/Pain (Pediatric) [Oral]	10.0 mg/kg q4-6h PRN	Max: 750.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Fever/Pain (Adult IV) [Intravenous Infusion]	1000.0 mg q6h PRN	Max: 1000.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Ibuprofen (ไอบูโพรเฟน)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: Lexicomp Drug Information 2024 / RDU Thailand Guidelines

Status: VERIFIED

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Mild to Moderate Pain (Adult) [Oral]	400.0 mg q6-8h PRN	Max: 800.0 mg	CrCl 0-30: x1.0
Fever/Pain (Pediatric >6 months) [Oral]	10.0 mg/kg q6-8h PRN	Max: 400.0 mg	CrCl 0-30: x1.0

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Naproxen (นาพรอกเซน)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Pain / Inflammation [Oral]	250.0 mg q12h	Max: 500.0 mg	CrCl 0-30: x1.0

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Tramadol (ทรามาดอล)

HIGH-ALERT | RENAL-ADJ | HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Moderate to Severe Pain (Adult) [Oral]	50.0 mg q6h PRN	Max: 100.0 mg	CrCl 0-30: x1.0 q12h
Moderate to Severe Pain (Adult IV) [Intravenous]	50.0 mg q6h PRN	Max: 100.0 mg	CrCl 0-30: x1.0 q12h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Morphine (มอร์ฟีน)

HIGH-ALERT | RENAL-ADJ | HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: Lexicomp Drug Information 2024 / สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายไทย & รพ.รามาธิบดี

Status: VERIFIED

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Severe Pain (Adult) [Intravenous Push]	2.0 mg q5-15min PRN	-	CrCl 10-50: x0.75 CrCl 0-10: x0.5
Severe Pain (Pediatric) [Intravenous Push]	0.05 mg/kg q2-4h PRN	Max: 5.0 mg	CrCl 10-50: x0.75 CrCl 0-10: x0.5

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Fentanyl (เฟนทานิล)

HIGH-ALERT | HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Analgesia / Procedural Sedation (Adult) [Intravenous Push]	50.0 mcg q15-30min PRN	-	ไม่ต้องปรับ
Continuous Sedation/Analgesia (ICU) [Intravenous Infusion]	1.0-2.0 mcg/kg/hr	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Omeprazole (โอเมพราโซล)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
GERD / Peptic Ulcer Disease (Adult) [Oral]	20.0 mg q24h	Daily: 80.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Bleeding Peptic Ulcer (Adult) [Intravenous Push]	80.0 mg Stat	-	ไม่ต้องปรับ
GERD (Pediatric > 1 year) [Oral]	1.0 mg/kg q24h	Daily: 40.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Metoclopramide (เมโทโคลพราไมด์)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Nausea/Vomiting (Adult) [Oral]	10.0 mg q8h PRN	Max: 15.0 mg	CrCl 0-40: x0.5
Nausea/Vomiting (Adult IV) [Intravenous Push]	10.0 mg q8h PRN	Daily: 40.0 mg	CrCl 0-40: x0.5

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Domperidone (ดอมเพอริโดน)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Nausea/Vomiting (Adult & Adolescents >35kg) [Oral]	10.0 mg q8h PRN	Daily: 30.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Nausea/Vomiting (Pediatric <35kg) [Oral]	0.25 mg/kg q8h PRN	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Ondansetron (ออนแดนเซทรอน)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
CINV / PONV (Adult) [Intravenous Push]	8.0 mg q8h PRN	Max: 16.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Nausea/Vomiting (Pediatric) [Intravenous Push]	0.15 mg/kg q8h PRN	Max: 8.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Hyoscine Butylbromide (ไฮออสซีน / บัสโคพาน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
GI Spasm / Cramping (Adult) [Oral]	10.0 mg q6-8h	Max: 20.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Acute GI/GU Spasm (Adult) [Intravenous Push]	20.0 mg q30min PRN	Max: 20.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Salbutamol (Albuterol) (ซัลบูทามอล)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Asthma / COPD Exacerbation (Adult) [Inhalation]	2.5 mg q20min x3 then q1-4h PRN	Max: 5.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Asthma / Wheezing (Pediatric < 20kg) [Inhalation]	0.15 mg/kg q20min x3 then q1-4h PRN	Max: 2.5 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Chlorpheniramine (CPM) (คลอร์เฟนิรามีน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Allergic Rhinitis (Adult) [Oral]	4.0 mg q4-6h PRN	Daily: 24.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Allergic Rhinitis (Pediatric 6-12 yrs) [Oral]	2.0 mg q4-6h PRN	Daily: 12.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Anaphylaxis / Severe Allergy (Adult IV) [Intravenous Push]	10.0 mg Stat	Max: 20.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Cetirizine (เซทิริซีน)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Allergic Rhinitis / Urticaria (Adult) [Oral]	10.0 mg q24h	Daily: 10.0 mg	CrCl 10-30: x0.5 CrCl 0-10: x0.5

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Ipratropium Bromide (อิพราโทรเปียม)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
COPD / Asthma Exacerbation (Adult) [Inhalation]	0.5 mg q20min x3 then q4-6h PRN	-	ไม่ต้องปรับ
Wheezing (Pediatric) [Inhalation]	0.25 mg q20min x3 then q4-6h PRN	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Budesonide (Nebulizer) (บูเดโซไนด์ (พ่น))

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Asthma Maintenance (Adult) [Inhalation]	0.5 mg q12h	Daily: 2.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Croup (Pediatric) [Inhalation]	2.0 mg Once	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Prednisolone (เพรดนิโซโลน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Asthma Exacerbation (Adult) [Oral]	40.0 mg q24h	Daily: 60.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Asthma Exacerbation (Pediatric) [Oral]	1.0 mg/kg q24h	Daily: 60.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Loratadine (ลอราทาดีน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Allergic Rhinitis / Urticaria (Adult) [Oral]	10.0 mg q24h	Daily: 10.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Allergic Rhinitis (Pediatric 2-12 yr) [Oral]	5.0 mg q24h	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Fexofenadine (เฟกโซเฟนาดีน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Allergic Rhinitis / Urticaria (Adult) [Oral]	180.0 mg q24h	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Montelukast (มอนเทลูคาสต์)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Asthma Maintenance (Adult) [Oral]	10.0 mg q24h (OD at bedtime)	-	ไม่ต้องปรับ
Asthma Maintenance (Pediatric 6-14 yr) [Oral]	5.0 mg q24h (OD at bedtime)	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

N-Acetylcysteine (NAC) (เอ็น-อะเซทิลซิสเทอีน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Mucolytic (Adult) [Oral]	200.0 mg q8h	Daily: 600.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Paracetamol Overdose Antidote (Adult) [Intravenous Infusion]	150.0 mg/kg Continuous	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Metformin (เมทฟอร์มิน)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Type 2 Diabetes (Adult) [Oral]	500.0 mg q12h	Daily: 2550.0 mg	CrCl 30-45: x0.5 CrCl 0-30: x1.0

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Atorvastatin (อะทอร์วาสแตติน)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hyperlipidemia / ASCVD Risk (Adult) [Oral]	40.0 mg q24h	Daily: 80.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Diazepam (ไดอะซีแพม)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Anxiety / Muscle Spasm (Adult) [Oral]	5.0 mg q6-8h	Daily: 40.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Status Epilepticus (Adult) [Intravenous Push]	10.0 mg Stat (repeat 10-15min PRN)	Max: 10.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Status Epilepticus (Pediatric) [Intravenous Push]	0.2 mg/kg Stat	Max: 10.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Phenytoin (ฟีนิทอยน์)

HIGH-ALERT | TDM | HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Status Epilepticus Loading Dose (Adult) [Intravenous Infusion]	15.0 mg/kg Stat	Max: 1500.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Maintenance Dosing (Adult) [Oral]	300.0 mg q24h	Daily: 600.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Levetiracetam (ลีวีไทราซีแทม)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Seizure Prophylaxis (Adult) [Oral]	500.0 mg q12h	Daily: 3000.0 mg	CrCl 50-80: x1.0 q12h CrCl 30-50: x0.5 q12h CrCl 0-30: x0.5 q12h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Gabapentin (กาบาเพนติน)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Neuropathic Pain (Adult) [Oral]	300.0 mg q8h	Daily: 3600.0 mg	CrCl 30-60: x1.0 q12h CrCl 15-30: x1.0 q24h CrCl 0-15: x1.0 q24h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Valproic Acid / Sodium Valproate (วาลโปรอิก แอซิด (เดพาคีน))

HIGH-ALERT | TDM | HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Seizures / Mania / Migraine Prophylaxis [Oral]	15.0 mg/kg Divided BID-TID	-	ไม่ต้องปรับ
Status Epilepticus [Intravenous Infusion]	20.0 mg/kg Stat	Max: 3000.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Epinephrine (Adrenaline) (อีพิเนฟริน (อะดรีนาลิน))

HIGH-ALERT

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Anaphylaxis (Adult) [Intramuscular]	0.3 mg Stat (repeat 5-15min PRN)	Max: 0.5 mg	ไม่ต้องปรับ
Anaphylaxis (Pediatric) [Intramuscular]	0.01 mg/kg Stat (repeat 5-15min PRN)	Max: 0.3 mg	ไม่ต้องปรับ
Cardiac Arrest / ACLS (Adult) [Intravenous Push]	1.0 mg q3-5min	-	ไม่ต้องปรับ
Cardiac Arrest / PALS (Pediatric) [Intravenous Push]	0.01 mg/kg q3-5min	Max: 1.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Atropine (อะโทรปีน)

HIGH-ALERT

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Symptomatic Bradycardia (Adult) [Intravenous Push]	0.5 mg q3-5min PRN	Max: 1.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Bradycardia (Pediatric) [Intravenous Push]	0.02 mg/kg Stat	Max: 0.5 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Magnesium Sulfate (แมกนีเซียมซัลเฟต)

HIGH-ALERT | RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Eclampsia / Pre-eclampsia (Loading) [Intravenous Infusion]	4000.0 mg Once	-	CrCl 0-30: x1.0
Eclampsia / Pre-eclampsia (Maintenance) [Intravenous Infusion]	1.0-2.0 g/hr	-	CrCl 0-30: x0.5
Torsades de Pointes / Hypomagnesemia (Adult) [Intravenous Push]	2000.0 mg Stat	-	CrCl 0-30: x1.0

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Dexamethasone (เดกซาเมทาโซน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Cerebral Edema (Adult) [Intravenous Push]	10.0 mg Stat	-	ไม่ต้องปรับ
Fetal lung maturity [Intramuscular]	6.0 mg q12h (4 doses)	Daily: 12.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Croup (Pediatric) [Oral]	0.6 mg/kg Once	Max: 10.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Anti-inflammatory (Adult) [Oral]	4.0 mg q24h	Daily: 20.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Hydrocortisone (ไฮโดรคอร์ติโซน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Septic Shock (Adult) [Intravenous Push]	50.0 mg q8h	Daily: 200.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Adrenal Crisis (Pediatric) [Intravenous Push]	2.0 mg/kg Stat	Max: 100.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Naloxone (นาลอกโซน)

HIGH-ALERT

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Opioid Overdose / Reversal (Adult) [Intravenous Push]	0.4 mg q2-3min PRN	Max: 2.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Opioid Reversal (Pediatric) [Intravenous Push]	0.01 mg/kg q2-3min PRN	Max: 2.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Dobutamine (โดบูทามีน)

HIGH-ALERT

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Cardiogenic Shock / Acute HF [Intravenous Infusion]	2.0-20.0 mcg/kg/min	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Silver Sulfadiazine 1% Cream (ซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน ครีม)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Burns / Wound Infection [Topical]	1.0 app q12-24h	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Mupirocin 2% Ointment (มิวพิโรซิน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Impetigo / MRSA Skin Infection [Topical]	1.0 app q8h	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Warfarin (วาร์ฟาริน)

HIGH-ALERT | TDM | HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Anticoagulation (Adult) [Oral]	5.0 mg q24h	Daily: 15.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Enoxaparin (อีน็อกซาพาริน)

HIGH-ALERT | RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
DVT/PE Treatment (Adult) [Subcutaneous]	1.0 mg/kg q12h	Max: 100.0 mg	CrCl 0-30: x1.0 q24h
DVT Prophylaxis (Adult) [Subcutaneous]	40.0 mg q24h	-	CrCl 0-30: x1.0 q24h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Unfractionated Heparin (UFH) (เฮปาริน)

HIGH-ALERT | TDM

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Anticoagulation (Adult) [Intravenous Infusion]	18.0-18.0 units/kg/hr	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Apixaban (อะพิกซาแบน (ยาละลายลิ่มเลือด))

HIGH-ALERT | RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
AFib (Stroke Prophylaxis) [Oral]	5.0 mg q12h	Daily: 10.0 mg	CrCl 0-15: x1.0
DVT/PE Treatment [Oral]	10.0 mg q12h	Daily: 20.0 mg	CrCl 0-15: x1.0

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Rivaroxaban (ริวาร็อกซาแบน (ยาละลายลิ่มเลือด))

HIGH-ALERT | RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
AFib (Stroke Prophylaxis) [Oral]	20.0 mg q24h	Daily: 20.0 mg	CrCl 15-50: x1.0 q24h CrCl 0-15: x1.0

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Potassium Chloride (KCl) (โพแทสเซียม คลอไรด์)

HIGH-ALERT

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hypokalemia Replacement (Adult) [Oral]	20.0 mEq q8-12h	Daily: 200.0 mEq	ไม่ต้องปรับ
Severe Hypokalemia (Adult IV) [Intravenous Infusion]	20.0 mEq Over 1-2 hours	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Calcium Gluconate (แคลเซียม กลูโคเนต)

HIGH-ALERT

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hyperkalemia / Hypocalcemia (Adult) [Intravenous Push]	1000.0 mg Over 5-10 min	-	ไม่ต้องปรับ
Hyperkalemia / Hypocalcemia (Pediatric) [Intravenous Push]	60.0 mg/kg Over 5-10 min	Max: 3000.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Phytonadione (Vitamin K1) (วิตามินเค (ไฟโตนาไดโอน))

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Warfarin Reversal / Major Bleeding (Adult) [Intravenous Infusion]	10.0 mg Stat	-	ไม่ต้องปรับ
Supratherapeutic INR (No bleeding) [Oral]	2.5 mg Once	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Haloperidol (ฮาโลเพอริดอล)

HIGH-ALERT | HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Schizophrenia (Adult) [Oral]	5.0 mg BID to TID	Daily: 30.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Acute agitation [Intramuscular]	5.0 mg q1-8h PRN	Daily: 20.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Lorazepam (ลอราซีแพม)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Anxiety/Insomnia [Oral]	1.0 mg BID to TID	Daily: 10.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Status Epilepticus (Adult) [Intravenous]	4.0 mg q10-15min	Daily: 8.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Olanzapine (โอแลนซาปีน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Schizophrenia / Bipolar [Oral]	10.0 mg q24h	Daily: 20.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Acute agitation [Intramuscular]	10.0 mg q2-4h PRN	Daily: 30.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Risperidone (ริสเพอริโดน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Schizophrenia [Oral]	2.0 mg OD to BID	Daily: 16.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Quetiapine (ควิไทอะปีน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Schizophrenia / Bipolar [Oral]	50.0 mg q12h	Daily: 800.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Fluoxetine (ฟลูออกซีทีน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Depression (MDD) [Oral]	20.0 mg q24h	Daily: 80.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Sertraline (เซอร์ทราลีน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Depression / Panic disorder [Oral]	50.0 mg q24h	Daily: 200.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Escitalopram (เอสซิตาโลแพรม)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Depression / Anxiety [Oral]	10.0 mg q24h	Daily: 20.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Amitriptyline (อะมิทริปไทลีน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Depression / Neuropathic pain [Oral]	25.0 mg q24h	Daily: 150.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Lithium (ลิเทียม)

HIGH-ALERT | TDM | RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Bipolar disorder [Oral]	300.0 mg BID to TID	Daily: 2400.0 mg	CrCl 30-50: x0.75 CrCl 10-30: x0.5 CrCl 0-10: x1.0

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Oxytocin (ออกซิโทซิน)

HIGH-ALERT

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Labor induction [Intravenous]	1.0-20.0 mU/min	-	ไม่ต้องปรับ
Postpartum hemorrhage prophylaxis [Intramuscular]	10.0 units Once	Daily: 10.0 units	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Misoprostol (ไมโซพรอสทอล)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Postpartum hemorrhage [Oral]	600.0 mcg Once	Daily: 800.0 mcg	ไม่ต้องปรับ
Labor induction (Cervical ripening) [Oral]	25.0 mcg q3-6h	Daily: 100.0 mcg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Methylergonovine (เมทิลเออร์โกเมทริน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Postpartum hemorrhage [Intramuscular]	0.2 mg q2-4h PRN	Daily: 1.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Terbutaline (เทอร์บูทาลีน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Preterm labor (Tocolysis) [Subcutaneous]	0.25 mg q20-30min PRN	Daily: 1.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Glipizide (กลิพิไซด์)

RENAL-ADJ | HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Type 2 Diabetes [Oral]	5.0 mg OD to BID (before meals)	Daily: 40.0 mg	CrCl 0-50: x0.5

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Empagliflozin (เอ็มพากลิโฟลซิน)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Type 2 Diabetes / Heart Failure [Oral]	10.0 mg q24h	Daily: 25.0 mg	CrCl 20-30: x1.0 CrCl 0-20: x1.0

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Sitagliptin (ซิทากลิปติน)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Type 2 Diabetes [Oral]	100.0 mg q24h	Daily: 100.0 mg	CrCl 30-50: x0.5 CrCl 0-30: x0.25

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Pioglitazone (ไพโอกลิตาโซน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Type 2 Diabetes [Oral]	15.0 mg q24h	Daily: 45.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Levothyroxine (เลโวไทรอกซีน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hypothyroidism (Adult) [Oral]	1.6 mcg/kg q24h	Daily: 300.0 mcg	ไม่ต้องปรับ
Hypothyroidism (Elderly/CAD) [Oral]	25.0 mcg q24h	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Methimazole (เมทิมาโซล)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hyperthyroidism [Oral]	15.0 mg OD to TID	Daily: 120.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Propylthiouracil (PTU) (โพรพิลไทโอยูราซิล)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hyperthyroidism [Oral]	100.0 mg q8h	Daily: 900.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Insulin Glargine (อินซูลิน กลาร์จีน)

HIGH-ALERT

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Diabetes (Basal) [Subcutaneous]	0.2 units/kg q24h	Daily: 150.0 units	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Insulin Regular (RI) (อินซูลิน เรกูลาร์)

HIGH-ALERT

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Diabetes (Prandial / Sliding Scale) [Subcutaneous]	4.0 units q8h	-	ไม่ต้องปรับ
Diabetic Ketoacidosis (DKA) [Intravenous]	0.05-0.2 units/kg/hr	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Sevelamer (เซเวลาเมอร์)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hyperphosphatemia in CKD [Oral]	800.0 mg q8h	Daily: 14000.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Epoetin alfa (อีโปอีติน อัลฟา)

HIGH-ALERT

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Anemia in CKD [Subcutaneous]	50.0 units/kg 1-3 times/week	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Sodium polystyrene sulfonate (คาลิเมท / โซเดียม โพลีสไตรีน ซัลโฟเนต)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hyperkalemia [Oral]	15.0 g OD to QID	Daily: 120.0 g	ไม่ต้องปรับ
Hyperkalemia (Enema) [Rectal]	30.0 g q6h	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Calcitriol (Active Vitamin D3) (แคลซิไตรออล)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Secondary hyperparathyroidism / Hypocalcemia [Oral]	0.25 mcg q24h	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Calcium Carbonate (แคลเซียมคาร์บอเนต)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Phosphate Binder (CKD) [Oral]	1000.0 mg q8h	Daily: 3000.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Cinacalcet (ซินาแคลเซ็ต)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Secondary hyperparathyroidism in dialysis [Oral]	30.0 mg q24h	Daily: 300.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Tacrolimus (ทาโครลิมัส)

HIGH-ALERT | TDM | RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Kidney Transplant (Maintenance) [Oral]	0.05 mg/kg q12h	-	CrCl 0-30: x0.5

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Mycophenolate Mofetil (MMF) (ไมโคฟีโนเลต)

HIGH-ALERT

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Kidney Transplant / Lupus Nephritis [Oral]	1000.0 mg q12h	Daily: 3000.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง (ระบุ): _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

หนังสือรับรองความถูกต้องทางคลินิก (Clinical Verification Certification)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบขนาดยา สูตรการคำนวณ เกณฑ์การปรับยาตามระดับไต และคำเตือนความปลอดภัยทางยา ในระบบ Drugph เทียบเคียงกับตำรามาตรฐานสากลและแนวทางเวชปฏิบัติของประเทศไทยอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้ว

1. เภสัชกรคลินิกผู้ตรวจรับรอง (Clinical Pharmacist Reviewer)

[ ] ตรวจผ่านทุกรายการ [ ] มีรายการแก้ไข

ลงชื่อ: _____ **(ภก./ภญ. _____)**

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม: ภ. _____ วันที่: _____ / _____ / _____

ตำแหน่ง / แผนก: _____

2. อาจารย์แพทย์ / ประธานคณะกรรมการ PTC ผู้ตรวจอนุมัติ (Attending Physician / PTC Chair)

[ ] อนุมัติใช้งานทางคลินิก

ลงชื่อ: _____ **(นพ./พญ./ศ./ผศ. _____)**

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: ว. _____ วันที่: _____ / _____ / _____

ตำแหน่ง / สถาบัน: _____

หมายเหตุ: เมื่อลงลายมือชื่อรับรองครบถ้วนแล้ว ให้สแกนเอกสารฉบับนี้จัดเก็บในระบบเพื่อเป็นบันทึกการตรวจสอบคุณภาพ (Audit Trail) และบันทึกชื่อผู้ตรวจ เลขที่ใบอนุญาต และวันที่ลงในฟิลด์ Provenance ของซอร์สโค้ดตามระเบียบ docs/VERIFICATION_PROTOCOL.md