

4.2. Реализовать метод стрельбы и конечно-разностный метод решения краевой задачи для ОДУ в виде программ. С использованием разработанного программного обеспечения решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального уравнения 2-го порядка на указанном отрезке. Оценить погрешность численного решения с использованием метода Рунге – Ромберга и путем сравнения с точным решением.

№	Краевая задача	Точное решение
1	$xy^2 + 2y\phi - xy = 0,$ $y\phi(1) = 0,$ $1.5y(2) + y\phi(2) = e^2$	$y(x) = \frac{e^x}{x}$
2	$xy^2 + 2y\phi - xy = 0,$ $y(1) = e^{-1},$ $y(2) = 0.5e^{-2}$	$y(x) = \frac{e^{-x}}{x}$
3	$x^2(x+1)y^2 - 2y = 0,$ $y\phi(1) = -1,$ $2y(2) - 4y\phi(2) = 4$	$y(x) = \frac{1}{x} + 1$
4	$x^2(x+1)y^2 - 2y = 0,$ $y(1) = 1 + 4 \ln 2,$ $y(2) = -1 + 3 \ln 2$	$y(x) = -1 + \frac{2}{x} + \frac{2(x+1)}{x} \ln x+1 $
5	$y^2 - 2(1 + (\operatorname{tg} x)^2)y = 0,$ $y'(\frac{\pi}{4}) = 3 + \frac{\pi}{2},$ $y'(\frac{\pi}{3}) - y(\frac{\pi}{3}) = 3 + \frac{\pi(4 - \sqrt{3})}{3}$	$y(x) = 1 + \operatorname{tg}(x(x+1))$
6	$y^2 - 2(1 + (\operatorname{tg} x)^2)y = 0,$ $y(0) = 0,$ $y(\frac{\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{3}}{3}$	$y(x) = -\operatorname{tg} x$
7	$(2x+1)y^2 + 4xy\phi - 4y = 0,$ $y\phi(0) = -1,$ $y\phi(1) + 2y(1) = 3$	$y(x) = x + e^{-2x}$
8	$(2x+1)y^2 + 4xy\phi - 4y = 0,$ $y\phi(-2) + 2y(-2) = -9,$ $y\phi(0) = 1$	$y(x) = 3x + e^{-2x}$
9	$xy^2 - (2x+1)y\phi + (x+1)y = 0,$ $y\phi(0) = 1,$ $y\phi(1) - 2y(1) = 0$	$y(x) = e^x(x^2 + 1)$
10	$xy^2 - (2x+1)y\phi + (x+1)y = 0,$ $y\phi(1) = 3e,$ $y\phi(2) - 2y(2) = 0$	$y(x) = e^x x^2$
11	$x(x-1)y^2 - xy\phi + y = 0,$ $y\phi(1) = 2,$ $2y\phi(2) - y(2) = 1$	$y(x) = 1 + x + x \ln x $
12	$x(x-1)y^2 - xy\phi + y = 0$ $y\phi(1) = 3$	$y(x) = 2 + x + 2x \ln x $

	y(3)-3y'(3)=-4	
№	Краевая задача	Точное решение
13	$(e^x + 1) y^2 - 2y' - e^x y = 0,$ $y'(0) = \frac{3}{4},$ $y'(1) = \frac{e^2(e+2)}{(e+1)^2}$	$y(x) = e^x - 1 + \frac{1}{e^x + 1}$
14	$(e^x + 1) y^2 - 2y' - e^x y = 0,$ $y'(0) = 1,$ $y'(1) - y(1) = 1$	$y(x) = e^x - 1$
15	$x^2 \ln x y^2 - xy' + y = 0,$ $y'( -1) = 0,$ $y'(1) - y(1) = 0$	$y(x) = 1 + x + \ln x$
16	$y^2 - \operatorname{tg} x y' + 2y = 0,$ $y(0) = 2,$ $y(\frac{\pi}{6}) = 2.5 - 0.5 \ln 3$	$y(x) = \sin x + 2 - \sin x \ln \frac{\sin x + \sin x \ln 3}{\sin x - \sin x \ln 3}$
17	$(x^2 - 1) y^2 + (x - 3)y' - y = 0,$ $y'(0) = 0,$ $y'(1) + y(1) = -0.75$	$y(x) = x - 3 + \frac{1}{x + 1}$
18	$x y^2 - (x+1)y' - 2(x-1)y = 0,$ $y'(0) = 4,$ $y'(1) - 2y(1) = -9e^{-1}$	$y(x) = e^{2x} + (3x+1) e^{-x}$
19	$y^2 + 4xy' + (4x^2 + 2)y = 0,$ $y'(0) = 1,$ $4y(2) - y'(2) = 23e^{-4}$	$y(x) = (1+x)e^{-x^2}$
20	$xy^2 - (2x+1)y' + 2y = 0,$ $y'(0) = 4,$ $y'(1) - 2y(1) = -4$	$y(x) = 2x + 1 + e^{2x}$
21	$x(2x+1)y^2 + 2(x+1)y' - 2y = 0,$ $y'(1) = 0,$ $y(3) - y'(3) = \frac{31}{9}$	$y(x) = x + 1 + \frac{1}{x}$
22	$x(x+4)y^2 - (2x+4)y' + 2y = 0,$ $y'(0) = 1,$ $y(2) - y'(2) = 3$	$y(x) = x^2 + x + 2$

23	$x(x^2+6)y'' - 4(x^2+3)y' + 6xy = 0,$ $y(0)=0,$ $y(4)-y'(4)=26$	$y(x)=x^3+x^2+2$
24	$(x^2+1)y'' - 2y = 0$ $y(0)=2$ $y(1) = 3 + \frac{p}{2}$	$y(x)=x^2+x+1+$ $+(x^2+1)\arctg(x)$
25	$2x(x+2)y'' + (2-x)y' + y = 0,$ $y(4)+y(4) = \frac{21}{4},$	$y(x) = \sqrt{ x } + x - 2$
№	Краевая задача	Точное решение
26	$x(x+1)y'' + (x+2)y' - y = x + \frac{1}{x},$ $y(1) = \frac{3}{2},$ $4y(2) + y(2) = 13 + 4\ln 2$	$y(x) = x + \frac{7}{2} + \frac{1}{x} + \frac{e^x}{e^2} + 1 \cdot \ln x $
27	$(2x+1)y'' + (2x-1)y' - 2y = x^2 + x,$ $y(0)=1,$ $y(1)+y(1)=5$	$y(x) = 2x - 1 + e^{-x} + \frac{x^2 + 1}{2}$
28	$xy'' - (2x+1)y' + 2y = 0,$ $y(0)=2,$ $y(1)=e^2$	$y(x) = e^{2x}$
29	$(x^2-1)y'' + (x-3)y' - y = 0,$ $y(0)=-18,$ $y(3)=0$	$y(x)=6x-18$
30	$(x^2+1)y'' - 2y = 0,$ $y(0)=0,$ $y(2)-y'(2)=1$	$y(x)=x^2+1$