

text
خانم داوری برای سرماخوردگی باید قرص ACA با دوز 325mg رو هر ۱۲ ساعت یک بار مصرف کنه.
آقای رضایی برای درد عضلات باید قرص ACA با دوز 162.5mg رو روزی سه بار استفاده کنه.
خانم علیزاده به خاطر سردرد خفیف باید قرص ACA با دوز 32.5mg رو بعد از غذا میل کنه.
آقای عباسی برای کنترل قند خون باید قرص آکاربوز با دوز 100mg رو همراه ناهار مصرف کنه.
خانم محمدی برای دیابت نوع ۲ باید قرص آکاربوز 50mg رو روزی سه بار با غذا مصرف کنه.
پسر ۵ ساله‌ای به نام آرین در صورت تب باید از شیاف استامینوفن 125mg هر ۶ ساعت استفاده کنه.
کودک ۸ ساله‌ای به نام سارا با تب بالا باید شیاف استامینوفن 325mg رو هر ۸ ساعت دریافت کنه.
آقای کریمی برای سردرد باید قرص استامینوفن 325mg رو هر ۶ ساعت میل کنه.
خانم رضوانی برای درد عضلات باید قرص استامینوفن 500mg رو هر ۸ ساعت استفاده کنه.
کودک ۳ ساله‌ای به نام آوا باید در هنگام تب از شربت استامینوفن 60mg به میزان ۵ سی‌سی هر ۶ ساعت مصرف کنه.
نوزاد ۹ ماهه‌ای به نام یکتا باید در صورت تب از قطره استامینوفن 100mg به میزان ۰/۵ میلی‌لیتر هر ۸ ساعت استفاده کنه.
دختر بچه ۶ ساله‌ای به نام نیکو باید برای تب از سوسپانسیون استامینوفن 120mg به میزان ۵ سی‌سی هر ۶ ساعت استفاده کنه.
خانم احمدی در بیمارستان برای کاهش تب از آمپول استامینوفن 1000mg به صورت تزریقی هر ۸ ساعت استفاده می‌کنه.
آقای طاهری با میگرن باید کپسول نوافن رو هر ۸ ساعت بعد از غذا بخوره.
خانم شفیعی برای درد دندان باید قرص استامینوفن کدئین 300mg رو هر ۶ ساعت یک عدد مصرف کنه.
آقای فتحی برای کمردرد متوسط باید قرص استامینوفن کدئین 300mg رو روزی دو بار مصرف کنه.
خانم سادات برای کاهش فشار داخل چشم باید قرص استازولامید 250mg رو روزی دو بار مصرف کنه.
خانم قاسمی در اتاق عمل برای تست چشمی از آمپول استیل کولین 20mg استفاده می‌کنه.
آقای رنجبر برای خلط غلیظ ریوی باید آمپول استیل سیستئین 200mg رو هر روز تزریق کنه.
خانم گلچین برای بهبود تنفس باید هر روز صبح یک عدد قرص جوشان استیل سیستئین 600mg رو در آب حل کرده و بنوشه.
خانم رحمانی برای درمان تبخال باید قرص آسیکلوویر 200mg رو هر ۸ ساعت استفاده کنه.
آقای سلیمی برای درمان تبخال تناسلی باید قرص آسیکلوویر 400mg رو روزی سه بار مصرف کنه.
آقای زارع برای درمان عفونت سیستمیک باید از ویال آسیکلوویر 250mg به صورت تزریقی استفاده کنه.
خانم سلطانی برای درمان عفونت چشمی باید از پماد چشمی آسیکلوویر 3٪ روزی سه بار استفاده کنه.
آقای اکبری برای درمان تبخال لب باید از کرم موضعی آسیکلوویر 5٪ هر ۴ ساعت استفاده کنه.
آقای مختاری برای آریتمی باید در اورژانس آمپول آدنوزین 3mg به صورت تزریقی دریافت کنه.
خانم بیات برای کنترل ضریان قلب بالا آمپول آدنوزین 6mg رو در بیمارستان دریافت کنه.
آقای ملکی برای علائم سرماخوردگی باید قرص سرماخوردگی بزرگسال رو هر ۸ ساعت همراه غذا مصرف کنه.
خانم درخشان که دچار کاهش آلبومین خونی است، روزی یک ویال سرم آلبومین 20٪ تزریقی دریافت می‌کنه.
خانم نعمتی با پوکی استخوان باید هر هفته صبح ناشتا قرص آلدرونیف 70mg مصرف کنه.
آقای محسنی برای درمان نقرس باید هر شب یک قرص آلپورینول 300mg مصرف کنه.
خانم حسینی برای جلوگیری از حمله نقرسی باید قرص آلپورینول 100mg رو هر صبح مصرف کنه.
خانم بختیاری برای اضطراب باید قرص آلپرازولام 0.5mg رو شب‌ها قبل از خواب مصرف کنه.
آقای محمودی برای بی‌خوابی شبانه باید قرص آلپرازولام 1mg رو شب‌ها استفاده کنه.
خانم هاشمی در اورژانس قلب برای درمان فوری سکته ویال اکیتیلاز 10mg دریافت کنه.
آقای رستگار در بخش CCU به علت ترومبوز ویال اکیتیلاز 50mg تزریق کنه.
خانم تاجیک برای سوءهاضمه باید از سوسپانسیون آلومینیوم Mg بعد از غذا استفاده کنه.
آقای لطفی برای ترش کردن معده از سوسپانسیون آلومینیوم MgS روزی سه بار استفاده می‌کنه.
خانم شیراز برای رفلاکس معده باید قرص آلومینیوم MgS رو قبل خواب مصرف کنه.
آقای نظری با پارکینسون خفیف باید روزی دو بار کپسول آمانتادین 100mg مصرف کنه.
خانم کرمانی برای عفونت ادراری شدید باید آمپول آمیکاسین 100mg هر ۱۲ ساعت تزریق کنه.
آقای مهاجری در ICU برای عفونت‌های مقاوم باید از آمپول آمیکاسین 500mg استفاده کنه.
خانم غفاری در بخش تغذیه تزریقی روزی یک بار ویال آمینواسید 10٪ دریافت می‌کنه.
آقای فهیمی در طول ریکاوری روزانه ویال آمینواسید 5٪ رو دریافت می‌کنه.
خانم تقی‌زاده از ویال آمینواسید 5٪ برای تأمین نیازهای تغذیه‌ای استفاده می‌کنه.
آقای ناصری برای حمله آسمی باید از آمپول آمینوفیلین 250mg استفاده کنه.

خانم عبادی در اورژانس به علت آریتمی خطرناک از آمپول آمیودارون 150mg استفاده کنه.
آقای مدنی برای درمان آریتمی مزمن باید قرص آمیودارون 200mg رو روزی یک عدد مصرف کنه.
خانم پورحسن برای اختلالات خواب باید شب‌ها قرص آمیتریپتیلین 10mg مصرف کنه.
آقای خاکسار با علائم افسردگی باید صبح و شب قرص آمیتریپتیلین 25mg مصرف کنه.
آقای دهقان برای درمان فشار خون بالا قرص آملودیپین 5mg رو هر صبح مصرف کنه.
آقای موسوی برای فشار مقاوم باید قرص ترکیبی آملودیپین/والزارتان 10mg رو هر روز استفاده کنه.
خانم حاج‌محمدی برای کنترل فشار باید قرص ترکیبی آملودیپین/والزارتان 5mg رو هر شب بخوره.
آقای فروزان برای کنترل فشار خون باید روزانه قرص ترکیبی آملودیپین/والزارتان 5mg مصرف کنه.
کودک ۵ ساله‌ای به نام عرفان با عفونت گوش باید از سوسپانسیون آموکسی‌سیلین 125mg روزی سه بار ۵ سی‌سی بخوره.
خانم نادری برای درمان دندان‌درد باید هر ۸ ساعت یک کپسول آموکسی‌سیلین 250mg مصرف کنه.
کودک ۶ ساله‌ای به نام مه‌رسا برای درمان گلودرد باید سوسپانسیون آموکسی‌سیلین 250mg رو سه بار در روز مصرف کنه.
آقای تیمورزاده با عفونت سینوسی باید هر ۸ ساعت یک کپسول آموکسی‌سیلین 500mg مصرف کنه.
خانم سادات در بخش ICU برای درمان قارچ سیستمیک هر ۲۴ ساعت یک ویال آمفوتریسین بی 50mg تزریق می‌کنه.
آقای فیضی در بخش عفونی هر ۸ ساعت ویال سولباکتام/آمپی‌سیلین 3g دریافت کنه.
خانم غیاثوند با عفونت حاد ادراری از ویال سولباکتام/آمپی‌سیلین 1g روزی سه بار استفاده کنه.
آقای کله‌ری در اورژانس برای ذات‌الریه باید هر ۶ ساعت یک ویال آمپی‌سیلین 1g دریافت کنه.
نوزاد تازه‌متولدشده‌ای به نام ماهان برای عفونت نوزادی باید هر ۱۲ ساعت آمپی‌سیلین 500mg تزریق کنه.
خانم رحیمی که Rh منفی دارد باید بعد از زایمان آمپول ایمونوگلوبولین آن‌تی دی با دوز 300mcg تزریق کند.
آقای یوسفی برای درمان هموروئید باید روزی دو بار پماد آن‌تی‌هموروئید استفاده کنه.
خانم نیکزاد برای رفع التهاب مقعدی باید هر شب یک شیاف آن‌تی‌هموروئید استفاده کنه.
آقای درویش با علائم آلرژی باید قرص آن‌تی‌هیستامین+دکونژستانت رو روزی دو بار مصرف کنه.
خانم احمدپور برای اسکیزوفرنی باید قرص آریپیپرازول 5mg رو روزانه مصرف کنه.
آقای اکبری برای کنترل خلق روزانه قرص آریپیپرازول 10mg رو صبح‌ها مصرف کنه.
خانم هدایتی برای روان‌پریشی باید هر روز قرص آریپیپرازول 15mg رو مصرف کنه.
خانم عابدی با خشکی چشم مزمن باید قطره اشک مصنوعی 0.5% رو روزی چهار بار بریزه.
آقای شریفی برای کاهش ریسک سکته باید قرص آسپرین 80mg رو هر شب مصرف کنه.
خانم نعمتی برای سلامت قلب باید قرص آسپرین 100mg رو هر روز صبح ناشتا مصرف کنه.
آقای بهنامی برای دردهای مزمن باید قرص آسپرین 325mg رو روزی سه بار مصرف کنه.
آقای نجفی برای کنترل فشار خون باید هر روز صبح قرص آنتولول 100mg مصرف کنه.
خانم عزیزی برای تپش قلب باید صبح‌ها قرص آنتولول 50mg مصرف کنه.
کودک ۸ ساله‌ای به نام آریا برای بیش‌فعالی باید صبح‌ها یک کپسول آتوموکستین 10mg بخوره.
آقای نظری برای چربی خون باید هر شب قرص آتورواستاتین 10mg مصرف کنه.
خانم رسولی برای کلسترول بالا باید قرص آتورواستاتین 20mg رو شب‌ها بعد شام بخوره.
آقای شمس برای پیشگیری از سکته باید هر شب قرص آتورواستاتین 40mg استفاده کنه.
خانم رفیعی در بخش بیهوشی برای شل کردن عضله از آمپول آتراکوریوم بزیلات 50mg استفاده کنه.
خانم نادری در اورژانس به‌دلیل برادی‌کاردی از آمپول آتروپین سولفات 0.5mg استفاده کنه.
آقای محسنی برای معاینه چشمی باید هر ۶ ساعت قطره آتروپین سولفات 0.5% استفاده کنه.
خانم میربها برای سرکوب ایمنی بعد پیوند کلیه باید روزی یک قرص آزاتیوپورین 50mg مصرف کنه.
آقای راد برای گلودرد باکتریایی باید ۳ روز اول هر روز یک کپسول آزیترومایسین 250mg بخوره.
خانم صبور برای عفونت سینه باید روزی یک کپسول آزیترومایسین 500mg استفاده کنه.
کودک ۵ ساله‌ای به نام نیکا برای عفونت تنفسی باید روزی یک‌بار ۵ سی‌سی شربت آزیترومایسین 100mg مصرف کنه.
پسر ۹ ساله‌ای به نام امین برای سینوزیت باید روزانه ۵ سی‌سی شربت آزیترومایسین 200mg بخوره.
خانم سهرابی برای درمان اسپاسم عضلانی باید هر ۱۲ ساعت قرص باکلوفن 10mg استفاده کنه.
آقای قنبری برای گرفتگی شدید عضله باید روزی سه بار قرص باکلوفن 25mg مصرف کنه.
خانم آذین برای عکس‌برداری دستگاه گوارش باید پودر باریوم سولفات 135g رو با آب حل کرده و بنوشه.
خانم جواهری برای کنترل آلرژی بینی باید روزی دو بار اسپری بکلومتازون 20mg استفاده کنه.
آقای سالاری برای آسم شدید باید از اسپری تنفسی بکلومتازون 250mcg روزانه استفاده کنه.

کودک ۷ ساله‌ای به نام امیرحسین برای آسم خفیف باید هر شب اسپری بکلومتازون 50mcg بزنه.
آقای حیدری برای اسپاسم شکمی باید قرص بلادونا Pb رو قبل غذا مصرف کنه.
خانم حبیبی به علت التهاب لثه باید روزی سه بار با دهان‌شویه بنزیدامین هیدروکلراید 0.15% غرغره کرده و بعد تف کند.