Text_Index	Original Text	Structured_Output	Time_Seconds	prompt	accuracy
1	 برای درمان تب و بدن:درد، خانم کریمی باید هر 6 ساعت یک عدد فرص استامینوفن 500 مصرف کند و هر 12 ساعت یک کیسول آموکسی،سیاین 500 بعد از غذا مصرف شود	این دارو باید هر 6 ساعت یک قرص استامینوفن 600 مصرف شود و هر 15 روز یک عند قرص استامینوفن 600 مصرف شهرد قدور از مصرف دارو در هنگام سرماخورگی و آنفولارتا خودداری شود مسافرت و رفت و آمد به مقصد در طول سفر به وسیله توبیسهای عمومی، فقار و هواپیما بسیان ساده است. اما به خاطر داشته باشید که اتوبوسها دارای سرعت بالا نیستند و معمولا به صورت تک و تنها در اختیار مسافرین فراز می گریند. در تنبچه سرعت حرکت اتوبوسها و قطارها دار طول سفر در طول سفر بسیار زیاد است. لذا برای سفر با اتوبوسهای عمومی باید سرعت مناسب را به مسافرها بدهید.قدور	2.79	تویک دستیار پرزشکی هستی زیر را دقیقاً با اطلاعات نسخه فرمت زیر را دقیقاً با استخراج کن. مشخصشده وجود را ارائه بسه. اگر وجوی: "## فرمت اشخیص". تشخیص نام بیماری: نحوه مصرف: نحوه مصرف: توصیه دارو) دارو)	همینطور که مشاهده میکنید، دقت هدل خیلی بد است
2	آقای صادقی به دلیل سینوژیت حاد باید روزی یک عدد فرص آزیترومایسین 250 به مدت سه روز همراه صبحانه مصرف کند و قطره فنیل)فرین را هر 8 ساعت در هر سوراخ بینی بچکاند.	وهان ایئد روزی یک عند قرص آنرز وباسین 200 به مدت 5 روز همراه صبحانه مصرف کنند مسافران در سفر به هر کشوری بهخصوص در فصلهای شلوغ کردشگری، باید برای خرید بلیط هوبیاها اقدام کنند. خرید بلیط هواپیها در فصلهای شلوغ گردشگری و تغریص برتوانند برای هر گردشگری، جناب باشد. در داده، بهترین بلیط هواپیها در به شما محرق می کنیم، با ما همراه باشید، بلیط هواپیها در فصلهای شلوغ کردشگری، معمولا بلیطهای ارزانتری دارند. در فصلهای شلوغ گردشگری، بلیطهای ارزاند از بلیطهای ارزانتر هستند. در فصل	2.8		
3	خانم عسگری به دلیل آلرژی فصلی باید روزی دو عدد قرص سیتریزین همراه غذا مصرف کند و شپها یک قاشق شربت دیفن(هیدرامین قبل از خواب میل نماید.	خاتم عسگری به دلیل آلرژی فصلی باید روزی دو عدد قرص سیتریزین همراه غذا مصرف کند.حمیدرضا دهقانی نبا، معان گزیشگری کشور با بیان اینکه «گزیشگری حلال» در ایران از سالها بیش بهعنوان پی از روشهاهای گزیشگری حلال شناخته شده است، گفت «گزیشگری حلال با هدف بهره گری از طرفیتهای داخلی و خارجی و همچنین ایجاد فرصتهای شغلی در صفعت گزیشگری انجام میشود. به گفتهای وی، گزیشگری حلال در ایران بهعنوان پی از راهکارهای گزیشگری حلال شناخته شده و بهعنوان پی از روش های طبیعی شناخته شده است جمیریضا دهقانی نیا در ادامه	3.15		
4	کودک هفتسالهای که دچار عفونت گو شده است باید هر 8 ساعت 5 سیسی شریت سفالکسین مصرف کند و هر 6 ساعت یک قاشق شریت استامینوفن برای تب تجویز شده است.	تورک پوید هر ۱ منت پیار و ب کو تصوی بیونور بیونوند و هر ۱ منت که پیار و با پ و صابون بیوند و هر ۱ منت پیار و با پ و صابون می بیوند که در است که بیار و با پ و صابون بیوند بیار است.	2.8		
5	آقای حسام برای رفلاکس معده باید شبها یک عدد قرص فاموتیدین 40 قبل از خواب و همراه ناهار یک عدد قرص رانیتیدین مصرف کند.	اتع برای درمان رفلاکس معده باید شیءها یک عند قرص فاموتینین 60 قبل از خواب مصرف کند نفور را نصرف این دارو خودکاری شود.وطنان عزیز در صورت مشاهده هر گونه عالام یا نشانهای از بیماری یا وضعیت اورژانسی، بلافاصله به پزشک مراجمه کنند، به گزارش ایسنا، طی روزهای اخیر به توجه به شیرع بیباری کرونا و شرورت رعایت بهباشی تعادمات سازمان بهناشت جهانی و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس، با هدف کنترل و جلوگیری از شیرع بیباری کرونا، اقداماتی را در راستای کنترل و جلوگیری از شیوع این بیباری انجام دادهاند. به عنوان مثال در حال حاضر در کشور ماه در حال حاضر دو عدد قریب	2.8		
6	جهت درمان سرماخوردگی، خانم آقاجانی باید روزی سه بار قرص لوراتادین پس از غذا مصرف کند و شبها قبل از خواب یک قاشق شربت دیفن(هیدرامین نیز میل نماید.	از باید روزی سه بار قرص لوراتادین مصرف نماید.مطمئنا شما هم مثل من از این جملهها بیشتوید. شما هم مثل من دوست دارید در خانه گر کنید و به خانمی خود برسید؟ شاید هم از آن دسته افرادی هستید که در خانههای کوچک و نقلی کار می کنید و برای رسیدن به همدهای بزگری و شمای خود به دنبال شما مساعی کوید. اما با توجه به فرانط خان بزنگری و بارطاط کاری و کار انتخاب شغل مناسب یکی از مهمترین مسائل برای شما خواهد بود. شاید هم از این جملهها باشد. لطفا در ادامه ی این نوشته به	2.84		
7	خانم فرهمند با تشخیص برونشیت باید روزی یک عدد قرص آزیترومایسین با معدد خال و هر 8 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف نماید.	برای هر دارویی که مصرف می کنید و هر روز یک عدد قرص استامینوفن 300 مصرف نمایید.استئناه این که هر دارویی را که مصرف می کنید حتما باید حتما آن را بهمهراد داشته باشید. برای اطلاع از زمان دقیق مصرف دارو و اینکه کنام دارو باید مصرف این مقاله از نشره داروسازی دکتر عبیدی با دکتر مصطفی رحماندوست در مورد عوارض جانبی و عوارض جانبی استامینوفن ها و عوارض جانبی استامینوفن ها و عوارض جانبی استامینوفن ها و عوارض جانبی استامینوفن ها بهطور کامل صحبت خواهیم کرد. در صورت نیاز به این مطلب می توانید با پزشک خود مشورت کنید. (۵	3.09		
8	برای درد مفاصل، آفای تقوی باید قرص ایبوپروفن 400 را هر 8 ساعت بعد از غفا و ناپروکسن 250 را روزی دو بار همراه یک لیوان آب میل کند.	ق در هنگم خوردن غلبا باید با ممده خال مصرف خود وطنان عزیز از مصرف هرگونه قرص ایمپروفق بایدا بختابات کنند مصرف خوراق های با طبع سرد مانند شریق، شکلات، میوههای خشک، بستنی، بستنی، بستنی، مبایر تنقلات با طبع سرد، می تواند موجب بروز درد مفاصل فرود. مصرف خوراق های با طبع سرد، در هنگام خوردن غلبا، باید با معده خال مصرف شود. در هنگام خوردن غلبا، باید با معده خال مصرف شود. در هنگام مصرف خوراق های با طبع گرم، بایستی با معده خال مصرف شود وطنان عزیز از مرحم هرگزی خوراق با ساخ گرم، آنای تقوی ≕ا	2.82		
9	کودک دهسالهای که کمخونی دارد باید روزی یک فرص آهن همراه صبحانه و شریت آسکورییک اسید نیز روزی دو بار برای جذب بهتر مصرف کنند.	کودک دهسالهای است که کهخونی دارد و برای جذب بیشتر آهن، باید روزی یک قرص آهن همراه غذا و نوشیدن شیرین میل کند.(ادکمانافدورالدکمانا(مگان در طول روز مقدار بیشتری از امیات مصرف کند. در این رژیم باید توجه داشت که زیادمروی در مصرف مایعات باعث افزایش فشار خون و افزایش خطر ابتلا به بیباریهای قلبی عروقی میشود. رعایت:نکردننکردننکردن نکردن نامیات در طول روز، میتواند عوارض خطرناکی بعدنبال داشته باشد. از طرفی که پیوست کودکان در طول روز زیادی شود،(لامکانا(مکان(ادکان	2.8		
10	خانم مرادی که دچار حساسیت پوستی است باید روزی یک عدد قرص لوراتادین صبحها و شبهها بماد هیدروکورنتزون را روی نواحی آسیب دیده بمالد.	ها میتوانند برای کاهش حساسیت پوستی، از پماد لوراتادین برای رفع خارش و خارش استفاده کنند. وازلین برای رفع خارش و سوزش پوست و خارش، از پماد لوراتادین برای رفع خارش و سوزش، از پماد لوراتادین برای رفع خارش و سوزش پوست استفاده یک محیط توسعه نروافزار است که نوسط شرکت میاکرسافت، در دران (Visual Studio Code) میشود.ویژوال استودیو کد منتش شداست، ویژوال استودیو کد یک محیط توسعه نروافزار آزاد است که توسط مایکراهشافت در سال ۱۹۹۵ این ۱۹۹۳ ویندوز طراحی شد و توسط مایکروسافت برای ویندوز و لینوکس منتشر شد. ویژوال استودیو کد در سال ۱۹۹۵ برای ویندوز	2.77		
11	برای درمان عفونت مجاری ادراری، آقای خلیلی باید هر 12 ساعت یک عدد کپسول سفالکسین 500 و روزی سه بار قرص مترونیدازول همراه غذا مصرف نماید.	نوع یک کیسول سفالکسین یک عدد کیسول سفالکسین 3 بار، کیسول مترونیدازول دو عدد فرص مترونیدازول یک عدد قرص مترونیهازول یک عدد فرص مترونیدازول یک عدد کیسول مترونیدازول سه عدد فرص مترونیدازول یک عدد کیسول مترونیدازول سه مد بار و روزی سه بار قرص مترونیدازول سه بار و روزی سه بار کیسول مترونیدازول سه بار و روزی سه بار قرص مترونیدازول سه بار و روزی سه بار کیسول مترونیدازول سه بار و روزی سه بار و روزی سه بار و روزی سه بار کیسول مترونیدازول سه بار و روزی بار و	2.9		
12	خاتم ناوری که با اسهال شدید و التهاب مواجه است باید روزی دو بار قرص لویرامید و هر روز صبح یک عدد قرص دگزامتازون مصرف کند. مصرف ماند. مصرف ماند.	زایش فرصهای مولی ویتامین و مولی ویتامین و هر فرص مولی ویتامین که مصرف آن توصیه می شود باید روزی مصرف شود.ایام عید نرورز را با تمام شور و ضوق و فرق و انرژیکهای مشتشر جشن به گیریم. البته اگری از حال و هوای نوروز و روزهایش را با ما در مان بگذارید در همان ابتدان نوروز به استقبالش میرویم و به او تیرک می گوییم. از ایران رو را نامه با ما همراه باشید تا این آداب و رسومات آشنا شوید. «عالم علیک» رازش دار و هر کنام از داردهای معروف اینیش	2.84		
13	کودک سهساله با گلودرد ویروسی باید هر 6 ساعت یک قاشق شریت استامینوفن و هر 12 ساعت یک قاشق شریت آنتی هیستامین بعد از غلا مصرف کنند.	کودک با گودرد ویروسی باید هر 12 ساعت یک قاشق شریت آنق هیستامین مصرف کنند.تناب از معرض طولانی مدت مواد غذایی حاول نیترات، بتریت و نیتریت، بناعب بروند گودرد ویروسی می مفرد. در صورت ابتلاب عنون فاویی، به کودکان و برزگسالان باید از مصرف هارگرنه مواد غذایی حاول نیترات خودداری کنند. در صورت ابتاد به عقونت قاربی، به کودکان و برزگسالان باید از مصرف غذاهای حاول نیترات خودداری کنند. در صورت ابتلا به بیماری قاربی، به کودکان و کودکان باید از مصرف غذاهای حاول نیترات و نیترات خودداری کنند. در صورت ابتلا به بیماری قاربی، به کودکان و کودکان باید از مصرف غذاهای حاول نیترات و	2.78		
14	آقای رفیعی با آثرژی تنفسی باید روزی یک عدد قرص فکسوفنادین با شکم خال و شبها قبل از خواب شربت دیفن هیدرامین میل کنند.	نوع برای هر دارو باید روزی دو عند قرص فکسوفنادین میل کننداین دارو به صورت کپسول،های کوچک و در حجمهای کوچک راهنلا ۱۰ میلی لیترا موجود است.این دارو به صورت کیسول،های کوچک و در حجمهای کوچک موجود است.این دارو در بازار موجود است و فقط در داروخانامها موجود استایان از دورای افاره نمایه از ارژی و آمی همچنین برای افارتاک که پیماری آسم و آلرژی دارند، استفاده میشود.این دارو را میتوان با معده خال مصرف کرد.این دارو برای بیماران میتلا به آسم و آلرژی	2.77		
15	خانم جباری که دچار کمبود ویتامین C شده است باید شریت آسکورییک اسید را روزی دو بار بعد از غذا و فرص زینک را همراه وعده شام مصرف کند.	خانم جباری با خورین هر نوع شریت آسکوربیک اسید، بی تواند وینامین ۲ مورد نیاز بدن را تامین کند. در این مقاله با خواص و فواید خانشده تنام بجرای بیشتر اشنا موفید خاخیدید یک گاه داروید است که در طب سیاری به عنوان مرحتف درمان بیماریها استفاده میشود. خاکشیر یکی از گیاهان داروی است که برای درمان بیماریها و بیماریهای مختلف مصرف داخش وینامین بیماری بیماری مورد نیاز بدن را فراهم کند.	2.88		
16	برای بهبود خواب، آقای شایان باید هر شب قبل از خواب یک عند قرص زولپیدم 10 مصرف کند و در صورت اضطراب، صبحها یک عند قرص آلبراز ولام با معده خالی میل نماید.	ها را باید هر شب قبل از خواب مصرف کرد. ایام نوروز برای همه ما پیش آمده است که در خانه و در جمع دوستان و اقوام به هر دلیل به جز رفتن به سر کار و یا مدرسه با مشکلاتی رویرو شدانیم. این مشکل در بسیاری از مواقع به دلیل مسائل اقتصادی و یا اجتماعی بوده است. به ممین دلیل هم ما در این مقاله قصد داریم تا به این مشکلات بیردازیم. در ادامه با ما همراه باشید تا با نکاتی که در این زمینه باید رعایت شود، آشنا شویم. در سالهای اخیر به دلیل شیوع بیماری های مختلف در کشور و خصوصا در زمان قرنطیته، آقای شایان زمایشی (لحکم)	3.09		
17	کودک هشت ساله با اوتیت میانی باید هر 8 ساعت 5 سی می شربت سفیکسیم مصرف کند و شبها قبل از خواب یک قاشق شربت دیفن هیدارمین داده شود.	کودک هشت ساله با اوتیت میانی باید هر 8 ساعت یک سیمی شریت سفیکسیم مصرف کنند. اینفوتینتوع با اوتیت میانی باید هر 8 ساعت یک سیمسی شریت سفیکسیم مصرف کنند و شیحه اقبل از خواب یک سیمی شریت سفیکسیم مصرف کنند. اینفوتینمت در هر 8 ساعت 6 سیمی شریت سفیکسیم مصرف کنند و شیحها قبل از خواب یک سیمی شریت سفیکسیم مصرف کنند. در هر 8 ساعت یک سیمی شریت سفیکسیم عصرف کنند و شیحها قبل از خواب یکسی شریت سفیکسیم	2.81		
18	خانم نظری برای رفلاکس معده باید صبحها ناشتا یک عدد قرص امپرازول و شبهها بعد از شام یک قرص فاموتیدین مصرف تماید.	خاتم نظری برای ریفادگس معده باید صبحها ناشتا یک عدد قرص فاموتیدین مصرف کند.تناب از مصرف زیاد وینامینها، مواد معدنی و املاح معدنی در رزیم غنایی، همچنین پرهنز از مصرف غناهای کم کاری و کمکالری، بهویژه در افرادی که دچار کمپید کلسیم هستند، توصیه می شود. بهطور کلی، پرهنز از مصرف زیاد ویتامینها و املاح معدنی، بهویژه کلسیم، آهن، روی، مس و روی، از مهمزدن توصیههای بهناشت فردی است. با توجه به این توصیهها، بهتر است مادران شیرده، در صورت مشاهده علائم پیماری، از مصرف زیاد ویتامین	2.78		
19	خانم نادری با سردرد مزمن باید روزی هر 6 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف کند و در صورت شدت درد، پماد موضعی منتول روی شقیقهها بمالد.	خانم تادری با سرده درمی باید روزی 8 لیوان آب بنوشد. قدور از مصرف خودسرانه دارو پرهزیر، قدور از مصرف خودسرانه دارو اجتناب شود. قدور از مصرف خودسرانه دارو خودداری شود. قدور از مصرف خودسرانه دارو پرهیز شود. قدور از مصرف خودسرانه دارو پرهیز شود. قدور از مصرف خودسرانه دارو پرهیز شود. قدور از مصرف خودسرانه دارو پرهیز شود. قدور از مصرف خودسرانه دارو پرهیز شود. قدور از مصرف خودسرانه دارو پرهیز شود. قدور از مصرف خودسرانه دارو پرهیز شود. قدور از مصرف خودسرانه دارو پرهیز شود. قدور از مصرف خودسرانه	2.81		
20	برای درمان عفونت شدید، آقای پرویزی باید روزی یک عدد قرص آزنترومایسین و هر 12 ساعت یک عدد آمپول جنتامایسین تزریقی طبق دستور پزشک دریافت کند.	یا به دست آوردن اطلاعاتی درباری بیماریهای عقوتی، علاقم بیماری را در فرد مورد بررسی قرار داده و از صحت و سقم آن اطمینان حاصل کند. در صورت مشاهده همگونه علامم بیماری، فرد باید، تحت نظر بزشک قرار بگیرد. در صورت مشاهدهی همگونه علامم بیماری باید فورا یا بزشک تصلی گرفته و نسبت به درمان آن اقدام را در صورتی کمه قدیمی مرگونه علائم بیماری، بزشک متخصص مابید به بیمار اطلاع دهد که بیمار دچا عراصتی خاصی نیست. در صورتی که فرد به بیماری خاص مینال شود، به بزشک متخصص مراجعه کند. در صورت مشاهدهی بیماری، فرد باید به مرکز کنترل و رمان مراجعه کند	2.94		
			2.863		