

Text Index	Original Text	Structured Output	Time Seconds	prompt	accuracy
1	برای درمان تب و بدن‌درد، خاتم کریمی باید هر 6 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف کند و هر 12 ساعت یک کیسول آموکسی‌سیلین 500 بعد از غذا مصرف شود.	دارو: استامینوفن 500 مگ و آموکسیسلین 500 مگ - دوز: یک قرص استامینوفن هر 6 ساعت و یک کیسول آموکسیسلین هر 12 ساعت - طریقه مصرف: استامینوفن: بعد از غذا آموکسیسلین: هر 12 ساعت بعد از غذا - (Diagnosis: Abdominal pain and flatulence) تشخیص: تب و بدن‌درد - آقای صادقی -	16.37		
2	آقای صادقی به دلیل سینوزیت حاد باید روزی یک عدد قرص آزیثرومایسین 250 به مدت سه روز همراه صبحانه مصرف کند و قطره فنتیل‌آفرین را هر 8 ساعت در هر سوراخ بینی بچکاند.	دارو: آزیثرومایسین، مقدار: 250 قرص - روژانه مصرف: یک قرص صبحانه، مدت: سه روز - داوزانه مصرف: قطره فنتیل-آفرین، مدت: هر 8 ساعت - تشخیص: سینوزیت حاد -	9.65		
3	خانم عسگری به دلیل آلرژی فصلی باید روزی دو عدد قرص سیتیزین همراه غذا مصرف کند و شب‌ها یک قاشق شربت دیفن‌هیدرامین قبل از خواب میل نماید.	نام بیمار: خانم عسگری * نوع دارو: سیتیزین (دوماهه) * دوز مصرف: دو قرص روزانه * طریقه مصرف: باقی مابقی روزانه با غذا * تشخیص بیماری: آلرژی فصلی *	8.9		
4	کودک هشت‌ساله‌ای که دچار عفونت گلو شده است باید هر 8 ساعت 5 سی‌سی شربت سفالکسین مصرف کند و هر 6 ساعت یک قاشق شربت استامینوفن برای تب تجویز شده است.	دارو: سفالکسین (5 سی‌سی هر 8 ساعت)، استامینوفن (یک قاشق هر 6 ساعت) طریقه مصرف: سفالکسین: شربت، استامینوفن: قاشق شربت تشخیص بیماری: عفونت گلو حسام است نام بیمار -	9.66		
5	آقای حسام برای رفلکس معده باید شب‌ها یک عدد قرص فاموتیدین 40 قبل از خواب و همراه ناهار یک عدد قرص رانیتیدین مصرف کند.	رفلاکس معده: فاموتیدین و رانیتیدین - طریقه مصرف: شب‌ها یک عدد قرص فاموتیدین 40 قبل از خواب و همراه ناهار یک عدد قرص رانیتیدین - تشخیص بیماری: ششانه دهنده بیماری به نام سنگ گلیه -	12.18		
6	جهت درمان سرماخوردگی، خاتم آقاچانی باید روزی سه بار قرص لوورتادین پس از غذا مصرف کند و شب‌ها قبل از خواب یک قاشق شربت دیفن‌هیدرامین نیز میل نماید.	خاتم آقاچانی - لوورتادین (دارو)، سه قرص روزانه پس از غذا - دیفن-هیدرامین (شربت)، یک قاشق شبانه قبل از خواب - سرماخوردگی (تشخیص بیماری) -	8.34		
7	خانم فرهمند با تشخیص پروشیت باید روزی یک عدد قرص آزیثرومایسین با معده خالی و هر 8 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف نماید.	نام بیمار: خانم فرهمند - نوع دارو: آزیثرومایسین (براهنه معده خالی)، استامینوفن (500 مگ) - دوز مصرف: یک قرص روزانه آزیثرومایسین، هر 8 ساعت یک قرص استامینوفن 500 مگ - طریقه مصرف: برانه معده خالی، هر 8 ساعت - تشخیص بیماری: پروشیت -	13.7		
8	برای درد مفاصل، آقای تقوی باید قرص ایبوپروفن 400 را هر 8 ساعت بعد از غذا و ناپروکسن 250 را روزی دو بار همراه یک لیوان آب میل کند.	آقای تقوی - قرص ایبوپروفن 400، نوبته هر 8 ساعت بعد از غذا - ناپروکسن 250، روزی دو بار - تشخیص: بیماری دردناک -	8.29		
9	کودک ده‌ساله‌ای که کم‌خونی دارد باید روزی یک قرص آهن همراه صبحانه و شربت آسکوربیک اسید نیز روزی دو بار برای جذب بهتر مصرف کند.	(Note: The given information is in English and has been translated to Farsi for the response.) بیمار: کودک ده ساله دارو: قرص آهن، شربت آسکوربیک اسید دوز مصرف: یک قرص صبحانه، دو بار روزانه شربت طریقه مصرف: قرص آهن صبحانه، شربت آسکوربیک اسید دو بار روزانه تشخیص بیماری: کم‌خونی نام بیمار: خانم مرادی *	11.19		
10	خانم مرادی که دچار حساسیت پوستی است باید روزی یک عدد قرص لوورتادین صبح‌ها و شب‌ها به‌مدام هیدروکورتیزون را روی نواحی آسپدیده بمالد.	نوع دارو: لوورتادین (برای حساسیت پوستی)، به‌مدام هیدروکورتیزون (برای روشن کردن وجوه‌های آفات) * دوز مصرف: یک قرص لوورتادین روزانه صبحانه و شبانه، پسته بندی وجودداشت به‌مدام هیدروکورتیزون پسته بندی * نشده و با ترکیب ماده های آب و سونده استفا آقای خلیلی -	15.9		
11	برای درمان عفونت مجاری ادراری، آقای خلیلی باید هر 12 ساعت یک عدد کیسول سفالکسین 500 و روزی سه بار قرص مترونیدازول همراه غذا مصرف نماید.	کیسول سفالکسین 500 ملیگرم، هر 12 ساعت - قرص مترونیدازول، سه بار روزانه - عفونت مجاری ادراری -	6.47		
12	خانم داری که با اسهال شدید و التهاب مواجه است باید روزی دو بار قرص لوبرامید و هر روز صبح یک عدد قرص دکرامتازون مصرف کند. مصرف مایعات فراموش نشود.	نام بیمار: خانم داری - نوع دارو: لوبرامید، دکرامتازون - دوز مصرف: دو قرص لوبرامید روزانه، یک قرص دکرامتازون صبحانه - طریقه مصرف: بین الاغزا، با استفاده از سیراز و یا دقت - تشخیص بیماری: اسهال شدید و التهاب - بیمار: کودک سه‌ساله دارو: شربت استامینوفن، شربت آبی-هیستامین دوز مصرف: هر 6 ساعت قاشق شربت استامینوفن، هر 12 ساعت قاشق شربت آبی-هیستامین طریقه مصرف: بعد از غذا تشخیص بیماری: گلودرد ویروسی	12.61		
13	کودک سه‌ساله با گلودرد ویروسی باید هر 6 ساعت یک قاشق شربت استامینوفن و هر 12 ساعت یک قاشق شربت آبی‌هیستامین بعد از غذا مصرف کند.	آقای رفیعی - فکسوفنادین (مجموع: فکسوفنادین)، دوز: 1 قرص روزانه - شربت دیفن-هیدرامین میل، دوز: 1 شربت شبانه - آلرژی تنفسی -	11.71		
14	آقای رفیعی با آلرژی تنفسی باید روزی یک عدد قرص فکسوفنادین با شکم خالی و شب‌ها قبل از خواب شربت دیفن‌هیدرامین میل کند.	نام بیمار: خانم جباری - نوع دارو: قرص ریزیک - دوز مصرف: هیچ نوع مشخص نشده در متن - طریقه مصرف: فیل‌است شام - C تشخیص بیماری: گلودرد و تناسیم -	7.64		
15	خانم جباری که دچار کمبود ویتامین C شده است باید شربت آسکوربیک اسید را روزی دو بار بعد از غذا و قرص ریزیک را همراه وعده شام مصرف کند.	نام بیمار: آقای شایان - نوع دارو: زولپیدم، آلپرازولام - دوز مصرف: یک قرص زولپیدم هر شب قبل از خواب، یک قرص آلپرازولام صبحا - طریقه مصرف: زولپیدم قبل از خواب، آلپرازولام صبحا با معده خالی میل -	8.39		
16	برای بهبود خواب، آقای شایان باید هر شب قبل از خواب یک عدد قرص زولپیدم 10 مصرف کند و در صورت اضطراب، صبح‌ها یک عدد قرص آلپرازولام با معده خالی میل نماید.	بیمار: کودک هشت‌ساله دارو: سفیکسیم (5 سی‌سی شربت هر 8 ساعت) و دیفن-هیدرامین (یک قاشق شب‌ها قبل از خواب) طریقه مصرف: سفیکسیم: هر 8 ساعت، 5 سی‌سی شربت خوردن. دیفن-هیدرامین: شب‌ها قبل از خواب یک قاشق دریافت کنند. تشخیص بیماری: اطلاعات بستگی به تشخیص بیماری در متن	11.71		
17	کودک هشت‌ساله با اوتیت میانی باید هر 8 ساعت 5 سی‌سی شربت سفیکسیم مصرف کند و شب‌ها قبل از خواب یک قاشق شربت دیفن‌هیدرامین داده شود.	نام بیمار: خانم نظری - نوع دارو و دوز مصرف: رفلاکس (امیزول و فاموتیدین)، صبحانه: 1 قرص امیزول، شب: 1 قرص فاموتیدین -	15.81		
18	خانم نظری برای رفلاکس معده باید صبح‌ها ناشتا یک عدد قرص امیزول و شب‌ها بعد از شام یک قرص فاموتیدین مصرف نماید.	نام بیمار: خانم نادری * نوع دارو: استامینوفن * مدت مصرف: هر 6 ساعت یک عدد قرص * دوز مصرف: 500 ملیگرم * طریقه مصرف: بین الماخی * تشخیص بیماری: سردرد مزمن *	7.53		
19	خانم نادری با سردرد مزمن باید روزی هر 6 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف کند و در صورت شدت درد، به‌مدام موضعی منتول روی شقیقه‌ها بمالد.	آقای پرویزی - هر یک قرص روزانه‌ای از داروی آزیثرومایسین، دوز: قرص - هر 12 ساعت یک عدد از داروی آمپول جنتامایسین، دوز: عدد - بیماری تشخیص شده بود: عفونت شدید -	9.25		
20	برای درمان عفونت شدید، آقای پرویزی باید روزی یک عدد قرص آزیثرومایسین و هر 12 ساعت یک عدد آمپول جنتامایسین تزریقی طبق دستور پزشک دریافت کند.		9.56		
			10.743		

دقت خوب نیست .
همانطور که مشاهده میکنیم، تولید بعضی از جوابهایش به زبان انگلیسی هست. اما با پرامپت جدیدی که بهش دادم و تاکید کردم که جوابمو به زبان فارسی بده ، متون انگلیسیش کمتر شده است. زبان فارسی هم خوب ترجمه نمیکند. در بیماری خوب عمل نمیکنند. در کل دقت اصلا خوب نیست. نسبت به مدل درنا بیشتر است و لحاظ زمانی هم مناسب نیست.

شما یک دستیار هوشمند هستید که باید از متن نسخه پزشکی، اطلاعات زیر را استخراج کرده و نمایش دهید. جوابی که در خروجی به من میدی به زبان فارسی باشد: نام بیمار - نوع دارو و دوز مصرفی - طریقه مصرف - تشخیص - بیماری توسط پزشک فقط همان اطلاعات را استخراج کن و هیچ توضیح اضافه نده.