Text_Index	Original_Text	Structured_Output	Time_Seconds	prompt	accuracy
		عدد قرص استامینوفن خانم کریمینوفن 500 مصرف کند و هر 12 ساعت یک عدد قرص استامینوفن خانم مصرف، توصیه،			
1	برای درمان تب و بدن درد، خانم کریمی باید هر 6 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف کند و هر 12 ساعت یک کپسول آموکسی سیلین 500 بعد از غذا مصرف شود.	نوع).	3.81		
	تپسون الوسی سیین ۱۰۰۰ بعد از عدا سود.	وسود حذا			
		عرد زیر را کن:			
2	آقای صادقی به دلیل سینوزیت حاد باید روزی یک عدد قرص آزیترومایسین 250 به مدت سه روز همراه صبحانه مصرف کند و	نام بیمار، تشخیص بیماری، داروها (نام، دوز، نحوه مصرف، توصیه، نوع).	4.06		
2	قطره فنیل افرین را هر 8 ساعت در هر سوراخ بینی بچکاند.	نام بيفار، نسخييس بيفاري، درونف (نام، دور، تحوه مصرف، توطيب، توم).	4.00		
		قرص آزیترومایسین 250 ب			
3	خانم عسگری به دلیل آلرژی فصلی باید روزی دو عدد قرص سیتریزین همراه غذا مصرف کند و شبها یک قاشق شریت	جوری بیماری، دویرکی نوع.	3.42		
	ديفنهيدرامين قبل از خواب ميل نمايد.	ول حیا نماید براید روزی دو عدد قرص سیتریزین همراه غذا مصرف کند و شبها یک قاش	5.42		
4	کودک هفت سالهای که دچار عقونت گو شده است باید هر 8 ساعت 5 سیسی شربت سفالکسین مصرف کند و هر 6 ساعت یک قاشق شربت استامیوفی برای تب تجویز شده است.	تورین تنسخ اند بیمار، تورین بیماری، داروها برای تورین کن خواعات زیر را استخراج کن:	3.11		
		کودک هفتسالهای که دج			
		تورت همت سادای تا دی تماتناد بیمار، تشخیص بیماری، داروها بیماری، دوز، نوع).			
5	آقای حسام برای رفلاکس معده باید شبها یک عدد قرص فاموتیدین 40 قبل از خواب و همراه ناهار یک عدد قرص رانیتیدین مصرف کند.		3.18		
	المقبرات فتناد	تیری بیمار، تشخیص بیماری، داروها بیماری، دو بضار ریان ک در شرب باشهی رماری بکخرامین نحوه بکخرامین ناقص:			
6	جهت درمان سرماخوردگی، خانم آفاجانی باید روزی سه بار قرص لوراتادین بس از غذا مصرف کند و شبها قبل از خواب یک	بصار ریان ک در سرب باسایی زماری بدخراهی تحوه بدخراهین تافض:	3.08		
	قاشق شربت دیفنهیدرامین نیز میل نماید.	خانی نحوه مصرف، توصیه، نوعیها بکخرامین ن	5.00		i l
7	خانم فرهمند با تشخیص برونشیت باید روزی یک عدد قرص آزیترومانسین با معده خالی و هر 8 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف نماید.	شی عن حید بنشف زیر را زیر خاحای نحوه مصرف، توصیه، داروها (نام، دوز، نحوه مصرف، توصیه، نوع).	3.06		
		است زامين 🗵			
		حسر خلم من ناقد زرونا پنام، دوروها.			
	برای درد مفاصل، آقای تقوی باید قرص ایبوبروفن 400 را هر 8 ساعت بعد از غذا و ناپروکسن 250 را روزی دو بار همراه یک				
8	ليوان آب ميل كند.	رستمان خلم من ناقای ناقد زرونا پنام، دوروها.	3.08	لطفأ اطلاعات زير	
	· ·	قرص حسر خلم من ناقاي ناقد 🛚		را استخراج کن: نام بیمار، تشخیص بیماری، داروها	
9	کودک دهسالهای که کمخونی دارد باید روزی یک قرص آهن همراه صبحانه و شریت آسکوربیک اسید نیز روزی دو بار برای جذب	مشد حاد علی نولی کرات روزی کن ناقص آهن همراه صبحانه و شربت آسکوربیک اسید نیز روزی دو بار برای جذب بهتر مصر 🗈	3.22		همینطور که
	بهتر مصرف کند.	ولا يقاری داديت پزشکی ناقص عدد روزی روی نواحی آسيبديده بمالد.			مشاهده میکنید،
10	خانم مرادی که دچار حساسیت پوستی است باید روزی یک عدد قرص لوراتادین صبحها و شبها پماد هیدروکورتیزون را روی		3.01	(نام، دوز، نحوه	دقت مدل خیلی
	نواحی آسیبدیده بمالد.	روزی بیماری، داروها روی نوع کزی عدد ق		مصرف، توصيه،	بد است
11	برای درمان عفونت مجاری ادراری، آقای خلیلی باید هر 12 ساعت یک عدد کپسول سفالکسین 500 و روزی سه بار قرص مترونیدازول همراه غذا مصرف نماید.	وایدران عمات دراری، أرای، دناید باید هول سوریه غذا بیماری، دناید باید هول زوطریه خلیلی باید هول سوریه غذا	2.99	نوع). پاسخ:	٠.٠٠٠
12	خانم داوری که با اسهال شدید و التهاب مواجه است باید روزی دو بار قرص لوپرامید و هر روز صبح یک عدد قرص دگزامتازون	and the first of	3.06		
12	مصرف کند. مصرف مایعات فراموش نشود.	رای نفی داروها فییان بارها شکی و افی داروها فییان بارها شکی و شی داروها فییان بارها شکی و شی داروها فییان بارها ش	3.00	پىتى.	
	کودک سه ساله با گلودرد وبروسی باید هر 6 ساعت یک قاشق شربت استامینوفن و هر 12 ساعت یک قاشق شربت	شخاد:			
13	آنتي هيستامين بعد از غذا مصرف كند.	اشخاراج زودکی ستامینوفن و هر 11 ساعت یک قاشق شریت استامینوفن و هر 12 ساعت یک قاشق شریت آنتی هیستامین بعد	3.21		
		Z1			
14	آقای رفیعی با آلرژی تنفسی باید روزی یک عدد قرص فکسوفنادین با شکم خالی و شبها قبل از خواب شربت دیفنهیدرامین میل کند.	ققاور دفقور قاور دوزین باید روزی یک عدد قرص فکسوفنادین با شکم خالی و شبها قبل از خواب شربت دیفن هیدرامین م 🛚	3.75	- 1	
15	خانم جباری که دچار کمبود ویتامین C شده است باید شریت آسکوربیک اسید را روزی دو بار بعد از غذا و قرص زینک را همراه	نحوه نوع و توصیه، نوع نوع و توصیه، توصیه، توصیه، توصیه، نوع نوع و توصیه، نوع نوع و توصیه، نوع و توص	3.07		
13	وعده شام مصرف کند.		3.07		
		نامارت ازتاب میل نماید و نوع قبل عدد میل نوع.			
		پاسخ:			
16	برای بهبود خواب، آقای شایان باید هر شب قبل از خواب یک عدد قرص زولبیدم 10 مصرف کند و در صورت اضطراب،		3.45		
10	صبحها يک عدد قرص آلپرازولام با معده خالی میل نماید.	نام، دوز، و نوع مصرف، توصیه، نوع.	3.43		
		پاسخ:			
		ma 1 11			
	کودک هشتساله با اوتیت میانی باید هر 8 ساعت 5 سیسی شریت سفیکسیم مصرف کند و شبها قبل از خواب یک قاشق	نام بیماری، تش ∑ کودک هشتساله با اوتیت میانی باید هر 8 ساعت 5 سیسی شربت سفیکسیم مصرف کند و شبها قبل از خواب یک قاشق			
17	و في المساوية : الربيع البياني بربية الربيع المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية الم المربت ديفن هيدرامين داده شود.	شریت دی	2.99		
18	خانم نظری برای رفلاکس معده باید صبحها ناشتا یک عدد قرص امپرازول و شبها بعد از شام یک قرص فاموتیدین مصرف	حما بضوری بیمار، بیماری، داروها (نام، دوز، نحوه مصرف، توصیه، نوع).	3		
10	نماید.	حما بن	3		
19	خانم نادری با سردرد مزمن باید روزی هر 6 ساعت یک عند قرص استامینوفن 500 مصرف کند و در صورت شدت درد، پماد	ومقان بیماری بیماری، تشخیص بیماری، توصیه، نوع بیماری، توصیه، نوع بیماری، توصیه، نوع بیماری، تو 🗉	2.97		
13	موضع منتول روى شقيقه ها بمالد.	وسان بیماری نیماری مستقف نیساری، توصیت می بیساری، توصیت می بیساری، توصیت می بیساری، تو	2.31		
20	برای درمان عفونت شدید، آقای پرویزی باید روزی یک عدد قرص آزیترومایسین و هر 12 ساعت یک عدد آمپول جنتامایسین تزریق طبق دستور یزشک دریافت کند.	حجراج ام،رق استراج شخلاع زیر را خلاعات زیر را 🛚	3.42		
	· - 4: - 641 · M. 13-41		3.247		