

[illegible]

15	خانم چبازی که دچار کمبود ویتامین C شده است باید شربت آسکوربیک اسید را روزی دو بار بعد از غذا و قرص زینک را همراه وعده شام مصرف کند.	فرمت خروجی # ... :نام بیماری ... :مشوریار ... :نوع بیماری ... :اسم دارو [توضیح فرمت کرار کمبود شربت آسکوربیک اسید را رو الجد نسخه خالی نماید میل نماید میل کنتیار.	3.21
16	برای بهبود خواب، آقای شایان باید هر شب قبل از خواب یک عدد قرص زولپیدم 10 مصرف کند و در صورت اضطراب، صبحها یک عدد قرص آلپرازولام با معده خالی میل نماید.	وجد مناست خلاید: الوجد مناست خلاید: استخراج: استخراج خلاید مصرف: خلا	3.27
17	کودک هشتساله با اوتیت میانی باید هر 8 ساعت 5 سی سی شربت سفیکسیم مصرف کند و شبها قبل از خواب یک قاشق شربت دیفن‌هیدرامین داده شود.	وخار: من پیرص بن پیرص بن شود حفاجد خروجیم فرمت خروجی درخواستشده را ارائه بده. بخد خروجیزیر درخواستشده را ار	3.29
18	خانم نظری برای رفلاکس معده باید صبحها ناشتا یک عدد قرص امپرازول و شبها بعد از شام یک قرص فاموتیدین مصرف نماید.	همشرای بنویس: ... ... :نوع: ... هماری بنویس: ... ناپنده بنویس: ... هماری بنویس: ... اسم دارو: ... نحوه مصرف: ... توصیه: ... هماری بنو [B]	3.16
19	خانم نادری با سردرد مزمن باید روزی هر 6 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف کند و در صورت شدت درد، پماد موضعی منتول روی شقیقه‌ها بمالد.	وشتقید و منتول روی شقیقه‌ها بمالد.	3.18
20	برای درمان عفونت شدید، آقای پرویزی باید روزی یک عدد قرص آزیترومایسین و هر 12 ساعت یک عدد آمپول جنتامایسین تزریقی طبق دستور پزشک دریافت کند.	تشیورد شرد، بند قداشی یجود یزار، هراتا بده فصارشده بند اطلاعات یشده ارائه ارائه دد آمپول عفونت شدید، آمپول عدد قرص آزیترومایسین تزریقی طبق دستور پزشک دریافت کند # ... :اسم دارو مصرف # و	3.59
			3.2555