

Text_index	Original Text	Structured Output	Time_Seconds	mean time of each prompts	prompts	accuracy
1	برای درمان تب و بدن‌درد، خانم کربی باید هر 6 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف کند و هر 12 ساعت یک کیسول آموکسی‌سیلین 500 بعد از غذا مصرف شود.	نام بیمار: خانم کربی داروها و دوز مصرفی: - استامینوفن: 500 میلی‌گرم، 6 ساعت یک بار - آموکسی‌سیلین: 500 میلی‌گرم، 12 ساعت یک بار طریقه مصرف: - استامینوفن: بدون نیاز به غذا - آموکسی‌سیلین: بعد از غذا تشخیص: بیماری: تب و بدن‌درد	8.04			
2	آقای صادق به دلیل سینوزیت حاد باید روزی یک عدد قرص آرترومایسین 250 به مدت سه روز همراه صبحانه مصرف کند و قطره فیل‌آفرین را هر 8 ساعت در هر سوراخ بینی بچکاند.	نام بیمار: آقای صادق داروها و دوز مصرفی: - آرترومایسین: 250 میلی‌گرم، یک بار در روز، همراه با صبحانه، به مدت سه روز - فیل‌آفرین: قطره در هر سوراخ بینی، هر 8 ساعت یک بار طریقه مصرف: - آرترومایسین: همراه با غذا مصرف کنید. - فیل‌آفرین: قطره را مستقیماً در هر سوراخ بینی قرار دهید. تشخیص: بیماری: سینوزیت حاد	7.74			
3	خانم حسگری به دلیل آرتزی فصلی باید روزی دو عدد قرص سیتیزین همراه غذا مصرف کند و شب‌ها یک فاشق شربت دیفن‌هیدرامین قبل از خواب میل نماید.	نام بیمار: خانم حسگری داروها و دوز مصرفی: - سیتیزین: 2 قرص در روز - دیفن‌هیدرامین: 1 فاشق شربت قبل از خواب طریقه مصرف: - سیتیزین: همراه غذا مصرف شود - دیفن‌هیدرامین: قبل از خواب مصرف شود تشخیص: بیماری: آرتزی فصلی	6.07			
4	کودک هفت‌ساله‌ای که دچار عفونت گلو شده است باید هر 8 ساعت 5 سی‌سی شربت سفالکسین مصرف کند و هر 6 ساعت یک فاشق شربت استامینوفن برای تب تجویز شده است.	نام بیمار: کودک هفت‌ساله‌ای داروها و دوز مصرفی: - سفالکسین: 5 سی‌سی، هر 8 ساعت یک بار - استامینوفن: 1 فاشق، هر 6 ساعت یک بار طریقه مصرف: - سفالکسین: شربت - استامینوفن: شربت تشخیص: بیماری: عفونت گلو	5.82			
5	آقای حسام برای رفلکس معده باید شب‌ها یک عدد قرص فاموتیدین 40 قبل از خواب و همراه ناهار یک عدد قرص رانیتیدین مصرف کند.	نام بیمار: آقای حسام داروها و دوز مصرفی: - فاموتیدین: 40 میلی‌گرم، یک عدد قبل از خواب - رانیتیدین: یک عدد، همراه ناهار طریقه مصرف: - فاموتیدین: قبل از خواب - رانیتیدین: همراه ناهار تشخیص: بیماری: رفلکس، معده	5.81			
6	جهت درمان سرماخوردگی، خانم آقاچانی باید روزی سه بار قرص لوئتانیدین پس از غذا مصرف کند و شب‌ها قبل از خواب یک فاشق شربت دیفن‌هیدرامین نیز میل نماید.	نام بیمار: خانم آقاچانی داروها و دوز مصرفی: - قرص لوئتانیدین: 3 بار در روز، پس از غذا - شربت دیفن‌هیدرامین: 1 فاشق در شب، قبل از خواب طریقه مصرف: - قرص لوئتانیدین: پس از غذا - شربت دیفن‌هیدرامین: قبل از خواب تشخیص: بیماری: سرماخوردگی	6.73			
7	خانم فرهنگند با تشخیص برنشی‌ت باید روزی یک عدد قرص آرترومایسین با معده خالی و هر 8 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف نماید.	نام بیمار: خانم فرهنگند داروها و دوز مصرفی: - آرترومایسین: 1 عدد قرص، یک بار در روز، با معده خالی - استامینوفن: 1 عدد قرص 500 میلی‌گرم، هر 8 ساعت یک بار طریقه مصرف: - آرترومایسین: با معده خالی - استامینوفن: ی‌آلود، با یا بدون غذا مصرف شود تشخیص: بیماری: برنشی‌ت	7.04			
8	برای درد مفاصل، آقای تقوی باید قرص ایبوپروفن 400 را هر 8 ساعت بعد از غذا و تا‌بروکسن 250 را روزی دو بار همراه یک لیوان آب میل کند.	نام بیمار: آقای تقوی داروها و دوز مصرفی: - ایبوپروفن 400 میلی‌گرم، هر 8 ساعت بعد از غذا - تا‌بروکسن 250 میلی‌گرم، دو بار در روز طریقه مصرف: همراه یک لیوان آب تشخیص: بیماری: درد مفاصل	4.86			
9	کودک دهم‌ساله‌ای که کم‌خونی دارد باید روزی یک قرص آهن همراه صبحانه و شربت آسکوربیک اسید نیز روزی دو بار برای جذب بهتر مصرف کند.	نام بیمار: کودک دهم‌ساله‌ای داروها و دوز مصرفی: - قرص آهن: یک قرص در صبح - شربت آسکوربیک اسید: دو بار در روز طریقه مصرف: - قرص آهن را همراه با صبحانه مصرف کنید. - شربت آسکوربیک اسید را دو بار در روز میل کنید. تشخیص: بیماری: کم‌خونی	5.89			
10	خانم مرادی که دچار حساسیت پوستی است باید روزی یک عدد قرص لوئتانیدین صبح‌ها و شب‌ها به‌اد هیدروکورتیزون را روزی نواحی آسیب‌دیده به‌الده.	نام بیمار: خانم مرادی داروها و دوز مصرفی: - قرص لوئتانیدین: 1 عدد، صبح و شب - هیدروکورتیزون: روی نواحی آسیب‌دیده، طریقه مصرف مشخص نشده است. تشخیص: بیماری: حساسیت پوستی	4.6			
11	برای درمان عفونت مجاری ادراری، آقای خلیلی باید هر 12 ساعت یک عدد کیسول سفالکسین 500 و روزی سه بار قرص مترونیدازول همراه غذا مصرف نماید.	نام بیمار: آقای خلیلی داروها و دوز مصرفی: - سفالکسین: 1 کیسول 500 میلی‌گرم، هر 12 ساعت یک بار - مترونیدازول: 3 قرص، سه بار در روز همراه غذا طریقه مصرف: - سفالکسین: با آب کافی مصرف کنید - مترونیدازول: همراه غذا مصرف کنید تشخیص: بیماری: عفونت مجاری ادراری	7			
12	خانم داوی که با اسهال شدید و التهاب مواجه است باید روزی دو بار قرص لوپرامید و هر روز صبح یک عدد قرص دگزامتازون مصرف کند. مصرف مایعات فراموش نشود.	نام بیمار: خانم داوی داروها و دوز مصرفی: - لوپرامید: 2 قرص در روز، به صورت دو بار در روز مصرف شود. - دگزامتازون: 1 قرص در روز، صبح مصرف شود. طریقه مصرف: - لوپرامید: با یک لیوان آب مصرف شود. - دگزامتازون: با یک لیوان آب مصرف شود. تشخیص: بیماری: اسهال شدید و التهاب	6.82			
13	کودک هشت‌ساله با گلودرد ویروسی باید هر 6 ساعت یک فاشق شربت استامینوفن و هر 12 ساعت یک فاشق شربت آنتی‌هیستامین 1 فاشق شربت، هر 12 ساعت یک بار مصرف کند.	نام بیمار: کودک هشت‌ساله داروها و دوز مصرفی: - استامینوفن: 1 فاشق شربت، هر 6 ساعت یک بار - آنتی‌هیستامین: 1 فاشق شربت، هر 12 ساعت یک بار طریقه مصرف: - استامینوفن: بعد از غذا - آنتی‌هیستامین: بعد از غذا تشخیص: بیماری: گلودرد ویروسی	6.69			
14	آقای رضی با آرتزی تنفسی باید روزی یک عدد قرص فکسوفنادین با شکم خالی و شب‌ها قبل از خواب شربت دیفن‌هیدرامین میل کند.	نام بیمار: آقای رضی داروها و دوز مصرفی: - فکسوفنادین (یک قرص) و دیفن‌هیدرامین (شربت) طریقه مصرف: فکسوفنادین را با شکم خالی و دیفن‌هیدرامین را شب قبل از خواب مصرف کنید. تشخیص: بیماری: آرتزی تنفسی	5.39			
15	خانم جباری که دچار کمبود ویتامین C شده است باید شربت آسکوربیک اسید را روزی دو بار بعد از غذا و قرص زینک را همراه وعده شام مصرف کند.	نام بیمار: خانم جباری داروها و دوز مصرفی: - شربت آسکوربیک اسید: روزی دو بار بعد از غذا - قرص زینک: همراه وعده شام طریقه مصرف: - شربت آسکوربیک اسید: بعد از غذا - قرص زینک: همراه وعده شام تشخیص: بیماری: کمبود ویتامین C	6.04			
16	برای بهبود خواب، آقای شایان باید هر شب قبل از خواب یک عدد قرص زولپیدم 10 مصرف کند و در صورت اضطراب، صبح‌ها یک عدد قرص آلپرازولام با معده خالی میل نماید.	نام بیمار: آقای شایان داروها و دوز مصرفی: - زولپیدم: 10 میلی‌گرم، یک بار در شب - آلپرازولام: 0.25 میلی‌گرم، یک بار در صبح طریقه مصرف: - زولپیدم: قبل از خواب با یک لیوان آب مصرف شود - آلپرازولام: با معده خالی مصرف گردد تشخیص: بیماری: اضطراب و خواب	7.02			

مدل با پرامپت روبرو در تولید جوابش گاهی توضیحات تکراری دارد و بخاطر پرامیتی که دادیم و بهش نگفتیم که دارو ها را تفکیک کنه ،اطلاعات داروها را جداگانه نوشته است.

شما یک دستیار پزشکی هستید. لطفاً فقط اطلاعات زیر را استخراج کن و هیچ توضیح اضافی نده:   
- نام بیمار   
- داروها و دوز مصرفی   
- طریقه مصرف   
- تشخیص بیماری   
فقط همین اطلاعات را بده.

6.3285

نام بیمار: کودک هشت ساله داروها و دوز مصرفی: - سلیکسیم: 5 سی، هر 8 ساعت یک بار - دین‌هیدرامین: یک قاشق، شب قبل از خواب طریفه مصرفی: - سلیکسیم: به صورت دهانی مصرف شود - دین‌هیدرامین: به صورت دهانی مصرف شود، قبل از خواب تشخیص بیماری: اوتیت میانی	6.57	کودک هشت‌ساله با اوتیت میانی باید هر 8 ساعت 5 سی‌سی شربت سلیکسیم مصرف کند و شب‌ها قبل از خواب یک قاشق شربت دین‌هیدرامین داده شود.	17
نام بیمار: خانم نظری داروها و دوز مصرفی: - امپروژول: 1 قرص ناشتا - فاموتیدین: 1 قرص بعد از شام طریفه مصرفی: - امپروژول: ناشتا - فاموتیدین: بعد از شام تشخیص بیماری: رفلکس معده	5.33	خانم نظری برای رفلکس معده باید صبح‌ها ناشتا یک عدد قرص امپروژول و شب‌ها بعد از شام یک قرص فاموتیدین مصرف نماید.	18
نام بیمار: خانم نادری داروها و دوز مصرفی: - استامنیوفن: 500 میلی‌گرم، یک بار در روز، هر 6 ساعت یک عدد - پماد موضعی متنول: در صورت نیاز، روی شقیقه‌ها بمالید طریفه مصرفی: - استامنیوفن: با یک لیوان آب میل کنید - پماد موضعی متنول: به آرامی روی شقیقه‌ها بمالید تشخیص بیماری: سردرد مزمن	7.46	خانم نادری با سردرد مزمن باید روزی هر 6 ساعت یک عدد قرص استامنیوفن 500 مصرف کند و در صورت شدت درد، پماد موضعی متنول روی شقیقه‌ها بمالد.	19
نام بیمار: آقای پرویزی داروها و دوز مصرفی: - آرترومایسین: 1 قرص در روز - جنتامایسین: 1 آمپول 12 ساعته طریفه مصرفی: - آرترومایسین: مصرف خوراکی - جنتامایسین: تزریق داخل وریدی تشخیص بیماری: عفونت شدید	5.65	برای درمان عفونت شدید، آقای پرویزی باید روزی یک عدد قرص آرترومایسین و هر 12 ساعت یک عدد آمپول جنتامایسین تزریقی طبق دستور پزشک دریافت کند.	20
نام بیمار: خانم کریمی تشخیص بیماری: تب و بدن‌درد --- اسم دارو: استامنیوفن دوز: 500 میلی‌گرم نحوه مصرف: قرص، هر 6 ساعت یک عدد توصیه: بعد از غذا مصرف شود نوع خد درد، ضد التهاب --- اسم دارو: آموکسی‌سیلین دوز: 500 میلی‌گرم نحوه مصرف: کپسول، هر 12 ساعت یک عدد توصیه: بعد از غذا مصرف شود نوع آنتی‌بیوتیک	8.51	1 برای درمان تب و بدن‌درد، خانم کریمی باید هر 6 ساعت یک عدد قرص استامنیوفن 500 مصرف کند و هر 12 ساعت یک کپسول آموکسی‌سیلین 500 بعد از غذا مصرف شود.	1
نام بیمار: آقای صادق تشخیص بیماری: سینوزیت حاد --- اسم دارو: آرترومایسین دوز: 250 میلی‌گرم نحوه مصرف: یک عدد در روز، همراه با صبحانه، به مدت سه روز توصیه: مصرف روزانه یک عدد قرص نوع خوراکی اسم دارو: فیل‌فرین دوز: نامشخص نحوه مصرف: قطره در هر سوراخ بینی، هر 8 ساعت یک بار توصیه: برای تسکین علائم سینوزیت نوع قطره بینی	9.03	2 آقای صادق به دلیل سینوزیت حاد باید روزی یک عدد قرص آرترومایسین 250 به مدت سه روز همراه صبحانه مصرف کند و قطره فیل‌فرین را هر 8 ساعت در هر سوراخ بینی بچکاند.	2
نام بیمار: خانم عسکری تشخیص بیماری: آلرژی فصلی --- اسم دارو: ستیریزین دوز: دو عدد قرص نحوه مصرف: همراه غذا توصیه: روزانه نوع قرص اسم دارو: دین‌هیدرامین دوز: یک قاشق شربت نحوه مصرف: قبل از خواب توصیه: شبانه نوع شربت نوع اطلاعات را می‌توانید برای پیگیری درمان خانم عسکری استفاده کنید.	8.12	3 خانم عسکری به دلیل آلرژی فصلی باید روزی دو عدد قرص ستیریزین همراه غذا مصرف کند و شب‌ها یک قاشق شربت دین‌هیدرامین قبل از خواب میل نماید.	3
نام بیمار: کریمی 7 ساله تشخیص بیماری: عفونت گلو --- اسم دارو: سفالکسین دوز: 5 سی‌سی نحوه مصرف: هر 8 ساعت توصیه: مصرف شربت نوع آنتی‌بیوتیک اسم دارو: استامنیوفن دوز: یک قاشق نحوه مصرف: هر 6 ساعت توصیه: برای کاهش تب نوع داروی ضد درد و تب	7.35	4 کودک هفت‌ساله‌ای که دچار عفونت گلو شده است باید هر 8 ساعت 5 سی‌سی شربت سفالکسین مصرف کند و هر 6 ساعت یک قاشق شربت استامنیوفن برای تب تجویز شده است.	4
نام بیمار: آقای حسام تشخیص بیماری: رفلکس معده --- اسم دارو: فاموتیدین دوز: 40 میلی‌گرم نحوه مصرف: یک عدد قبل از خواب توصیه: مصرف منظم نوع قرص --- اسم دارو: رانیتیدین دوز: 150 میلی‌گرم نحوه مصرف: یک عدد همراه ناهار توصیه: مصرف منظم نوع قرص	7.02	5 آقای حسام برای رفلکس معده باید شب‌ها یک عدد قرص فاموتیدین 40 قبل از خواب و همراه ناهار یک عدد قرص رانیتیدین مصرف کند.	5
نام بیمار: خانم آقاجانی تشخیص بیماری: سرماخوردگی --- اسم دارو: لوئادین دوز: یک قرص نحوه مصرف: پس از غذا توصیه: سه بار در روز نوع قرص --- اسم دارو: دین‌هیدرامین دوز: یک قاشق نحوه مصرف: قبل از خواب توصیه: یک بار در شب نوع شربت	6.76	6 جهت درمان سرماخوردگی، خانم آقاجانی باید روزی سه بار قرص لوئادین پس از غذا مصرف کند و شب‌ها قبل از خواب یک قاشق شربت دین‌هیدرامین نیز میل نماید.	6

7	خاتم فرهندند با تشخیص بروشیت باید روزی یک عدد قرص آرترومیسین با معده خالی و هر 8 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف نماید.	نام بیمار: خاتم فرهندند تشخیص بیماری: بروشیت ... اسم دارو: آرترومیسین دوز: 1 عدد قرص نحوه مصرف: با معده خالی توصیه: روزانه یک بار نوع آنالیز: پوئیک ... اسم دارو: استامینوفن دوز: 1 عدد قرص 500 میلی گرم نحوه مصرف: با معده خالی توصیه: هر 8 ساعت یک عدد نوع داروی ضد درد و کاهش دهنده تب نام بیمار: آقای تقوی تشخیص بیماری: درد مفاصل ... اسم دارو: ایبuprofen دوز: 400 میلی گرم نحوه مصرف: هر 8 ساعت بعد از غذا، همراه با یک لیوان آب توصیه: مصرف منظم و طبق برنامه نوع قرص ... اسم دارو: ناپروکسن دوز: 250 میلی گرم نحوه مصرف: دو بار در روز، همراه با یک لیوان آب توصیه: رعایت فاصله زمانی بین مصرف دو دارو نوع قرص
8	برای درد مفاصل، آقای تقوی باید قرص ایبوپروفن 400 هر 8 ساعت بعد از غذا و ناپروکسن 250 را روزی دو بار همراه یک لیوان آب میل کند.	نام بیمار: کودک ده ساله تشخیص بیماری: کم خونی ... اسم دارو: قرص آهن دوز: یک قرص در روز نحوه مصرف: همراه با صبحانه توصیه: مصرف روزانه نوع مکمل غذایی ... اسم دارو: شربت آسکوربیک اسید دوز: دو بار در روز نحوه مصرف: برای بهبود جذب آهن توصیه: مصرف روزانه نوع مکمل ویتامین
9	کودک دهمساله‌ای که کم‌خونی دارد باید روزی یک قرص آهن همراه صبحانه و شربت آسکوربیک اسید نیز روزی دو بار برای جذب بهتر مصرف کند.	نام بیمار: خاتم مرادی تشخیص بیماری: حساسیت یوسی ... اسم دارو: لوئوتائین دوز: یک قرص نحوه مصرف: صبح و شب توصیه: مصرف روزانه نوع ضد حساسیت ... اسم دارو: هیدروکورتیزون دوز: نامشخص نحوه مصرف: مایع روی نواحی آسیب‌دیده توصیه: چند بار در روز نوع کورتیکواستروئید
10	خاتم مرادی که دچار حساسیت یوسی است باید روزی یک عدد قرص لوئوتائین صبح‌ها و شب‌ها پماد هیدروکورتیزون را روی نواحی آسیب‌دیده بمالد.	نام بیمار: آقای حلیلی تشخیص بیماری: عفونت مجاری ادراری ... اسم دارو: سفالکسین دوز: 500 میلی گرم نحوه مصرف: کیسوله، هر 12 ساعت یک عدد توصیه: همراه غذا مصرف شود نوع آنالیز: پوئیک ... اسم دارو: مترونیدازول دوز: قرص، سه بار در روز نحوه مصرف: همراه غذا مصرف شود توصیه: به مدت 7 روز مصرف شود نوع آنالیز: پوئیک
11	برای درمان عفونت مجاری ادراری، آقای حلیلی باید هر 12 ساعت یک عدد کیسول سفالکسین 500 و روزی سه بار قرص مترونیدازول همراه غذا مصرف نماید.	نام بیمار: خاتم داوری تشخیص بیماری: اسهال شدید و التهاب ... اسم دارو: لوبریپاید دوز: روزی دو بار، یک عدد نحوه مصرف: قرص توصیه: مصرف مایعات را فراموش نکنید. نوع ضد اسهال ... اسم دارو: دگزامتازون دوز: روزی یک عدد، صبح نحوه مصرف: قرص توصیه: مصرف مایعات را فراموش نکنید. نوع کورتیکواستروئید نام بیمار: کودک سه‌ساله تشخیص بیماری: گلودرد ویروسی
12	خاتم داوری که با اسهال شدید و التهاب مواجه است باید روزی دو بار قرص لوبریپاید و هر روز صبح یک عدد قرص دگزامتازون مصرف کند. مصرف مایعات فراموش نشود.	اسم دارو: استامینوفن دوز: یک فاشق نحوه مصرف: هر 6 ساعت نحوه مصرف: بعد از غذا نوع شربت اسم دارو: آنتی‌هیستامین دوز: یک فاشق نحوه مصرف: هر 12 ساعت توصیه: بعد از غذا نوع شربت
13	کودک سه‌ساله با گلودرد ویروسی باید هر 6 ساعت یک فاشق شربت استامینوفن و هر 12 ساعت یک فاشق شربت آنتی‌هیستامین بعد از غذا مصرف کند.	نام بیمار: آقای رفیعی تشخیص بیماری: آلرژی تنفسی ... اسم دارو: فکسوفنادین دوز: یک قرص نحوه مصرف: با شکم خالی توصیه: شب‌ها قبل از خواب نوع قرص ... اسم دارو: دیفن‌هیدرامین دوز: شربت نحوه مصرف: با شکم خالی توصیه: شب‌ها قبل از خواب نوع شربت
14	آقای رفیعی با آلرژی تنفسی باید روزی یک عدد قرص فکسوفنادین با شکم خالی و شب‌ها قبل از خواب شربت دیفن‌هیدرامین میل کند.	نام بیمار: خاتم جباری تشخیص بیماری: کمبود ویتامین C ... اسم دارو: شربت آسکوربیک اسید دوز: نامشخص نحوه مصرف: دو بار در روز بعد از غذا توصیه: مصرف منظم نوع مکمل ویتامین ... اسم دارو: قرص زینک دوز: نامشخص نحوه مصرف: همراه وعده شام توصیه: مصرف منظم نوع مکمل معدنی
15	خاتم جباری که دچار کمبود ویتامین C شده است باید شربت آسکوربیک اسید را روزی دو بار بعد از غذا و قرص زینک را همراه وعده شام مصرف کند.	

تو یک دستیار پزشکی هستی. اطلاعات نسخه زیر را دقیقاً با فرمت مشخص‌شده استخراج کن. فقط خروجی درخواست‌شده را ارائه بده. اگر اطلاعات وجود نداشته، بنویس "نامشخص".

#### فرمت خروجی:  
نام بیمار: ...  
تشخیص بیماری: ...

اسم دارو: ...  
دوز: ...  
نحوه مصرف: ...  
توصیه: ...  
نوع: ...  
(تکرار برای هر دارو)

مدل با پرامیت رویرو در تولید جوابش گاها توضیحات تکراری دارد. در بعضی از نسخه ها هم توصیه های دو دارو را مثل همدیگه نوشته که اشتباهه. یا مثلا در نسخه 5 ، دوز رانیتیدین را نداشته اما مدل از خودش عدد 150 میلی گرم را در آورده و نوشته.

			نام بیمار: آقای شایان تشخیص بیماری: تاملشخص ----- اسم دارو: زولپیدم دوز: 10 میلی گرم نحوه مصرف: یک عدد هر شب قبل از خواب توضیح: مصرف منظم و طبق برنامه نوع خواب: نور اسم دارو: آلزولام دوز: 1 میلی گرم نحوه مصرف: یک عدد صبح‌ها با معده خالی توضیح: در صورت بروز اضطراب نوع ضد اضطراب	8.13			برای بهبود خواب، آقای شایان باید هر شب قبل از خواب یک عدد قرص زولپیدم 10 مصرف کند و در صورت اضطراب، صبح‌ها یک عدد قرص آلزولام با معده خالی میل نماید.	16
		نام بیمار: کودک هشت ساله تشخیص بیماری: اوتیسم ----- اسم دارو: سلیکسیم دوز: 5 سی سی نحوه مصرف: هر 8 ساعت یک بار توضیح: مصرف ثابت سلیکسیم را به مدت چند روز ادامه دهید. نوع شربت اسم دارو: دیفن‌هیدرامین دوز: یک قاشق نحوه مصرف: قبل از خواب توضیح: برای کمک به خوابیدن کودک، یک قاشق شربت دیفن‌هیدرامین قبل از خواب مصرف کنید. نوع شربت	9.3				کودک هشت‌ساله با اوتیسم میانی باید هر 8 ساعت 5 سی‌سی شربت سلیکسیم مصرف کند و شب‌ها قبل از خواب یک قاشق شربت دیفن‌هیدرامین داده شود.	17
		نام بیمار: خانم نظری تشخیص بیماری: رلاکسی معده ----- اسم دارو: اموزول دوز: یک عدد قرص نحوه مصرف: ناشتا توضیح: روزانه نوع قرص ----- اسم دارو: فاموتیدین دوز: یک قرص نحوه مصرف: بعد از شام توضیح: روزانه نوع قرص این نسخه شامل دو دارو است که هر کدام برای زمان‌های مختلف روز تجویز شده‌اند. نام بیمار: خانم نادری تشخیص بیماری: سردرد مزمن ----- اسم دارو: استامینوفن دوز: 500 میلی گرم نحوه مصرف: قرص، یک عدد، هر 6 ساعت یک بار توضیح: در صورت نیاز، بعد از پاد موضعی متول روی شقیقه‌ها بمالید. نوع داروی بدون نسخه	7.67				خانم نظری برای رلاکسی معده باید صبح‌ها ناشتا یک عدد قرص اموزول و شب‌ها بعد از شام یک قرص فاموتیدین مصرف نماید.	18
		نام بیمار: آقای پرویزی تشخیص بیماری: عفونت شدید ----- <span> </span> اسم دارو: آزیثرومایسین دوز: 1 قرص در روز نحوه مصرف: با آب مصرف کنید توضیح: طبق دستور پزشک مصرف کنید. نوع خوراکی اسم دارو: جنتامایسین دوز: 1 آمپول 12 ساعته نحوه مصرف: تزریقی توضیح: طبق دستور پزشک مصرف کنید نوع گزند	5.67				خانم نادری با سردرد مزمن باید روزی هر 6 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف کند و در صورت شدت درد، پاد موضعی متول روی شقیقه‌ها بمالد.	19
		نام بیمار: آقای پرویزی تشخیص بیماری: عفونت شدید ----- <span> </span> اسم دارو: آزیثرومایسین دوز: 1 قرص در روز نحوه مصرف: با آب مصرف کنید توضیح: طبق دستور پزشک مصرف کنید. نوع خوراکی اسم دارو: جنتامایسین دوز: 1 آمپول 12 ساعته نحوه مصرف: تزریقی توضیح: طبق دستور پزشک مصرف کنید	7.68				برای درمان عفونت شدید، آقای پرویزی باید روزی یک عدد قرص آزیثرومایسین و هر 12 ساعت یک عدد آمپول جنتامایسین تزریقی طبق دستور پزشک دریافت کند.	20
		نام بیمار: خانم کریمی تشخیص بیماری: تب و بدن‌درد ----- <span> </span> دارو 1: نام: استامینوفن دوز: 500 میلی گرم نحوه مصرف: هر 6 ساعت یک عدد توضیح: با آب زیاد مصرف کنید و در صورت بروز عوارض جانبی، با پزشک مشورت کنید. نوع قرص ----- <span> </span> دارو 2: نام: آموکسی‌سیلین دوز: 500 میلی گرم نحوه مصرف: هر 12 ساعت یک عدد توضیح: بعد از غذا مصرف کنید و تا 7 روز ادامه دهید. نوع کیسول	9.78				برای درمان تب و بدن‌درد، خانم کریمی باید هر 6 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف کند و هر 12 ساعت یک کیسول آموکسی‌سیلین 500 بعد از غذا مصرف شود.	1
		نام بیمار: آقای صادقی تشخیص بیماری: سینوزیت حاد ----- <span> </span> دارو 1: نام: آزیثرومایسین دوز: 250 میلی گرم نحوه مصرف: روزی یک عدد همراه با صبحانه توضیح: برای سه روز مصرف کنید نوع قرص دارو 2: نام: فنیل‌فرین دوز: هر قطره نحوه مصرف: هر 8 ساعت یک قطره در هر سوراخ بینی توضیح: تا بهبودی ادامه دهید نوع قطره بینی	8.48				آقای صادقی به دلیل سینوزیت حاد باید روزی یک عدد قرص آزیثرومایسین 250 به مدت سه روز همراه صبحانه مصرف کند و قطره فنیل‌فرین را هر 8 ساعت در هر سوراخ بینی بچکاند.	2
		نام بیمار: خانم عسکری تشخیص بیماری: آلرژی فصلی ----- <span> </span> دارو 1: نام: سیتیزین دوز: ۱ عدد نحوه مصرف: همراه غذا توضیح: روزانه دو بار نوع قرص دارو 2: نام: دیفن‌هیدرامین دوز: ۱ قاشق نحوه مصرف: قبل از خواب توضیح: شبانه نوع شربت	7.24				خانم عسکری به دلیل آلرژی فصلی باید روزی دو عدد قرص سیتیزین همراه غذا مصرف کند و شب‌ها یک قاشق شربت دیفن‌هیدرامین قبل از خواب میل نماید.	3
		نام بیمار: علی رضایی تشخیص بیماری: عفونت گلو ----- <span> </span> دارو 1: نام: سفالکسین دوز: 5 سی‌سی نحوه مصرف: هر 8 ساعت یک‌بار بعد غذا توضیح: تا بهبودی کامل مصرف شود نوع شربت ----- <span> </span> دارو 2: نام: استامینوفن دوز: یک قاشق نحوه مصرف: هر 6 ساعت یک‌بار بعد غذا توضیح: در صورت تب، مصرف شود نوع شربت	8.21				کودک هفت‌ساله‌ای که دچار عفونت گلو شده است باید هر 8 ساعت 5 سی‌سی شربت سفالکسین مصرف کند و هر 6 ساعت یک قاشق شربت استامینوفن برای تب تجویز شده است.	4

5	آقای حسام بری رفاکس معده باید شبها یک عدد قرص فاموتیدین 40 قبل از خواب و همراه ناهار یک عدد قرص رانیتیدین مصرف کند.	نام بیمار: آقای حسام تشخیص بیماری: رفاکس معده دارو: 1: نام: فاموتیدین دوز: 40 میلی گرم نحوه مصرف: یک عدد قبل از خواب توصیه: با آب زیاد مصرف شود نوع قرص دارو: 2: نام: رانیتیدین دوز: یک عدد نحوه مصرف: همراه ناهار توصیه: با آب زیاد مصرف شود نوع قرص	7.49
6	جهت درمان سرماخوردگی، خانم آقایانی باید روزی سه بار قرص لورتادین پس از غذا مصرف کنند و شبها قبل از خواب یک قاشق شربت دیفن‌هیدرامین نیز میل نمایند.	نام بیمار: خانم آقایانی تشخیص بیماری: سرماخوردگی دارو: 1: نام: لورتادین دوز: ۱ عدد نحوه مصرف: پس از غذا، سه بار در روز توصیه: تا بهبودی ادامه دهید نوع قرص دارو: 2: نام: دیفن‌هیدرامین دوز: ۱ قاشق نحوه مصرف: شبها قبل از خواب توصیه: فقط در صورت نیاز مصرف کنید نوع شربت	7.95
7	خانم فرهنگند با تشخیص برونشیت باید روزی یک عدد قرص آزیترومایسین با معده خالی و هر 8 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف نماید.	نام بیمار: خانم فرهنگند تشخیص بیماری: برونشیت دارو: 1: نام: آزیترومایسین دوز: 1 عدد نحوه مصرف: با معده خالی توصیه: هر 8 ساعت یک عدد نوع قرص دارو: 2: نام: استامینوفن دوز: 500 میلی گرم نحوه مصرف: بعد از غذا توصیه: هر 8 ساعت یک عدد نوع قرص	7.49
8	برای درد مفاصل، آقای تقوی باید قرص ایبوپروفن 400 را هر 8 ساعت بعد از غذا و تایروکسن 250 را روزی دو بار همراه یک لیوان آب میل کند.	نام بیمار: آقای تقوی تشخیص بیماری: درد مفاصل دارو: 1: نام: ایبوپروفن دوز: 400 میلی گرم نحوه مصرف: هر 8 ساعت بعد از غذا توصیه: همراه یک لیوان آب مصرف شود نوع قرص دارو: 2: نام: تایروکسن دوز: 250 میلی گرم نحوه مصرف: روزی دو بار توصیه: همراه یک لیوان آب مصرف شود نوع قرص	8.01
9	کودک دوساله‌ای که کم‌خونی دارد باید روزی یک قرص آهن همراه صبحانه و شربت آسکوربیک اسید نیز روزی دو بار برای جذب بهتر مصرف کند.	نام بیمار: [نام کودک] تشخیص بیماری: کم‌خونی دارو: 1: نام: قرص آهن دوز: یک قرص نحوه مصرف: همراه با صبحانه توصیه: روزانه نوع قرص دارو: 2: نام: آسکوربیک اسید دوز: دو بار در روز نحوه مصرف: با آب زیاد توصیه: برای بهبود جذب نوع شربت	6.97
10	خانم مرادی که دچار حساسیت پوستی است باید روزی یک عدد قرص لورتادین صبح‌ها و شب‌ها به‌مدام هیدروکورتیزون را روزی نواحی اسپیدیده به‌الد.	نام بیمار: خانم مرادی تشخیص بیماری: حساسیت پوستی دارو: 1: نام: لورتادین دوز: ۱ عدد نحوه مصرف: صبح و شب توصیه: تا بهبودی پوست ادامه دهید نوع قرص دارو: 2: نام: هیدروکورتیزون دوز: به میزان لازم برای نواحی اسپیدیده نحوه مصرف: روزی نواحی اسپیدیده پوست به‌الد توصیه: فقط در صورت نیاز و به میزان لازم استفاده کنید نوع پماد	8.66
11	برای درمان عفونت مجاری ادراری، آقای خیلی باید هر 12 ساعت یک عدد کپسول سفالکسین 500 و روزی سه بار قرص مترونیدازول همراه غذا مصرف نماید.	نام بیمار: آقای خیلی تشخیص بیماری: عفونت مجاری ادراری دارو: 1: نام: سفالکسین دوز: 500 میلی گرم نحوه مصرف: هر 12 ساعت یک عدد توصیه: همراه با غذا مصرف شود نوع کپسول دارو: 2: نام: مترونیدازول دوز: 1 عدد نحوه مصرف: روزی سه بار همراه غذا توصیه: تا بهبود کامل عفونت مصرف شود نوع قرص	8.54
12	خانم داوی که با اسهال شدید و التهاب مواجه است باید روزی دو بار قرص لوپرامید و هر روز صبح یک عدد قرص دکزامتازون مصرف کند. مصرف مایعات فراموش نشود.	نام بیمار: خانم داوی تشخیص بیماری: اسهال شدید و التهاب دارو: 1: نام: لوپرامید دوز: 1 عدد نحوه مصرف: روزی دوازده عدد غذا توصیه: مصرف مایعات را فراموش نکنید نوع قرص دارو: 2: نام: دکزامتازون دوز: 1 عدد نحوه مصرف: هر روز صبح توصیه: - نوع قرص	7.62

از متن نسخه، فقط این اطلاعات را استخراج کن:

1. نام بیمار  
2. تشخیص بیماری  
3. لیست داروها شامل:  
- نام دارو  
- دوز (مثلاً: ۵۰۰ میلی گرم، ۱ عدد، نصف قرص)  
- نحوه مصرف (مثلاً: روزی دوبار بعد غذا)  
- توصیه پزشک (مثلاً: با آب زیاد، در صورت توجع قطع شود)  
- نوع دارو (مثلاً: قرص، شربت، تزریقی)

قالب دقیق خروجی:

نام بیمار: [مثال: علی رضایی]  
تشخیص بیماری: [مثال: عفونت گلو]

دارو 1:  
نام: [مثال: آموکسی‌سیلین]  
دوز: [مثال: ۵۰۰ میلی گرم]  
نحوه مصرف: [مثال: هر ۸ ساعت یکبار بعد غذا]  
توصیه: [مثال: تا ۷ روز مصرف شود]  
نوع: [مثال: کپسول]

(اگر داروهای بیشتری هست، ادامه بده به همین شکل)

فقط اطلاعات خواسته‌شده را بده. توضیح یا تفسیر ننویس.

دقت مدل بهتر شده ولی توصیه های داروها با توجه به مثال های اضافه ای که داخل پرامبت نوشته شده ، گاها بدون اینکه مدل بررسی کنه که آن توصیه برای آن دارو مناسبه یا نه ، آن را در پاسخ مدل مینویسه .

13	کودک سه‌ساله با گلودرد ویروسی باید هر 6 ساعت یک قاشق شربت استامینوفن و هر 12 ساعت یک قاشق شربت آنتی‌هیستامین بعد از غذا مصرف کند.	نام بیمار: رضا محمدی تشخیص بیماری: گلودرد ویروسی --- دارو 1: نام: استامینوفن دوز: 1 قاشق شربت نحوه مصرف: هر 6 ساعت یک‌بار بعد از غذا توصیه: در صورت بروز عوارض جانبی، با پزشک مشورت کنید. نوع شربت --- دارو 2: نام: آنتی‌هیستامین دوز: 1 قاشق شربت نحوه مصرف: هر 12 ساعت یک‌بار بعد از غذا توصیه: در صورت بروز عوارض جانبی، با پزشک مشورت کنید. نوع شربت	10.36		
14	آقای رفیعی با آرتری تنفسی باید روزی یک عدد قرص فکسوفنادین با شکم خالی و شب‌ها قبل از خواب شربت دیفن‌هیدرامین میل کند.	نام بیمار: آقای رفیعی تشخیص بیماری: آرتری تنفسی --- دارو 1: نام: فکسوفنادین دوز: ۱ عدد نحوه مصرف: با شکم خالی توصیه: شب‌ها قبل از خواب مصرف شود نوع قرص --- دارو 2: نام: دیفن‌هیدرامین دوز: شربت نحوه مصرف: با شکم خالی توصیه: شب‌ها قبل از خواب مصرف شود نوع شربت	7.88		
15	خانم جباری که دچار کمبود ویتامین C شده است باید شربت آسکوربیک اسید را روزی دو بار بعد از غذا و قرص زینک را همراه وعده شام مصرف کند.	نام بیمار: خانم جباری تشخیص بیماری: کمبود ویتامین C --- دارو 1: نام: آسکوربیک اسید دوز: ۱۰۰۰ میلی‌گرم نحوه مصرف: روزی دو بار بعد از غذا توصیه: با آب زیاد مصرف شود. نوع شربت --- دارو 2: نام: زینک دوز: ۱۰۰ میلی‌گرم نحوه مصرف: همراه وعده شام توصیه: با غذا مصرف شود. نوع قرص	8.21		
16	برای بهبود خواب، آقای شایان باید هر شب قبل از خواب یک عدد قرص زولپیدم 10 مصرف کند و در صورت اضطراب، صبح‌ها یک عدد قرص آلزولام با معده خالی میل نماید.	نام بیمار: آقای شایان تشخیص بیماری: بی‌خوابی و اضطراب --- دارو 1: نام: زولپیدم دوز: 10 میلی‌گرم نحوه مصرف: یک عدد هر شب قبل از خواب توصیه: با آب زیاد مصرف شود نوع قرص --- دارو 2: نام: آلزولام دوز: 1 عدد نحوه مصرف: صبح‌ها با معده خالی توصیه: در صورت بروز اضطراب مصرف شود نوع قرص	8.28		
17	کودک هشت‌ساله با اوتیت میانی باید هر 8 ساعت 5 سی‌سی شربت سفیکسیم مصرف کند و شب‌ها قبل از خواب یک قاشق شربت دیفن‌هیدرامین داده شود.	نام بیمار: [نام کودک] تشخیص بیماری: اوتیت میانی --- دارو 1: نام: سفیکسیم دوز: 5 سی‌سی نحوه مصرف: هر 8 ساعت یک‌بار بعد غذا توصیه: تا بهبودی کامل مصرف شود نوع شربت --- دارو 2: نام: دیفن‌هیدرامین دوز: یک قاشق نحوه مصرف: شب‌ها قبل از خواب توصیه: فقط در صورت نیاز و با مشورت پزشک نوع شربت	8.28		
18	خانم نظری برای رلاکس معده باید صبح‌ها ناشتا یک عدد قرص امپرازول و شب‌ها بعد از شام یک قرص فاموتیدین مصرف نماید.	نام بیمار: خانم نظری تشخیص بیماری: رلاکس معده --- دارو 1: نام: امپرازول دوز: ۱ عدد نحوه مصرف: ناشتا، صبح‌ها توصیه: تا زمانی که علائم برطرف نشوند مصرف شود نوع قرص --- دارو 2: نام: فاموتیدین دوز: ۱ قرص نحوه مصرف: شب‌ها بعد از شام توصیه: با آب زیاد مصرف شود نوع قرص	7.89		
19	خانم نادری با سردرد مزمن باید روزی هر 6 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف کند و در صورت شدت درد، بهاد موضعی متونول روی شقیقه‌ها بپاشد.	نام بیمار: خانم نادری تشخیص بیماری: سردرد مزمن --- دارو 1: نام: استامینوفن دوز: 500 میلی‌گرم نحوه مصرف: روزی هر 6 ساعت یک عدد توصیه: در صورت نیاز، می‌توانید در یک روز حداکثر 4000 میلی‌گرم مصرف کنید. نوع قرص --- دارو 2: نام: متونول دوز: به مقدار لازم نحوه مصرف: موضعی روی شقیقه‌ها توصیه: در صورت شدت درد، می‌توانید از این بهاد استفاده کنید. نوع بهاد موضعی	9.7		
20	برای درمان عفونت شدید، آقای پرویزی باید روزی یک عدد قرص آزیترومایسین و هر 12 ساعت یک عدد آمپول جنتامایسین تزریقی طبق دستور پزشک دریافت کند.	نام بیمار: پرویزی تشخیص بیماری: عفونت شدید --- دارو 1: نام: آزیترومایسین دوز: 1 عدد نحوه مصرف: روزی یک عدد توصیه: طبق دستور پزشک نوع قرص --- دارو 2: نام: جنتامایسین دوز: 1 عدد نحوه مصرف: هر 12 ساعت یک عدد توصیه: تزریقی نوع آمپول	7.17		