Text_Index	Original_Text	Structured_Output	Time_Seconds	prompt	accuracy
1		آقای کریمی به دلیل تب و بندنرد در بیمارستان بستری شد. آو به شدت تشته بود و آب زیادی میخورد. دکتر معالج برای تسکین تب و کفش تفتگی، دستورات زیر را داد: -خانم کریمی باید هر 6 ساعت یک عدد قرص استامینوفین 500 مصرف کند و هر 12 ساعت یک کبسول آموکسی سیاین 500 بعد از غذا مصرف شد. - اگر تب شدیدتر شد یا دچار تهوم شد، باید فوراً با پزشک تماس بگیرد.	8.69	شما یک" هستیار هوشمند هستیار هوشمند سختاریافته "ח\:استخارج کنید "ח\دوز مصر فی طریقه -" "مامصرف "ח\مصرف "المصرف "" "أبیماری "" "بیناری "" "باسخه"	همینطور که مشاهده میکنین ، با نسخه های پزشکی سالم، دقت بد است .
2	آقای صادق به دلیل سینوزیت حاد باید روزی یک عدد قرص آزیترومایسین 250 به مدت سه روز همراه صبحانه مصرف کند و قطره فنیل)فرین را هر 8 ساعت در هر سوراخ بینی بچکاند.	آقای صادق به دلیل سئوالت مزمن باید روزانه دو عدد قرص آزیترومایسین 250 به مدت سه روز همراه صبحانه مصرف کند و قطره فنیل!فرین را هر 8 ساعت در هر سوراخ بینی بچکاند.	3.31		
3	خاتم عسگری به دلیل آلرژی فصلی باید روزی دو عدد قرص سیتریزین همراه غلا مصرف کند و شبها یک قاشق شریت دیفنهیدرامین قبل از خواب میل نماید.	نام بیدار : خانم عسگری - داروها و دوز مصری: سیّزیسین 2 عدد + دیفنهپدرام 1 قاشق چایخوری - زمان مصرف: صبح و عصر - آنفخیس بیداری: آلرژی قطبل - آنفخیس بیداری: آلرژی قطبل -	2.96		
4	کودک هفتسالهای که دچار عفونت گو شده است باید هر 8 ساعت 5 سیسی شریت سفالکسین مصرف کند و هر 6 ساعت یک قاشق شریت استامینوفن برای تب تجویز شده است.	یک کودک هفت ساله مبتلا به عفونت گوی مزمن نیاز به مصرف دارو دارد. این دارو باید هر 8 ساعت 5 سیسی شربت سفالکسین مصرف شود و هر 6 ساعت یک قاشق شربت استامینوفن برای تب تجویز شده است.	3.32		
5	آقای حسام برای رفلاکس معده باید شبها یک عدد قرص فاموتیدین 40 قبل از خواب و همراه ناهار یک عدد قرص رانیتیدین مصرف کند.	آقای ح ملایری به دلیل رفلاکس معده باید شبها یک عدد قرص قاموتیدین 40 قبل از خواب و همراه ناهار یک عدد قرص رآنتین ممرف کند.	2.39		
6	جهت درمان سرماخوردگی، خانم آفاجانی باید روزی سه بار فرص لوراتادین پس از غذا مصرف کند و شبهها قبل از خواب یک قاشق شربت دینش،هیدارمین نیز میل نماید.	نام بیمار : خانم آقاجانی - داروها و دوز مصرق: قرص لوراتادین (3 بار در روز) + شربت دیفنهیدرامین (1 قاشق چایخوری) - بازه زمانی مصرف دارو: هر روز صبح: ظهر و عصر - تشخیص بیماری: سرماخوردگی -	3.84		
7	خانم فرهمند با تشخیص برونشیت باید روزی یک عند قرص آزیترومایسین با معده خالی و هر 8 ساعت یک عند قرص استامینوفن 500 مصرف نماید.	آقای فرهمند با تشخیص برونشیت باید روزی یک عدد قرص آزیترومایسین با معده خالی و هر 8 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف نماید.	2.5		
8	برای درد مفاصل، آقای تقوی باید قرص ایبوپروفن 400 را هر 8 ساعت بعد از غذا و ناپروکسن 250 را روزی دو بار همراه یک لیوان آب میل کند.	آقای تقوی به دلیل درد مفاصل باید هر 8 ساعت یک قرص ایبوپروفن 400 و روزانه دو قرص ناپروکسن 250 مصرف کند.	2.39		
9	کودک دهسالهای که کمخونی دارد باید روزی یک قرص آهن همراه صبحانه و شریت آسکورییک اسید نیز روزی دو بار برای جذب بهتر مصرف کند.	از این اطلاعات مرتوان فهمید که: 2) بیمار 10 ساله است. 2) بیمار کم حصی دارد. 3) بیمار به خوردن صبحانه عادت دارد. 5) بیمار به خوردن صبحانه عادت دارد. 5) بیمار روزانه یک فرص آهر مصرف می کند. 5) بیمار روزانه یک فرص آهر مصرف می کند.	4.37		
10	خانم مرادی که دچار حساسیت پوستی است باید روزی یک عدد قرص لوراتادین صبحها و شبها پماد هیدروکورتیزون را روی نواحی آسیبدیده بمالد.	خانم مرادی 40 ساله که دچار حسای پوستی است باید روزانه یک عدد قرص لوراتادین صبحها و شبها و همچنین پماد هیدروکورتیزون را روی نواحی آسیبدیده بمالد.	2.68		
11	برای درمان عفونت مجاری ادراری، آقای خلیلی باید هر 12 ساعت یک عدد کپسول سفالکسین 500 و روزی سه بار قرص مترونیدازول همراه غذا مصرف نماید.	آقای خلیلی به دلیل عقونت مجاری ادراری دجار اسهال و استفراغ شده است. برای درمان این بیماری باید از داروهای زیر استفاده شود: - کیسول مشالکسین 500 میلی گرم (هر 12 ساعت) - قرص مترفیندازول 155 میلی گرم (هر روز سه بار)	4.48		
12	خانم داوری که با اسهال شدید و التهاب مواجه است باید روزی دو بار قرص لوبرامید و هر روز صبح یک عدد قرص دگزامتازون مصرف کند. مصرف مایعات فراموش نشود.	.خانم داوری به دلیل اسهال شدید و التهاب باید از داروهایی استفاده کند که به تسکین این علاتم کمک کند - .مصرف مایعات نباید در این شرایط انجام شود زیرا می تواند موجب تشدید مشکلات معده شود -	2.91		
13	کودک سهساله با گلودره ویروسی باید هر 6 ساعت یک قاشق شربت استامپنوفن و هر 12 ساعت یک قاشق شربت آنتی هیستامین بعد از غذا مصرف کند.	نام بیمار: گربه سهساله با گلودرد ویروسی - دارهها و دوز مصری: استامینوفن (یک قاشق) + آنتیهیستامین (یک قاشق) - بازز زمانی مصرف: هر 6 ساعت - تشخیص بیماری: گلودرد ویروسی -	3.67		
14	آقای رفیعی با آلرژی تنفسی باید روزی یک عدد قرص فکسوفنادین با شکم خال و شبها قبل از خواب شریت دیفنهیدرامین میل کند.	آقای رفیقی، لطفاً این دارو را طبق دستور پزشک مصرف کنید.	1.06		
15	خانم جباری که دچار کمبود ویتامین C شده است باید شریت آسکوربیک اسید را روزی دو بار بعد از غذا و قرص زینک را همراه وعده شام مصرف کند.	آقایی که دچار کم خونی است باید هر روز صبح و عصر 2 عدد قرص زینک مصرف کند.	1.46		
16	برای بهبود خواب، آقای شایان باید هر شب قبل از خواب یک عدد قرص زولبیدم 10 مصرف کند و در صورت اضطراب، صبحها یک عدد قرص آلبرازولام با معده خالی میل نماید.	آقای شایان به دلیل اختلال خواب دجار مشکلات زیادی شده است. برای رفع این مشکل باید هر شب قبل از خواب یک عدد قرص زولبدیم 10 مصرف کند و در صورت لزوم صبحها یک عدد قرص آلیرازو لام با معده خالی میل نماید.	3.5		
17	کودک هشت ساله با اوتیت میانی باید هر 8 ساعت 5 سی می شریت سفیکسیم مصرف کند و شبهها قبل از خواب یک قاشقی شریت دیفن هیدرامین داده شود.	نام بیمار: کودک هشت ساله - داروها دونر ممرق: 5 سی،ش شریت سفیکسیم + یک قاشق شریت دیفن(هینرامین - بازه زمانی مصرف دارو: هر 8 ساعت - تشخیص بیماری: اولیت میانی - تشخیص بیماری: اولیت میانی -	3.33		
18	خانم نظری برای رفلاکس معده باید صبحها ناشتا یک عدد قرص امپرازول و شبها بعد از شام یک قرص فاموتیدین مصرف تماید.	خانمی 45 ساله است که به دلیل رفلاکس معده دچار مشکلات گوارشی شده است او پاید هر روز صبح تاشتایی یک عند قرص امیزاری مصرف کند و شبهها بعد از شام یک قرص فاموتیدین. این داروها به کاهش اسید معده کمک می کند و باعث تسکین برفلاکس معده عیشود.	4.44		
19	خانم نادری با سردرد مزمن باید روزی هر 6 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف کند و در صورت شدت درد، پماد موضعی منتول روی شقیقهها بمالد.	خانم نادری 2) سردرد مزمن 3) استامینوفن 4) 500 5) هر 6 ساعت 6) شقیقه (1	2.35		
20	برای درمان عفونت شدید، آقای پرویزی باید روزی یک عدد قرص آزیترومایسین و هر 12 ساعت یک عدد آمبول جنتامایسین تزریقی طبق دستور پزشک دریافت کند.	آقای پرویزی به دلیل عفونت شدید نیاز به مصرف دارو دارد.	1		
			3.2325		