

Text Index	Original Text	Structured Output	Time_Seconds	prompt	accuracy
1	برای درمان تب و بدن‌درد، خانم کربی باید هر 6 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف کند و هر 12 ساعت یک کیسول آموکسی‌سیلین 500 بعد از غذا مصرف - طریقه مصرف: استامینوفن 500 هر 6 ساعت، آموکسی‌سیلین 500 هر 12 ساعت بعد از غذا مصرف - تشخیص بیماری توسط پزشک: تب و بدن‌درد -	نام بیمار: خانم کربی - نوع دارو و دوز مصرفی: استامینوفن 500 (قرص) هر 6 ساعت یک عدد، آموکسی‌سیلین 500 (کیسول) هر 12 ساعت بعد از - غذا مصرف طریقه مصرف: استامینوفن 500 هر 6 ساعت، آموکسی‌سیلین 500 هر 12 ساعت بعد از غذا مصرف - تشخیص بیماری توسط پزشک: تب و بدن‌درد -	17.48		
2	آقای صادقی به دلیل سینوزیت حاد باید روزی یک عدد قرص آزیترومایسین 250 به مدت سه روز همراه صبحانه مصرف کند و قطره فنیل‌فرین را هر 8 ساعت در هر سوراخ بینی بچکاند. قطره فنیل‌فرین را هر 8 ساعت در هر سوراخ بینی بچکاند.	نام بیمار: آقای صادقی نوع دارو و دوز مصرفی: آزیترومایسین 250 (یک عدد قرص روزانه) و فنیل‌فرین (قطره هر 8 ساعت) طریقه مصرف: صبحانه مصرف کند آزیترومایسین و هر 8 ساعت در هر سوراخ بینی بچکاند فنیل‌فرین تشخیص بیماری توسط پزشک: سینوزیت حاد	14.07		
3	خانم عسگری به دلیل آلرژی فصلی باید روزی دو عدد قرص سیتیزین همراه غذا مصرف کند و شب‌ها یک قاشق شربت دیفن‌هیدرامین قبل از خواب میل نماید. دیفن‌هیدرامین قبل از خواب میل نماید.	نام بیمار: خانم عسگری - نوع دارو و دوز مصرفی: سیتیزین (دو قرص روزانه) و دیفن‌هیدرامین (یک قاشق شیشه) - طریقه مصرف: سیتیزین روزانه با غذا و دیفن‌هیدرامین قبل از خواب - تشخیص بیماری توسط پزشک: آلرژی فصلی -	12.67		
4	کودک هفت‌ساله‌ای که دچار عفونت گلو شده است باید هر 8 ساعت 5 سی‌سی شربت سفالکسین مصرف کند و هر 6 ساعت یک قاشق شربت استامینوفن برای تب تجویز شده است.	نام بیمار: کودک هفت‌ساله دارو مصرفی: سفالکسین و استامینوفن طریقه مصرف: 5 سی‌سی شربت سفالکسین هر 8 ساعت و یک قاشق شربت استامینوفن هر 6 ساعت تشخیص بیماری: عفونت گلو	9.9		
5	آقای حسام برای رفلاکس معده باید شب‌ها یک عدد قرص فاموتیدین 40 قبل از خواب و همراه ناهار یک عدد قرص رانیتیدین مصرف کند. رانیتیدین مصرف کند.	نام بیمار: آقای حسام نوع دارو و دوز مصرفی: رفلاکس معده (فاموتیدین 40 و رانیتیدین) طریقه مصرف: شب‌ها یک عدد قرص فاموتیدین 40 قبل از خواب و همراه ناهار یک عدد قرص رانیتیدین مصرف کند. تشخیص بیماری توسط پزشک: نشان داده نشده.	13.56		
6	جهت درمان سرماخوردگی، خانم آقاچانی باید روزی سه بار قرص لووراتدین پس از غذا مصرف کند و شب‌ها قبل از خواب یک قاشق شربت دیفن‌هیدرامین نیز میل نماید. قاشق شربت دیفن‌هیدرامین نیز میل نماید.	نام بیمار: خانم آقاچانی - نوع دارو و دوز مصرفی: لووراتدین (3 قرص روزانه) و دیفن‌هیدرامین (یک قاشق شیشه) - طریقه مصرف: لووراتدین پس از غذا مصرف و دیفن‌هیدرامین قبل از خواب - تشخیص بیماری توسط پزشک: سرماخوردگی -	12.86		
7	خانم فرهنگد با تشخیص پروئشیت باید روزی یک عدد قرص آزیترومایسین با معده خالی و هر 8 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف نماید. استامینوفن 500 مصرف نماید.	نام بیمار: خانم فرهنگد - نوع دارو و دوز مصرفی: آزیترومایسین (1 قرص روزانه) و استامینوفن 500 (1 قرص هر 8 ساعت) - طریقه مصرف: آزیترومایسین روزانه یک قرص و استامینوفن 500 هر 8 ساعت یک قرص - تشخیص بیماری توسط پزشک: پروئشیت -	13.52		
8	برای درد مفاصل، آقای تقوی باید قرص ایبuprofen 400 را هر 8 ساعت بعد از غذا و ناپروکسن 250 را روزی دو بار همراه یک لیوان آب میل کند. لیوان آب میل کند.	نام بیمار: آقای تقوی - نوع دارو: ایبuprofen 400 و ناپروکسن 250 - دوز مصرفی: هر قرص ایبuprofen 400 را هر 8 ساعت بعد از غذا و ناپروکسن 250 را روزی دو بار همراه یک لیوان آب میل - کند. تشخیص بیماری توسط پزشک: نام بیماری تشخیص داده شده است -	14.4		
9	کودک ده‌ساله‌ای که کموخه دارد باید روزی یک قرص آهن همراه صبحانه و شربت آسکوربیک اسید نیز روزی دو بار برای جذب بهتر مصرف کند. جذب بهتر مصرف کند.	نام بیمار: کودک ده‌ساله‌ای نوع دارو: قرص آهن و شربت آسکوربیک اسید طریقه مصرف: روزی یک قرص آهن صبحانه و شربت آسکوربیک اسید دو بار روزانه تشخیص بیماری: کم‌خونی	9.83		
10	خانم مرادی که دچار حساسیت پوستی است باید روزی یک عدد قرص لووراتدین صبح‌ها و شب‌ها پماد هیدروکورتیزون را روی نواحی آسیب‌دیده بمالد. نواحی آسیب‌دیده بمالد.	نام بیمار: خانم مرادی - نوع دارو و دوز مصرفی: لووراتدین (1 قرص روزانه) و پماد هیدروکورتیزون (مصرف روزانه به نواحی آسیب‌دیده) - طریقه مصرف: لووراتدین در صبح و شب و پماد هیدروکورتیزون روی نواحی آسیب‌دیده - تشخیص بیماری توسط پزشک: حساسیت پوستی -	14.82		
11	برای درمان عفونت مجاری ادراری، آقای خلیلی باید هر 12 ساعت یک عدد کیسول سفالکسین 500 و روزی سه بار قرص مترونیدازول همراه غذا مصرف نماید. مترونیدازول همراه غذا مصرف نماید.	نام بیمار: خلیلی - نوع دارو و دوز مصرفی: کیسول سفالکسین 500 (هر 12 ساعت)، قرص مترونیدازول (روزی سه بار) - طریقه مصرف: 12 ساعت یک عدد کیسول سفالکسین 500 و روزی سه بار قرص مترونیدازول با غذا مصرف نماید - تشخیص بیماری توسط پزشک: عفونت مجاری ادراری -	15		
12	خانم داوری که با اسهال شدید و التهاب مواجه است باید روزی دو بار قرص لوپرامید و هر روز صبح یک عدد قرص دکزانتازون مصرف کند. مصرف مایعات را مصرف - نمایش دهید	نام بیمار: خانم داوری - نوع دارو و دوز مصرفی: لوپرامید (دوز روزی دو قرص) و دکزانتازون (دوز هر روز یک قرص) - طریقه مصرف: روزی دو بار لوپرامید و هر روز صبح دکزانتازون را باید به صورت دسی مصرف کند. مایعات را مصرف - نمایش دهید	15.98		
13	کودک سه‌ساله با گلودرد ویروسی باید هر 6 ساعت یک قاشق شربت آنتی‌هیستامین و هر 12 ساعت یک قاشق شربت آنتی‌هیستامین بعد از غذا مصرف کند. آنتی‌هیستامین بعد از غذا مصرف کند.	نام بیمار: کودک سه‌ساله نوع دارو و دوز مصرفی: شربت استامینوفن (هر 6 ساعت) و شربت آنتی‌هیستامین (هر 12 ساعت) طریقه مصرف: بعد از غذا تشخیص بیماری توسط پزشک: گلودرد ویروسی	10.33		
14	آقای رفیعی با آلرژی تنفسی باید روزی یک عدد قرص فکسوفنادین با شکم خالی و شب‌ها قبل از خواب شربت دیفن‌هیدرامین میل کند. میل کند.	نام بیمار: آقای رفیعی نوع دارو و دوز مصرفی: فکسوفنادین (1 قرص روزانه)، دیفن‌هیدرامین (شب‌ها قبل از خواب 1 میل) طریقه مصرف: روزی یک عدد قرص فکسوفنادین با شکم خالی، شب‌ها قبل از خواب شربت دیفن‌هیدرامین میل کند تشخیص بیماری توسط پزشک: آلرژی تنفسی	14.84		
15	خانم چبازی که دچار کمبود ویتامین C شده است باید شربت آسکوربیک اسید را روزی دو بار بعد از غذا و قرص زینک را همراه وعده شام مصرف کند. همراه وعده شام مصرف کند.	نام بیمار: خانم چبازی - نوع دارو: شربت آسکوربیک اسید و قرص زینک دوز مصرفی: دو بار روزانه شربت آسکوربیک اسید و یک قرص زینک همراه با وعده شام - تشخیص بیماری توسط پزشک: کمبود ویتامین C	11.49		
16	برای بهبود خواب، آقای شایان باید هر شب قبل از خواب، آلپرازولام 1 قرص صبحا - طریقه مصرف: زولپیدم قبل از خواب، آلپرازولام صبحا در صورت اضطراب - تشخیص بیماری توسط پزشک: بیماری خواب نابود - توضیحات اضافه: این مثال به عنوان نمونه است و)	نام بیمار: آقای شایان - نوع دارو و دوز مصرفی: زولپیدم 10 قرص هر شب قبل از خواب، آلپرازولام 1 قرص صبحا - طریقه مصرف: زولپیدم قبل از خواب، آلپرازولام صبحا در صورت اضطراب - تشخیص بیماری توسط پزشک: بیماری خواب نابود - توضیحات اضافه: این مثال به عنوان نمونه است و)	15.96		
17	کودک هشت‌ساله با اوتیت میانی باید هر 8 ساعت 5 سی‌سی شربت سفیکسیم مصرف کند و شب‌ها قبل از خواب یک قاشق شربت دیفن‌هیدرامین داده شود. شربت دیفن‌هیدرامین داده شود.	نام بیمار: کودک هشت‌ساله - نوع دارو و دوز مصرفی: شربت سفیکسیم (5 سی‌سی) هر 8 ساعت، و دیفن‌هیدرامین (یک قاشق) قبل از خواب شب - طریقه مصرف: شربت ها باید به درون فرد شروع بشوند - تشخیص بیماری توسط پزشک: نام بیماری از اطلاعات داده نشده است -	14.59		
18	خانم نظری برای رفلاکس معده باید صبح‌ها ناشتا یک عدد قرص امپرازول و شب‌ها بعد از شام یک قرص فاموتیدین مصرف نماید. فاموتیدین مصرف نماید.	نام بیمار: خانم نظری - نوع دارو و دوز مصرفی: امپرازول (Emprazepam 1mg) و فاموتیدین (Famotidine 20mg) طریقه مصرف: صبحانه با یک کیسول باین شدن و شب‌ها با یک کیسول بالا شدن - و بیم (Insomnia) تشخیص بیماری توسط پزشک: نام درست بیماری -	15.94		
19	خانم نادری با سردرد مزمن باید روزی هر 6 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف کند و در صورت شدت درد، پماد موضعی منتول روی شقیقه‌ها بمالد. موضعی منتول روی شقیقه‌ها بمالد.	نام بیمار: خانم نادری - نوع دارو و دوز مصرفی: استامینوفن 500 (یک عدد قرص روزی هر 6 ساعت) - طریقه مصرف: به طور دوره ای هر 6 ساعت - تشخیص بیماری توسط پزشک: سردرد مزمن -	10.19		
20	برای درمان عفونت شدید، آقای پرویزی باید روزی یک عدد قرص آزیترومایسین و هر 12 ساعت یک عدد آمپول جنتامایسین تزریقی طبق دستور پزشک دریافت کند. تزریقی طبق دستور پزشک دریافت کند.	نام بیمار: آقای پرویزی - نوع دارو و دوز مصرفی: آزیترومایسین (1 قرص روزانه) و آمپول جنتامایسین تزریقی (1 عدد هر 12 ساعت) - طریقه مصرف: روزانه یک عدد قرص آزیترومایسین و هر 12 ساعت یک عدد آمپول جنتامایسین تزریقی طبق دستور پزشک - تشخیص بیماری توسط پزشک: عفونت شد -	15.95		
			13.669		

دقت و پاسخ ها
نسبت به وزن 0.2
همین مدل بهتر است
اما همانطور که در
پاسخ ها مشاهده
میکند ، بعضی
ترجمه ها و جمله
نویسی های مدل
اشتباه است .
همچنین مدل در
تشخیص بیماری
ضعیف عمل کرده
است. گاهی اوقات
هم مثل نسخه 16
توضیحات اضافی
میدهد که ربطی به
نسخه ما ندارد. زمان
اجرای مدل هم
نسبت به درنا خیلی
بیشتر هست (5 ثانیه
بیشتر) . از لحاظ
دقت و زمان نسبت
به مدل درنا ضعیف
تر است.