Text_Index	Original Text	Structured_Output	Time_Seconds	prompt	accuracy
- III_IIIICA		بیماری، دارو، درمان، دارو، درمان، سخنگوی وزارت بهداشت تخیین آمار اینکار: بیماری، دارو، درمان، دارو، درمان، سخنگوی وزارت بهداشت آخیین آمار اینکار: بهبودیافته و جان باختگان ناشی از بیماری و روس در کشور را تا تاریخ ۱۵ شهربورماه ۹۹ اعلام کرد. به گزارش خبرنگر ایستان سیما سادات لاری در نفست خبری خود که به		p. soups	
1	برای درمان تب و بدن:درد، خانم کریمی باید هر 6 ساعت یک عدد فرص استامینوفن 500 مصرف کند و هر 12 ساعت یک کیسول آموکسی،سیاین 500 بعد از غذا مصرف شود.	صورت ویدتو کنفراتس بگزار شد، در خصوص آمار جدید ابتلاء به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت منتهی به ظهر امروز سه شنبه ۱۵ شهرپروماه اظهار کرد از تمداد بیماران بستری در بیمارستانهای کشور تاکنون ۴۶ هزار و ۴۶۶ نفر بهیود یافته و از بیمارستان اترخیص شدهاند. سخنگوی وزارت بهداشت تعداد جان باختگان بیماری کرونا طی ۲۳ ساعت اخیر در کشور را ۱۸۲۳ نفر اعلام کرد و گفت از	3.08	لطفاً اطلاعات زیر را استخراج نام بیماری بیماری، داروها بیماری، داروها مصرف، توصیه، پاسخ:	همینطور که مشاهده میکنید، دقت مدل خیلی بد است
2	آقای صادق به دلیل سینوزیت حاد باید روزی یک عدد قرص آزیژرمنایسین 250 به مدت سه روز همراه صبحانه مصرف کند و قطره فنیل فرین را هر 8 ساعت در هر سوراخ بدی بچکاند.	بیبان دارو را به تغایی و با تجویز بزشک مصرف می کند. این دارو باید توسط داروستار با داروستار مصرف خود. داروستار باید در مصرف این را او خناباط کند. برای بیدان دارو با به مورت قطودهای خواری و با دور خناست مصرف کند بر باید بیاد داروی فنیل افرین باید با دور مناسب مصرف شود. این دارو باید توسط داروساز با داروساز تجویز شود. داروساز باید در مصرف این دارو احتیاط کند.مدیری دفتر امور شهری و خرواهای استانداری اصفهان با بیان اینکه برای بیشگیری از شیخ کرونا در سطح استان اصفهان تماند طرفیحتهای اثار بحد حواف شهران هاید دهباری امد در ستوی قرار اگر گوفته استان	2.77		
3	خانم عسگری به دلیل آلرژی فصلی باید روزی دو عدد قرص سیتریزین همراه غذا مصرف کند و شبهها یک قاشق شریت دیش هیدرامین قبل از خواب میل نماید.	بیارا تشخیص بیباری و دارو، دواره دوراه دارو دربان، بازجه به اطاراحات قائم شده از نسخه ی جدید سیستم عامل (105 به نظر مرسال بن حال کار روی نسخه ی جدید سیستم عامل خود است. بن نسخه از سیستم عامل (105 سیستم عامل) محبوب ایل، از یک صفحهامیایی باز رولوش بالا بهو می پرد که در بالای صفحهای اصلی قرار گرفته است. همچنین این صفحهامیایی دارای رزولوش کا 44 خواهد بود با توجه به اینکه ایل در حال کار روی نسخهای جدید سیستم عامل خود است، یه نظر مرسد سخمی جدید سیستم عامل (105) با نام	2.76		
4	کودک هفتسالهای که دچار عفونت گو شده است باید هر 8 ساعت 5 سیسی شریت سفالکسین مصرف کند و هر 6 ساعت یک قاشق شریت استامینوفن برای تب تجویز شده است.	در صورت بروز علاتم، پزشک معالج باید به اطلاع بیمار برساند. به عنوان مثال آگر بیمار مبتلا به بیماری کلیوی یا کبدی باشد و به علت عوارض کبدی یا کلیوی دچار بیماری کلیوی شود، پزشک معالج باید به وی اطلاع دهد که برای تشخیص بیماری کلیوی یا به یک به تجویز داور در در صورت بروز علائم و نشانههای بیماری کلیوی یا کبدی، پزشک معالج پاید به وی اطلاع دهد که برای تشخیص بیماری کلیوی یا دیمی ته چنویز داور بناز دارید ، معتوان اگل کربیدام بنادر بیماری کلیوی یا کبدی باشد، پزشک معالج باید به وی اطلاع دهد که برای تشخیص بیماری کلیوی یا کبدی به تجویز دارو نیاز دارد. به عنوان مثال اگر بیمار	2.75		
5	آقای حسام برای رفلاکس معده باید شهها یک عدد قرص فاموتیدین 40 قبل از خواب و همراه ناهار یک عدد قرص رانیتیدین مصرف کند.	با توجه به اینکه بیمار در حال حاضر به دلیل بیماری به بیمارستان مراجعه نکرده است و باید در انتظار نتیجه مثبت باشد و در غیر این صورت باید با دیک بزشک مشورت کنند بنابراین بیمار را باید با یک بزشک مشورت کنند. در ادامه مسابقات تنیس آزاد آمریکه در آخرین روز میانی این می از آدام آمریک در گروه زنان، در روز چهارشیف، در برابر تیم ایالات متحده، به پیروزی رسید. در این دیدار که در استیباز سنتر ابالت مینه سوتا برگزار شد، ماریا شاراپوواه تنیسور شماره یک زنان جهان، با پیروزی در برابر حریفش از آمریک، به ومین مدال طلای انفرادی خود دست یافت. شاراپوه با کسب ۲۱ امتیان	2.94		
6	جهت درمان سرماخوردگی، خانم آقاجانی باید روزی سه بار قرص لوراتادین پس از غذا مصرف کند و شبها قبل از خواب یک قاشق شریت دیفر،هیدرامین نیز میل نماید.	گر پیمار میتلا به بیمازیکمای زمینهای باشد و تحت دربان دارویی قرار گرد، بیماری به شدت گسترش بیابند و در اثر بیماری، دربان دارویی در اولویت است در صورت عدم دربان، بیمار به بیماریکاهای زمینهای میتلا ی شود و در صورت عدم درمان داروی، به بیمازیکهای نمیشای میتلا کیشود. در صورت عدم درمان داروی، بیمار به بیماریکای زمینهای میتلا و مشود و در تنبچه بیماری به شدت گسترش بیابد. در صورت عدم درمان داروی، بیمار به بیماریکای میتلا میشود و در تنبچه بیماری به شدنت گسترش می	2.82		
7	خانم فرهمند با تشخیص پرونشیت باید روزی یک عدد قرص آزیترومایسین با معده خال و هر 8 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف نماید.	در هر صورت، تشخیص بیباری به این صورت است که فرد، آنی بیونیک تجویز می کند و آنی بیونیک تجویز می کند. پس از تشخیص بیباری، آنی بیونیک تجویز می کند و آنی بیونیک تجویز می کنند. رد دنیای امروز که سرعت اینترنت روز به روز در حال افزایش است، همه می باه دنبال راههای مختلف برای افزایش سرعت هستیم. از دانلود ردیدو، تماشای ویدیو، آبلود فایل های حجیم و تا اجرای لینکیشن های مختلف. اما به طور کلی، این راهها به چه صورت هستند و چرا باید از آنها استفاده کنیم؟ در این مطلب، ما به طور کامل به	2.76		
8	برای درد مفاصل، آفای تقوی باید قرص ایبوپروفن 400 را هر 8 ساعت بعد از غنا و ناپروکسن 250 را روزی دو بار همراه یک لیوان آب میل کند.	درمان بیماری، با دارو درمانی و درمان بیماریهای غیرواگیر به شدت با بیماریهای غیرواگیر در ارتباط است. برای درمان بیماریهای غیرواگیر درمان بیماریهای غیرواگیر بیسار امزارهاست. درمان بیماریهای غیرواگیر، با دارو درمانی از بیماریهای غیرواگیر است. در درمان بیماریهای غیرواگیر، بیمار با داروهای غیرواگیر، از بیماریهای غیرواگیر، با شدت و شدت بیشتری، بیماریهای غیرواگیر را تشخیص فیدهد. در درمان بیماریهای غیرواگیر، بیمار با دارو درمانی، از بیماریهای	2.74		
9	کودک دهسالهای که کمخونی دارد باید روزی یک قرص آهن همراه صبحانه و شربت آسکورییک اسید نیز روزی دو باز برای جذب بهتر مصرف کند.	در حال حاضر این بیماری در سراسر جهان شیوع یافته و تقریبا تمام کشورها با توجه به وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خدر اقدام به دریان این سیادی کرداند در مید ترکه این بیان در کشت باید دارا شاید که داد در مید ترجه قال	2.77		
10	خانم مرادی که دچار حساسیت پوستی است باید روزی یک عدد قرص لورانادین صبحها و شبها بماد هیدروکورنیّرون را روی نواحی آسیبدیده بمالد.	هر بیماری، علامت و نشانهای دارد. در تشخیص بیماری، ابتنا باید بیماری تشخیص داده شود. در تشخیص بیماری، پزشک باید تشخیص دهد که آیا علائم بیماری به طور معمول، علامتحار است با خور. علائم بیماری، بهمروز زمان و در طول زمان، کاهش بهایند و ممکن است با بیماری های در گذر از جمله بیماریهای کبدی، بیماریهای گوارخی، بیماریهای کبدی و مرتبط باشند. در تشخیص بیماری بزشک باید بیمار را تحت نظر قرار دهد و اگر علائم بیمار از حد طبیعی فراتر رفت، پزشک را به سمت تشخیص بیماری هدایت کند. در نشخیص بیماری، پزشک،	2.88		
11	برای درمان عفونت مجاری ادراری، آقای خلیلی باید هر 12 ساعت یک عدد کپسول سفالکسین 500 و روزی سه بار قرص مترونیدازول همراه غذا مصرف نماید.	این دارو به صورت کیسول و بدون کیسول در دسترس مصرف کننده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد پیماری کرونا میتوانند به است وحاجه کنید، به خاطر داشته باشد که دارهای موره التیسه انوان فاغ ادوار برای درمان موقتات حجازی ادراری، باید از نظر بالین تایید و با ره شوند. اینتل، شرکت مادر نرمافزارهای پردازش ایری، «آزور» (کمسه) را به عنوان یکی از آنهایش پردازندی گرفتی کرفتار مساسم خود با نام (ترکت) افزار در تشارات، چهانی اوراند کیل در اوران نسخه ی آنهایش پردازندی گرفتی کرفتار مساسم خود با نام (ترویم» (۱)	2.76		
12	خاتم باوری که با اسهال شدید و التهاب مواجه است باید روزی دو بار قرص لویرامید و هر روز صبح یک عدد قرص دگزامتازون مصرف کند، مصرف ماند، مصرف ماند، مصرف مایات فراموش نشود.	این مقاله صرفا جهت درج در سایت به صورت محدود مورد بازیبنی انساق قرار گرفته است.»[-در این مقاله، ما با اصول» اولیدی طراحی و برنامه نویسی آشنا شدیم. —به این نکته نوجه داشته باشید که طراحی و برنامه نویسی در عین سادگی، از پیچیدگی های فراوانی هم برخوردار استبرنامه نویسی برای افراد حرفهای در حوزی نکتولوژی، به خصوص برنامه نویسان مبتدی، بسیار مفید استبرنامه نویسی برای افراد حرفهای، با سابقه و ماهر، بسیار مفید و کاربردی استبرنامه نویسی برای افرادی که میخواهند برنامه نویسی برای افراد حرفهای، با سابقه و ماهر، بسیار مفید و کاربردی استبرنامه نویسی برای افرادی که میخواهند برنامه نویسی برای افراد حرفهای با سابقه و ماهر، بسیار مفید و کاربردی	2.75		
13	کودک سهساله باگلودرد ویروسی باید هر 6 ساعت یک قاشق شریت استامینوفن و هر 12 ساعت یک قاشق شریت آنتی هیستامین بعد از غذا مصرف کند.	بیماری، دارو، دارو و درمان. لطفا>>>پاسخ به پرسترهای بالا را با دقت بخوانید. ویکیبدیا بهتازگی اعلام کرده است که در حال کار روی یک پروژه می هزیاز و متهایا برای مقابله با ویروس گرونا است. به گفتهی این وبسایت، در حال حاصر، این پروژه بهصورت متهایا و در قالب یک بسته ی نومافزاری در دسترس است. طبق گفتهی این وبسایت، پروژهی متهایا و بیکیبدیا، بهعنوان بخشی از برنامهی متهایا دشتها در متهایا (2.76		
14	آقای رفیعی با آلرژی تنفسی باید روزی یک عدد قرص فکسوفنادین با شکم خالی و شب.ها قبل از خواب شریت دیفن.هیدرامین میل کند.	بیماران مبتلا به بیماریهای تنفسی باید حتما قبل از خواب، دارو مصرف کنند. این بیماریها در سالمندان و بیماران مبتلا به اسم، افرادی که در مترل با محل کار هستند، افراد مبتلا به بیماریهای مزمن ربوی و تنفسی و افرادی که در خانه زندگی می کنند، افراد دارای بیماریهای زمینهای از نظر بیماریهای قلبی، ربوی و) و افراد دارای بیماریهای ربوی (مانند آسم) و افراد دارای بیماریهای ربوی باید خنها قبل از	3.02		
15	خاتم جیاری که دچار کمبود ویتامین C شده است باید شربت آسکوزییک اسید را روزی دو بار بعد از غذا و قرص زینک را همراه وعده شام مصرف کنند.	ر درمورت عند م وجود بیماری، بیمار رایسی دارو را همراه با وعده شام صرف کنند در سالهای نخی، بسیاری از "رکیدهای مطرح فناوری» از روز های نوآورانه برای افزایش مرعت و کاهش مریندها و افزایش سود خود استفاده ی کندر از این شرکتها، گوگل است. این شرکت، برای افزایش بهروری و سود خود، با شرکتهای مشکری کرده است که از روش مای نوآورانه برای کاهش هزیندها و افزایش بهروری در پروژدهای خود بهره بهرند، گوگل در سال ۲۰۱۲ با همکاری شرکتهای فناوری، اواین کیت آنهسعتی نرافرازی خود	2.76		
16	برای بهبود خواب، آقای شایان باید هر شب قبل از خواب یک عدد قرص زولبیدم 10 مصرف کند و در صورت اضطراب، صبح،ها یک عدد قرص آلبرازولام با معده خالی میل نماید.	آین مقاله ترجمهای از مقالهی زیر است.به گزارش پلومبرگ، ایل با پرداخت یک میلیارد دلار به گوگل، به این شرکت اجازه میدهد تا اپلیکیشنهای تحت اندروید خود را به فروشگاه اب استور بیاورد. البته گوگل در گذشته نیز چنین اجازهای را برای توسعهدهنندگان داده بود اما این کمیلی امروز در بیانیهای اعلام کرد که گوگل، به توسعهدهنندگان اجازه میدهد تا ایلیکیشنهای خود را به فروشگاه آپ استور بیاورند. طبق اعلام ایل، بین شرکت از این پس اپلیکیشنهای خود را به فروشگاه گوگل پلی استور می آورد و از این پس دیگر نیازی به نصبه ایلیکیشرهای	2.73		
17	کودک هشتساله با اوتیت میانی باید هر 8 ساعت 5 سی می شریت سفیکسیم مصرف کند و شبها قبل از خواب یک قاشق شریت دیفن/هیدارمین داده شود.	هیچ کس نمیآواند یک روز را بدون این که متوجه شود، با یک داروی خاص یا یک داروی خاص به خواب برود و این که او در» « این خواب به آنها کمک کند، زندگی کند. او نمیآواند به اینها کمک کند، اما میآواند از اینها استفاده کند و به اینها کمک کند منتشر شد، پژوهشگران دریافنند که Internal Medicine می Annals of Internal Medicine در مجلهی میتوانندیهای مرتبط با میتوانیدی با میتوانندیهای مرتبط با میتوانیدی رابطای قوتوتری	2.8		
18	خاتم نظری برای رفلاکس معده باید صبحها ناشتا یک عدد قرص امیرازول و شبهها بعد از شام یک قرص فاموتیدین مصرف نماید.	بیمار باید قبل از مصرف هر دارو، با پزشک معالج خود مشورت کند. در این موارد باید بیمار را با مشورت بزشک معالج، از دو خمیت خود مطلع سازید. در صورتی که بیمار از داروی فامونیدین استفاده ی نماید، باید با پزشک معالج خود مشورت نماید. در صورتی که بیمار از دروادی فامونیدین استفاده نماید، باید با پزشک معالج خود که بیرتا از داروی فامونیدین استفاده داروهای فامونیدین استفاده نماید، باید با پزشک معالج خود مشورت نماید. در صورتی که بیمار از داروی فامونیدین استفاده نماید، باید با پزشک معالج خود مشورت نماید. در صورتی که بیمار از داروی فامونیدین استفاده نماید، باید با	2.89		
19	خانم نادری با سردرد مزمن باید روزی هر 6 ساعت یک عند قرص استامینوفن 500 مصرف کنند و در صورت شدت درد. پماد موضعی منتول روی شقیقهها بمالد.	پیباران دیابق، مبتلا به دیابت، دارای یک علامت مشخص هستند که به آن علامت اختصاری دیابت ی گویند. علامت اختصاری دیابت، بیبارات ستک در اثر ترجم مواد شمیبایی در افزافت جربی با چربی، ایجاد ی مفرد، اینالام ی نوانند شامل بیباری های نامی عروق، فشار خون، دیابت، مشکل کیون، اختلالات حرکی و فشار خوب الابشند، علامت اختصاری دیابت، بیماری است که در اثر تجمع مواد شیمیایی در بافت جربی با چربی ایجاد بی شود. علاتم اختصاری دیابت، شامل بیماری های قابی عروق، فشار خون، دیابت، فشار خون، دیابت بارداری، دیابت حاملگی و فشار خون بالا است. علایم اختصاری دیابت	2.86		
20	برای درمان عفونت شدید، آقای پرویزی باید روزی یک عدد فرص آزنترومایسین و هر 12 ساعت یک عدد آمپول جنتامایسین تزریقی طبق دستور پزشک دریافت کند.	بیمار باید از طریق تماس با نرشحات بینی، ترشحات بینی، ترشحات بینی و ترشحات بینی خود، به پرشک مراجعه کند. سخنگوی وزارت بهناشت، از شناسای دو هزار و ۲۶۱ بیمار جدید میتلا به کرونا در شیانه روز گذشته خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، سیما سفات گزری بعد از قبره شنیه در ارتباط تصویری، به ارائه تازهزین آمار کرونا در کشور پرناخت. ری گفت از درورو تا امروز ۸ مهر ۲۶۱۹ و بر راساس معراهای قطفی تشخیصی شده شده وزاد ۲۳ بیما جدید میتلا به کرونا در کشور شناسایی شد و پنج هزار و ۲۵۱ نفر بهیود یافته و از بیمارستان ترخیص شدهاند. سخنگوی وزارت بهناشت گفت	2.72		
			2.816		