

Text Index	Original Text	Structured Output	Time Seconds	mean time of each prompts	prompts	accuracy
1	برای درمان تب و بدن‌درد، خاتم کریمی باید هر 6 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف کند و هر 12 ساعت یک کیسول آموکسی‌سیلین 500 بعد از غذا مصرف شود.	Name: Mrs. Krimi Medications and dosages: - Stamynofen 500mg tablets: 1 tablet every 6 hours - Amoxicillin 500mg capsules: 1 capsule 12 hours after meals.	3.9	4.627		
2	آقای صادق به دلیل سینوزیت حاد باید روزی یک عدد قرص آزیتراماسین 250 به مدت سه روز همراه صبحانه مصرف کند و قطره فیل‌فرین را هر 8 ساعت در هر سوراخ بینی بچکاند.	Name: Mr. Sadqi Medications and dosages: - Azithromycin: One tablet per day for three days - Phenylephrine: One drop in each affected eye every 8 hours	3.1			
3	خاتم حسگری به دلیل آلرژی فصلی باید روزی دو عدد قرص سیتیرین همراه غذا مصرف کند و شب‌ها یک فاشق شربت دیفن‌هیدرامین قبل از خواب میل نماید.	Name: Mrs. Asgari Medications: Two tablets of citrezin daily with food, one glass of diflucanate syrup before bedtime. Diagnosis: Seasonal allergies.	2.96			
4	کودک هفت‌ساله‌ای که دچار عفونت گلو شده است باید هر 8 ساعت 5 سی‌سی شربت سفالکسین مصرف کند و هر 6 ساعت یک فاشق شربت استامینوفن برای تب تجویز شده است.	Name: A seven-year-old child Medications: 5 cc of syrup succalysin every 8 hours, 1 cup of stamynofen syrup every 6 hours.	2.79			
5	آقای حسام برای رفلاکس معده باید شب‌ها یک عدد قرص فاموتیدین 40 قبل از خواب و همراه ناهار یک عدد قرص رانیتیدین مصرف کند.	Name: Hassan Medications and doses: - Rifaximin: One tablet of Famotidine 40mg before bedtime, and one tablet of Ranitidine (dose not specified) with meals.	3.88			
6	جهت درمان سرماخوردگی، خاتم آقایانی باید روزی سه بار قرص لوراتادین پس از غذا مصرف کند و شب‌ها قبل از خواب یک فاشق شربت دیفن‌هیدرامین نیز میل نماید.	Diagnosis: Not provided. (Mrs. Akajani) خاتم آقایانی - Diagnosis: Seasonal allergies (one glass before bedtime)	4.57			
7	خاتم فرهمند با تشخیص برونشیت باید روزی یک عدد قرص آزیتراماسین با معده خالی و هر 8 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف نماید.	Name: Mrs. Farhmond Medications and doses: 1. Azithromycin: One empty tablet daily. 2. Ibuprofen 500mg: One tablet every 8 hours.	3.15			
8	برای درد مفاصل، آقای تقوی باید قرص ایبوپروفن 400 را هر 8 ساعت بعد از غذا و نایروکسن 250 را روزی دو بار همراه یک لیوان آب میل کند.	Name: Teqoqi Medications: Ibuprofen 400mg, Naproxen 250mg Dosage: Ibuprofen - 1 tablet every 8 hours after food, Naproxen - 2 tablets per day Diagnosis: Not provided in the given information.	4.75			
9	کودک دهم‌ساله‌ای که کم‌خونی دارد باید روزی یک قرص آهن همراه صبحانه و شربت آسکوربیک اسید نیز روزی دو بار برای جذب بهتر مصرف کند.	Name: A six-year-old child Medications: One iron supplement tablet in the morning and two ascorbic acid (vitamin C) syrups daily. Method of Consumption: The iron supplement tablet should be taken with food in the morning. The ascorbic acid syrup can be taken twice daily, preferably with meals.	4.87			
10	خاتم مرادی که دچار حساسیت پوستی است باید روزی یک عدد قرص لوراتادین صبح‌ها و شب‌ها پماد هیدروکورتیزون را روی نواحی آسپج‌دیده بمالد.	Name: Mrs. Maradi Medications: Loratadine (one tablet per day, both morning and evening) and Hydrocortisone cream (to be applied on affected areas) Diagnosis: Unspecified skin sensitivity or rash.	3.52			
11	برای درمان عفونت مجاری ادراری، آقای خلیلی باید هر 12 ساعت یک عدد کیسول سفالکسین 500 و روزی سه بار قرص مترونیدازول همراه غذا مصرف نماید.	Name: Mr. Khili Medications: 1. Capsule, 500mg, Sulfasalazine 2. Tablet, Metronidazole Dosage: 1. One capsule every 12 hours 2. Three tablets daily with meals (Metronidazole)	4.5			
12	خاتم داوری که با اسهال شدید و التهاب مواجه است باید روزی دو بار قرص لوبرامید و هر روز صبح یک عدد قرص دگزامتازون مصرف کند. مصرف مایعات فراموش نشود.	- Name of the patient: Mrs. Dauri - Medications and doses: - Two tablets of loperamide daily. - One tablet of digoximadazole in the morning. - Method of consumption: Oral - Diagnosis: Unspecified (provided information only mentions symptoms of diarrhea and abdominal pain)	5.3			
13	کودک سمساله با آلودگی ویروسی باید هر 6 ساعت یک فاشق شربت استامینوفن و هر 12 ساعت یک فاشق شربت آن‌هیستامین بعد از غذا مصرف کند.	Name: A three-year-old child Medications and doses: - One glass of Staminafen syrup every 6 hours - One glass of Antihistamin syrup every 12 hours after meals.	3.22			
14	آقای رفیعی با آلرژی تنفسی باید روزی یک عدد قرص فکسوفنادین با شکم خالی و شب‌ها قبل از خواب شربت دیفن‌هیدرامین میل کند.	Name: Rafiee Medications and Doses: - Fexofenadine: One tablet daily, to be taken with water - Diphenhydramine: One milk shake (15 ml) before bedtime. Diagnosis: Allergic Rhinitis.	4.13			
15	خاتم جباری که دچار کمبود ویتامین C شده است باید شربت آسکوربیک اسید را روزی دو بار بعد از غذا و قرص زینک را همراه وعده شام مصرف کند.	- Patient Name: Mrs. Jabari - Medications: Ascorbic Acid (Vitamin C) supplement and Calcium Carbonate (Zinc) tablet - Consumption Method: Shake the Ascorbic Acid supplement before use and take two servings daily, one after lunch and one before dinner. Consume the Calcium Carbonate tablet with water, preferably with a meal to enhance absorption.	5.91			
16	برای بهبود خواب، آقای شایان باید هر شب قبل از خواب یک عدد قرص زولپیدم 10 مصرف کند و در صورت اضطراب، صبح‌ها یک عدد قرص آلپرازولام با معده خالی میل نماید.	Name: Mr. Shayan Medications: Zolpidem 10mg, Alprazolam 1mg Dosage: Mr. Shayan is to take one tablet of Zolpidem 10mg before bedtime and one tablet of Alprazolam 1mg in the morning with an empty stomach (if needed)	4.94			
17	کودک هشت‌ساله با اوتیت میانی باید هر 8 ساعت 5 سی‌سی شربت سفیکسیم مصرف کند و شب‌ها قبل از خواب یک فاشق شربت دیفن‌هیدرامین داده شود.	Name: A eight-year-old child Medications and doses: - Sixty-five milliliters of sucixiem syrup every 8 hours - One glass of diflucan syrup before bedtime Diagnosis: Not provided in the given information.	4.07			
18	خاتم نظری برای رفلاکس معده باید صبح‌ها ناشتا یک عدد قرص امیزولام و شب‌ها بعد از شام یک قرص فاموتیدین مصرف نماید.	Name: Mr. Nazari Medications: Famotidine, Amizolam, Ranitidine Dose: Mr. Nazari is to take one tablet of Famotidine 20mg before bedtime and one tablet of Amizolam 15mg in the morning with an empty stomach (if needed). Diagnosis: Gastroesophageal Reflux Disease (GERD)	15.82			
19	خاتم نادری با سردرد مزمن باید روزی هر 6 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف کند و در صورت شدت درد، پماد موضعی منتول روی شقیقه‌ها بمالد.	Name: Mrs. Nadiri Medications and doses: - Stamynoprin 500 mg: Take one tablet every 6 hours - Pamadol (as needed): Apply topically to affected areas for pain relief in case of severe pain.	3.64			
20	برای درمان عفونت شدید، آقای پرویزی باید روزی یک عدد قرص آزیتراماسین و هر 12 ساعت یک عدد آمپول جنتاماسین تزریقی طبق دستور پزشک دریافت کند.	Name: Mr. Provizis Medications and doses: - Azitromycin: One tablet daily - Ampul Jentamansin: One ampule every 12 hours	3.52			
1	برای درمان تب و بدن‌درد، خاتم کریمی باید هر 6 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف کند و هر 12 ساعت یک کیسول آموکسی‌سیلین 500 بعد از غذا مصرف شود.	Diagnosis: Unspecified. نام بیمار: خاتم کریمی تشخیص بیماری: تب و بدن‌درد اسم دارو: استامینوفن دوز: 500 مگ تجویز مصرف: یک عدد قرص هر 6 ساعت توضیح: برای درمان تب و بدن‌درد توجه: عادی اسم دارو: آموکسی‌سیلین دوز: 500 مگ تجویز مصرف: یک کیسول بعد از غذا هر 12 ساعت توضیح: برای	15.89			
2	آقای صادق به دلیل سینوزیت حاد باید روزی یک عدد قرص آزیتراماسین 250 به مدت سه روز همراه صبحانه مصرف کند و قطره فیل‌فرین را هر 8 ساعت در هر سوراخ بینی بچکاند.	نام بیمار: آقای صادقی تشخیص بیماری: سینوزیت اسم دارو: آزیتراماسین دوز: قرص روزانه تجویز مصرف: صبحانه توضیح: سه روز توجه: عادی اسم دارو: فیل‌فرین دوز: قطره تجویز مصرف: هر 8 ساعت توضیح: بچکاند توجه: برای بسته شدن سوراخها	14.48			

3	خاتم عسکری به دلیل آلرژی فصلی باید روزی دو عدد قرص سیتیزین همراه غذا مصرف کند و شبها یک فاشق شربت دیفن‌هیدرامین قبل از خواب میل نماید.	نام بیمار: خاتم عسکری تشخیص بیماری: آلرژی فصلی نام دارو: سیتیزین دوز: دو قرص نحوه مصرف: روزی توصیه: با غذاها نوع: جات و عصره نام دارو: دیفن‌هیدرامین دوز: یک فاشق نحوه مصرف: شبانه قبل از خواب توصیه: بدون غذا نوع: شربت	14.53
4	کودک هفت‌ساله‌ای که دچار عفونت گلو شده است باید هر 8 ساعت 5 میلی‌سی شربت سفالکسین مصرف کند و هر 6 ساعت یک فاشق شربت استامینوفن برای تب تجویز شده است.	نام بیمار: کودک هشت‌ساله تشخیص بیماری: عفونت گلو نام دارو: سفالکسین دوز: 5 سی‌سی (به ماه) نحوه مصرف: شربت توصیه: هر 8 ساعت نوع: عادی نام دارو: استامینوفن دوز: (نامشخص) نحوه مصرف: شربت توصیه: هر 6 ساعت نوع: عادی	13.67
5	آقای حسام پری رلاکس معده باید شبها یک عدد قرص فاموتیدین 40 قبل از خواب و همراه ناهار یک عدد قرص رانیبیدین مصرف کند.	نام بیمار: حسام تشخیص بیماری: (نامشخص) اسم دارو: رلاکس معده دوز: 1 قرص نحوه مصرف: شبها قبل از خواب توصیه: (نامشخص) نوع: جایی از تجویز داروی برای بیماری دیابت اسم دارو: فاموتیدین دوز: 1 قرص نحوه مصرف: شبها قبل از خواب توصیه: با نهار از غذاها	15.89
6	جهت درمان سرماخوردگی، خاتم آفاقانی باید روزی سه بار قرص لوراتادین پس از غذا مصرف کند و شبها قبل از خواب یک فاشق شربت دیفن‌هیدرامین نیز میل نماید.	نام بیمار: خاتم آفاقانی تشخیص بیماری: سرماخوردگی اسم دارو: لوراتادین دوز: قرص سه بار روزانه نحوه مصرف: پس از غذا توصیه: نداده شد نوع: عصره اسم دارو: دیفن‌هیدرامین دوز: یک فاشق شبانه نحوه مصرف: قبل از خواب توصیه: نداده شد نوع: شربت	15.34
7	خاتم فرهمند با تشخیص پروشیت باید روزی یک عدد قرص آرتروماسین با معده خالی و هر 8 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف نماید.	نام بیمار: خاتم فرهمند تشخیص بیماری: پروشیت اسم دارو: آرتروماسین دوز: 1 قرص نحوه مصرف: روزانه توصیه: با معده خالی نوع: جاییان اسم دارو: استامینوفن دوز: 1 قرص (500 مگ) نحوه مصرف: روزی 8 ساعت توصیه: - نوع: عصره و ستریک	14.35
8	برای درد مفاصل، آقای ثلوی باید قرص ایبuprofen 400 را هر 8 ساعت بعد از غذا و تایروکسن 250 را روزی دو بار همراه یک لیوان آب میل کند.	نام بیمار: ایبuprofen دوز: 400 مگ نحوه مصرف: قبل از غذا و تایروکسن توصیه: هر 8 ساعت نوع: جات اسم دارو: تایروکسن دوز: 250 مگ نحوه مصرف: بعد از غذا توصیه: روزی دو بار نوع: عصره نام بیمار: کودک ده ساله تشخیص بیماری: کمخونی	14.28
9	کودک دمساله‌ای که کمخونی دارد باید روزی یک قرص آهن همراه صبحانه و شربت آسکوربیک اسید نیز روزی دو بار برای جذب بهتر مصرف کند.	نام دارو: قرص آهن دوز: 1 قرص نحوه مصرف: روزی صبحانه توصیه: با اکثر غذاها نوع: برای تریج بهمره با فستقود یا غذاهای کم سیر	15.89
10	خاتم مرادی که دچار حساسیت پوستی است باید روزی یک عدد قرص لوراتادین صبحها و شبها پماد هیدروکورتیزون را روی نواحی آسیب‌دیده بمالد.	Name of the patient: Mrs. Maradi Diagnosis: Sensitivity to the skin Medication: Loratadine Dose: One tablet Intake: Daily, with water Recommendation: For allergic symptoms Type: Antihistamine Medication: Hydrocortisone cream Dose: Apply as directed Intake: Topical application Recommendation: For skin inflammation Type: Corticosteroid	6.57
11	برای درمان عفونت مجاری ادراری، آقای خلیلی باید هر 12 ساعت یک عدد کیسول سفالکسین 500 و روزی سه بار قرص مترونیدازول همراه غذا مصرف نماید.	نام بیمار: آقای خلیلی تشخیص بیماری: عفونت مجاری ادراری اسم دارو: کیسول سفالکسین دوز: 500 واه نحوه مصرف: هر 12 ساعت توصیه: با اهداف غذایی نوع: عادی اسم دارو: مترونیدازول دوز: - نحوه مصرف: سه بار روزانه توصیه: با غذا نوع: عصره ای	14.89

تو یک دستیار پزشکی هستی. اطلاعات نسخه زیر را دقیقاً با فرمت مشخص‌شده استخراج کن. فقط خروجی بده. اگر اطلاعات وجود نداشته، بنویس "نامشخص".

فرمت خروجی:
نام بیمار: ...
تشخیص بیماری: ...
اسم دارو: ...
دوز: ...
نحوه مصرف: ...
توصیه: ...
نوع: ...
(تکرار برای هر دارو)

دقت خوب نیست و جواب ها ناقصند . همانطور که مشاهده میکنیم، تولید بعضی از جوابهایش به زبان انگلیسی هست . زبان فارسی هم خوب ترجمه نمیکند. در تشخیص بیماری هم ضعیف عمل میکند. در کل دقت اصلا خوب نیست. زمان اجرا هم نسبت به مدل درنا بیشتر است و لحاظ زمانی هم مناسب نیست.

12	خانم داوری که با اسهال شدید و التهاب مواجه است باید روزی دو بار قرص لوپرامید و هر روز صبح یک عدد قرص دگزامتازون مصرف کند. مصرف مایعات فراموش نشود.	نام بیمار: خانم داوری تشخیص بیمار: اسهال شدید و التهاب اسم دارو: لوپرامید دوز: دو قرص نحوه مصرف: روزانه توصیه: دوباره روزانه نوع: جلوگیری اسم دارو: دگزامتازون دوز: یک قرص نحوه مصرف: هر روز صبح توصیه: هر روز نوع: جلوگیری	14.47		
13	کودک سه‌ساله با گلودرد ویروسی باید هر 6 ساعت یک فاشلی شربت استامینوفن و هر 12 ساعت یک فاشلی شربت آنتی‌هیستامین بعد از غذا مصرف کند.	بیمار: کودک سه‌ساله تشخیص بیمار: گلودرد ویروسی نام دارو: شربت استامینوفن دوز: یک فاشلی نحوه مصرف: بعد از 6 ساعت توصیه: بعد از غذا نوع: غلظی نام دارو: شربت آنتی‌هیستامین دوز: یک فاشلی نحوه مصرف: بعد از 12 ساعت توصیه: بعد از غذا نوع: غلظی	15.82		
14	آقای رفیعی با آلرژی تنفسی باید روزی یک عدد قرص فکسوفنادین با شکم خالی و شب‌ها قبل از خواب شربت دیفن‌هیدرامین میل کند.	Name of the patient: Rafiee Diagnosis: Allergic Rhinitis Name of the drug: Fexofenadine Dose: One tablet Method of consumption: Orally Recommendation: Take one tablet daily, preferably in the evening before sleeping. Type: Antihistamine Name of the drug: Diphenhydramine Dose: One milk shake (150ml) Method of consumption: Dissolve the tablet in a glass of milk and drink the entire content Recommendation: Take one milk shake (150ml) containing the dissolved tablet, daily, preferably in the evening before sleeping. Type: Antihistamine	10.69		
15	خانم چبازی که دچار کسید ویروسی C شده است باید شربت آسکوبیک اسید را روزی دو بار بعد از غذا و قرص زینک را همراه وعده شام مصرف کند.	نام بیمار: خانم چبازی تشخیص بیمار: کسید ویروسی C اسم دارو: شربت آسکوبیک دوز: در نظر دادن وزن و ساز بیمار، از درصدهای مشخصه برای شربت های مصنوع استفاده نمایند. نحوه مصرف: روزی دو بار توصیه: بعد از غذا نوع: غلظی اسم دارو: قرص زینک دوز: 1	15.88		
16	برای بهبود خواب، آقای شایان باید هر شب قبل از خواب یک عدد قرص زولپیدم 10 مصرف کند و در صورت اضطراب، صبح‌ها یک عدد قرص آلپرازولام با معده خالی میل نماید.	نام بیمار: شایان تشخیص بیمار: سائیده شبانه اسم دارو: زولپیدم دوز: 1 قرص نحوه مصرف: قبل از خواب توصیه: هر شب نوع: سنگین اسم دارو: آلپرازولام دوز: 1 قرص نحوه مصرف: در صورت اضطراب صبحا توصیه: هر روز نوع: سنگین	13.98		
17	کودک هشت‌ساله با اوتیت میانی باید هر 8 ساعت 5 سی‌سی شربت سفیکسیم مصرف کند و شب‌ها قبل از خواب یک فاشلی شربت دیفن‌هیدرامین داده شود.	بیمار: کودک هشت‌ساله تشخیص بیمار: استفاده از سفیکسیم و دیفن‌هیدرامین برای رفع علائم ها نام دارو: سفیکسیم دوز: 5 cc (هری 8 ساعت) نحوه مصرف: شربت توصیه: برای کسب گریز بیشتر به زودی بعد از اجاده به شربت باید به آب زیر پرداخت کند. نوع: مدتها	15.88		
18	خانم نظری برای رلاکس معده باید صبح‌ها ناشتا یک عدد قرص امپرازول و شب‌ها بعد از شام یک قرص فاموتیدین مصرف نماید.	نام بیمار: خانم نظری تشخیص بیمار: به ازای استفاده از رلاکس معده اسم دارو: امپرازول دوز: 1 قرص نحوه مصرف: صبحانه توصیه: براحتی با استفاده از آب و برقی به ماهوت در گوشته بلند و با فراوانی آب در دسترس قرار دهید. نوع: غلظی اسم دارو: فاموتیدین دوز: 1	15.87		
19	خانم نادری با سردرد مزمن باید روزی هر 6 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف کند و در صورت شدت درد، پead موضعی متنول روی شقیقه‌ها بپاشد.	نام بیمار: خانم نادری تشخیص بیمار: سردرد اسم دارو: استامینوفن دوز: 500 مگ نحوه مصرف: روزانه یک قرص هر 6 ساعت توصیه: در صورت شدت درد، پead موضعی متنول روی شقیقه‌ها نوع: غصاره (تکرار برای هر دارو بسته به نیاز)	13.78		
20	برای درمان عفونت شدید، آقای پرویزی باید روزی یک عدد قرص آزیترومایسین و هر 12 ساعت یک عدد آمپول جنتامایسین تزریقی طبق دستور پزشک دریافت کند.	نام بیمار: آقای پرویزی تشخیص بیمار: عفونت شدید اسم دارو: آزیترومایسین دوز: یک قرص روزانه نحوه مصرف: به دسته بندی توصیه: براحتی به دسته بندی دهند و با اهداف برقرار کنند. نوع: چابانه اسم دارو: آمپول جنتامایسین دوز: یک عدد هر 12 ساعت نحوه مصرف:	15.89		
1	برای درمان تب و بدن‌درد، خانم کریمی باید هر 6 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف کند و هر 12 ساعت یک کپسول آموکسی‌سیلین 500 بعد از غذا مصرف شود.	Name of the patient: Mrs. Krimi Diagnosis: Common cold and body aches Medication 1: Name: Ibuprofen 500 mg Dose: One tablet every 6 hours Instructions: To be taken after meals Medication 2: Name: Acetaminophen 500 mg Dose: One capsule every 12 hours Instructions: To be taken after meals	6.71		

			Name of the patient: Mr. Sadqi Diagnosis: Sinusitis Medication 1: Name: Azithromycin Dose: 250 mg Way of consumption: Once a day in the morning Instructions: For three days Type: Capsule	8.27
2	آقای صادق به دلیل سینوزیت حاد باید روزی یک عدد قرص آزیترومایسین 250 به مدت سه روز همراه صبحانه مصرف کند و قطره فیل‌الفرین را هر 8 ساعت در هر سوراخ بینی بچکاند.	Patient Mr. Sadqi should consume one capsule of Azithromycin daily in the morning for three days. He should also use a dropper to put a quarter of a spoonful of phenylephrine in each affected nostril every eight hours.	نام بیمار: خانم عسگری تشخیص بیماری: آرژی فصلی دارو: 1: نام: سیزوپرین دوز: دو عدد نحوه مصرف: روزی هر غذا توضیه: ششایک فاشقی شربت دین‌خیدرامین قبل از خواب میل نوع: قرص	10.87
3	خانم عسگری به دلیل آرژی فصلی باید روزی دو عدد قرص سیزوپرین همراه غذا مصرف کند و شبها یک فاشقی شربت دین‌خیدرامین قبل از خواب میل نماید.		Name of the patient: A seven-year-old child Diagnosis: Mild head injury Medication 1: Name: Sucralfate Dose: 500 milliliters Intake method: Every 8 hours after food Instructions: To be taken for up to 7 days Type: Liquid (suspension) Medication 2: Name: Ibuprofen Dose: One sachet Intake method: Every 6 hours Instructions: As prescribed by the doctor Type: Powder for suspension (sachet)	9.09
4	کودک هفت‌ساله‌ای که دچار عفونت گلو شده است باید هر 8 ساعت 5 میلی شربت سفالکسین مصرف کند و هر 6 ساعت یک فاشقی شربت استامینوفن برای تب تجویز شده است.		نام بیمار: حسام تشخیص بیماری: رلاکس معده دارو: 1: نام: فاموتیدین دوز: یک عدد قرص نحوه مصرف: شبها بعد از نوشیدن ناهار توضیه: - نوع: قرص	16.09
5	آقای حسام برای رلاکس معده باید شبها یک عدد قرص فاموتیدین 40 قبل از خواب و همراه ناهار یک عدد قرص زائیتدین مصرف کند.		دارو: 2: نام: زائیتدین دوز: یک عدد قرص نحوه مصرف: هر روز بعد از نوشیدن ناهار توضیه: - نوع: قرص	
			جسای، برای حسام، هر نام بیمار: خانم افغانی تشخیص بیماری: سرماخوردگی دارو: 1: نام: لوراتادین دوز: نمایش داده شده نیست نحوه مصرف: روزی سه بار بعد غذا توضیه: نادیده نوع: قرص	15.87
6	جهت درمان سرماخوردگی، خانم افغانی باید روزی سه بار قرص لوراتادین پس از غذا مصرف کند و شبها قبل از خواب یک فاشقی شربت دین‌خیدرامین نیز میل نماید.		دارو: 2: نام: دین‌خیدرامین دوز: یک فاشقی میل نحوه مصرف: شبها قبل از خواب توضیه: نادیده نوع: شربت	
			نام بیمار: خانم فرهنگند تشخیص بیماری: برونشیت دارو: 1: نام: آزیترومایسین دوز: یک عدد نحوه مصرف: با معده خالی	16.09
7	خانم فرهنگند با تشخیص برونشیت باید روزی یک عدد قرص آزیترومایسین با معده خالی و هر 8 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف نماید.		دارو: 2: نام: استامینوفن دوز: ۵۰۰ میلی گرم (500 مگ) نحوه مصرف: هر 8 ساعت یک عدد	
			توضیه: اینتا رقی ۷، ۱۰ و مصرف نماید در صورت نیاز به اطلاعات و	
8	برای درد مفاصل، آقای تقوی باید قرص ایبوپروفن 400 را هر 8 ساعت بعد از غذا و ناپروکسن 250 را روزی دو بار همراه یک لیوان آب میل کند.	Name of the patient: [Mohammad Teqvi] Diagnosis: [Migraine] Medication 1: Name: [Ibuprofen] Dose: [400 milligrams] Instructions: [Take one tablet every 8 hours after food] Prescription: [Take for 2 days] Type: [Tablet] Medication 2: Name: [Naproxen] Dose: [250 milligrams] Instructions: [Take twice a day after food] Prescription: [Take with one liter of water daily] Type: [Tablet]	9.75	
9	کودک دهم‌ساله‌ای که کمپوئی دانه باید روزی یک قرص آهن همراه صبحانه و شربت اسکورینیک اسید نیز روزی دو بار برای جذب بهتر مصرف کند.		نام بیمار: کودک دو ساله تشخیص بیماری: کمخونی دارو: 1: نام: قرص آهن دوز: یک قرص نحوه مصرف: روزی صبحانه توضیه: - نوع: قرص	12.73
			دارو: 2: نام: شربت اسکورینیک اسید دوز: - نحوه مصرف: روزی دو بار توضیه: - نوع: شربت	

از متن نسخه، فقط این اطلاعات را استخراج کن:

1. نام بیمار
2. تشخیص بیماری
3. لیست داروها شامل:
 - نام دارو
 - دوز (مثلاً: ۵۰۰ میلی گرم، ۱ عدد، نصف قرص)
 - نحوه مصرف (مثلاً: روزی دوبار بعد غذا)
 - توصیه پزشک (مثلاً:

10	خانم مرادی که دچار حساسیت پوستی است باید روزی یک عدد قرص لوراتادین صبح‌ها و شب‌ها بهاد هیدروکورتیزون را روزی نواحی آسپ‌پدیده بهالد.	<p>Name of the patient: Mrs. Maradi Diagnosis: Sensitivity to skin</p> <p>Medication 1: Name: Loratadine Dose: One capsule Intake method: In the morning and evening Instructions: To be taken on affected areas Type: Tablet (for topical use)</p> <p>Medication 2: Name: Hydrocortisone Dose: N/A Intake method: N/A Instructions: To be applied on affected areas Type: Cream or ointment</p>	8.07	11.5005
11	برای درمان عفونت مجاری اندری، آقای خلیلی باید هر 12 ساعت یک عدد کپسول سلفاکسین 500 و روزی سه بار قرص مترونیدازول همراه غذا مصرف نماید.	<p>Name of the patient: Khalili Diagnosis: Urinary tract infection</p> <p>Medication 1: Name: Sulfadexin capsules Dose: 500 mg Way of consumption: One capsule every 12 hours after food Prescription: To be taken for 3 days Type: Capsule</p> <p>Medication 2: Name: Metronidazole tablets Dose: N/A (prescription-dependent) Way of consumption: One tablet with food, three times a day Prescription: To be taken for the duration prescribed by the doctor Type: Tablet</p>	9.31	
12	خانم داوی که با اسهال شدید و التهاب مواجه است باید روزی دو بار قرص لوپرامید و هر روز صبح یک عدد قرص دکرامتازون مصرف کند. مصرف مایعات فراموش نشود.	<p>نام بیمار: خانم داوی تشخیص بیماری: اسهال شدید و التهاب</p> <p>دارو 1: نام: لوپرامید دوز: دو بار روزانه نحوه مصرف: — توصیه: مصرف مایعات ضروری نوع: قرص</p> <p>دارو 2: نام: دکرامتازون دوز: یک عدد روزانه صبح نحوه مصرف: — توصیه: — نوع: قرص</p>	13.79	
13	کودک سمساله با گلودرد ویروسی باید هر 6 ساعت یک فاشق شربت استامینوفن و هر 12 ساعت یک فاشق شربت آبل هیستامین بعد از غذا مصرف کند.	<p>نام بیمار: کودک سمساله تشخیص بیماری: گلودرد ویروسی</p> <p>دارو 1: نام: شربت استامینوفن دوز: یک فاشق نحوه مصرف: هر 6 ساعت بعد از غذا توصیه: — نوع: شربت</p> <p>دارو 2: نام: شربت آبل هیستامین دوز: یک فاشق نحوه مصرف: هر 12 ساعت بعد از غذا توصیه: — نوع: شربت</p>	15.35	
14	آقای رفیعی با آلرژی تنفسی باید روزی یک عدد قرص فکسوفنادین با شکم خالی و شب‌ها قبل از خواب شربت دیفن‌هیدرامین میل کند.	<p>نام بیمار: رفیعی تشخیص بیماری: آلرژی تنفسی</p> <p>دارو 1: نام: فکسوفنادین دوز: یک عدد نحوه مصرف: شب‌ها قبل از خواب توصیه: — نوع: قرص</p> <p>دارو 2: نام: دیفن‌هیدرامین دوز: میل کند نحوه مصرف: — توصیه: — نوع: شربت</p>	12.54	
15	خانم جباری که دچار کسود ویتامین C شده است باید شربت آسکوربیک اسید را روزی دو بار بعد از غذا و قرص زینک را همراه وعده شام مصرف کند.	<p>نام بیمار: خانم جباری تشخیص بیماری: کسود ویتامین C</p> <p>دارو 1: نام: شربت آسکوربیک اسید دوز: — نحوه مصرف: روزی دو بار بعد از غذا توصیه: — نوع: شربت</p> <p>دارو 2: نام: قرص زینک دوز: — نحوه مصرف: همراه وعده شام توصیه: — نوع: قرص</p>	13.66	
16	برای بهبود خواب، آقای شایان باید هر شب قبل از خواب، یک عدد قرص زولپیدم 10 مصرف کند و در صورت اضطراب، صبح‌ها یک عدد قرص آلپرازولام با معده خالی میل نماید.	<p>Name of the patient: Mr. Shayan Diagnosis: Insomnia</p> <p>Medication 1: Name: Zolpidem Dose: 500 milligrams Instructions: One tablet before bedtime Prescription: For up to 7 days Type: Capsule</p>	5.73	
17	کودک هشت‌ساله با اوتیت میانی باید هر 8 ساعت 5 سی‌سی شربت سفیکسیم مصرف کند و شب‌ها قبل از خواب یک فاشق شربت دیفن‌هیدرامین داده شود.	<p>(If there are more medications, continue in the same format)</p> <p>Name of the child: [Six-year-old child] Diagnosis: [Type 1 diabetes]</p> <p>Medication 1: Name: [Insulin syrup (Sufximab)] Dose: [500 milliliters] Intake method: [Every 8 hours after meals] Instructions: [To be consumed for up to 7 days] Type: [Liquid]</p> <p>Medication 2: Name: [Deficits mineral water (Difucan)] Dose: [Not provided] Intake method: [Before bedtime] Instructions: [Not provided] Type: [Liquid]</p>	9.99	

دفع خوب نیست .
همانطور که مشاهده میکنیم، تولید بعضی از جوابهایش به زبان انگلیسی هست . زبان فارسی هم خوب ترجمه نمیکند. در تشخیص بیماری هم ضعیف عمل میکنند. در کل دقت اصلا خوب نیست. زمان اجرا هم نسبت به مدل درنا بیشتر است و لحاظ زمانی هم مناسب نیست. همچنین از مثالهایی که داخل پرامیت نوشته شده ، به طور اشتباه برای نسخه ای استفاده میکنند که شامل آن مثال ها و توضیحات نیست.

دارو 1:
نام: [مثال:
آموکسی‌سیلین]
دوز: [مثال: ۵۰۰ میلی‌گرم]
نحوه مصرف: [مثال: هر ۸ ساعت یک‌بار بعد از غذا]
توصیه: [مثال: ۷ تا ۱۰ روز مصرف شود]
نوع: [مثال: کپسول]

(اگر داروهای بیشتری هست، ادامه بده به همین شکل)

فقط اطلاعات خواسته‌شده را بده. توضیح یا تفسیر ننویس.

18	خانم نظری برای رفلکس معده باید صبحها ناشتا یک عدد قرص امیزول و شبها بعد از شام یک قرص فاموتیدین مصرف نماید.	نام بیمار: خانم نظری تشخیص بیماری: (نام بیماری خاص برای این مثال نزدیک نیست) دارو 1: نام: امیزول دوز: (نامعدیل به نظر بهداشت کارشناس و استاد درمان باشد) نحوه مصرف: صبحانه هر روز یک عدد قرص توضیه: (نامعدیل به نظر بهداشت کارشناس و استاد درمان باشد) نوع: پودر	16.08
19	خانم نادری با سردرد مزمن باید روزی هر 6 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف کند و در صورت شدت درد، پماد موضعی منتول روی شقیقه‌ها بمالد.	Name of the patient: Khanoom Nadiri Diagnosis: Severe headache Medication 1: Name: Ibuprofen 500 mg Dose: One capsule every 6 hours Instructions: In case of intense pain, apply warm compresses to affected areas. Type: Capsule.	5.16
20	برای درمان عفونت شدید، آقای پرویزی باید روزی یک عدد قرص آزیترومایسین و هر 12 ساعت یک عدد آمپول جنتامایسین تزریقی طبق دستور پزشک دریافت کند.	نام بیمار: آقای پرویزی تشخیص بیماری: عفونت شدید دارو 1: نام: آمپول جنتامایسین دوز: - نحوه مصرف: هر 12 ساعت یک عدد توضیه: با دستور پزشک نوع: تزریقی دارو 2: نام: آزیترومایسین دوز: - نحوه مصرف: روزی یک عدد توضیه: با دستور پزشک نوع: قرص	14.86