AMINOZIME

18 %	40,05 %	1,23	BIOSTIMULANT ORGANIQUE À BASE D'ACIDES AMINÉS
Acides aminés libres	Matière organique totale	Densité	

PRÉSENTATION ET CARACTÉRISTIQUES

AMINOZIME est un biostimulant organique à base d'acides aminés d'origine végétale. Il apporte à la culture un large spectre d'acides aminés essentiels au bon développement de la plante. Il est conçu pour une application foliaire et racinaire et accompagne le fonctionnement du métabolisme végétal, le développement végétatif ainsi que la production.

Son utilisation est recommandée pendant les périodes de pleine croissance végétative, ainsi qu'au cours de la floraison et de la fructification. L'étiquette indique également son intérêt lorsque la culture est soumise à des conditions défavorables, notamment les basses températures, le vent froid et les sols appauvris. AMINOZIME contribue au développement végétatif, à la floraison, à la nouaison et au développement des fruits.

COMPOSITION GARANTIE

PARAMÈTRE	TENEUR
Acides aminés libres	18,00 % P/P
Carbone organique total	22,70 % P/P
Azote total (N)	3,31 % P/P
Anhydride phosphorique (P_2O_5)	0,03 % P/P
Oxyde de potassium (K_2O)	1,28 % P/P
Matière organique totale	40,05 % P/P
Bétaïne	0,004 %
Densité	1,23
pH	4,71

PROFIL EN ACIDES AMINÉS

Acide aspartique : 1,30 % • Acide glutamique : 2,60 % • Alanine : 2,81 % • Glycine : 3,62 % • Phénylalanine : 0,24 % • Proline : 1,50 % • Sérine : 3,25 % • Thréonine : 2,92 % • Valine : 0,83 % • Leucine : 0,75 % • Lysine : 0,28 % • Isoleucine : 0,26 % • Arginine : < 0,10 % • Histidine : < 0,10 % • Méthionine : < 0,09 % • Tyrosine : 0,14 % • Acide gamma-aminobutyrique : < 0,05 % • Hydroxyproline : < 0,05 % • Tryptophane : < 0,05 %.

Valeurs reprises de l'aminogramme figurant sur l'étiquette (acides aminés totaux, p/p).

BH FERTI

DOSES ET MODES D'EMPLOI

CULTURE	DOSE ET MODALITÉ D'APPLICATION
Maraîchage	**Application foliaire :** 250–300 cc/hL. **Fertigation :** 2 à 5 L/ha, tous les 10 à 15 jours pendant la période post-transplantation.
Fruits rouges et cultures tropicales	**Application foliaire :** 250–300 cc/hL. **Fertigation :** 2 à 5 L/ha, tous les 10 à 15 jours pendant le développement végétatif.
Arbres fruitiers (avocatier, agrumes et autres)	**Application foliaire :** 200–300 cc/hL en préfloraison, à la mise à fruit, pendant la croissance des fruits et en cas de retard de développement végétatif. **Fertigation :** 5 à 10 L/ha en préfloraison et après la nouaison.
Cultures intensives (tournesol, soja, tabac, colza, coton)	1 à 2 L/ha en mélange avec les produits phytosanitaires, sous réserve de compatibilité.
Céréales	1 à 2 L/ha avec des herbicides de post-émergence ou avec un fongicide.
Olivier	2 à 4 applications par cycle de culture. Dose : 200–300 cc/hL pendant les périodes d'activité maximale : croissance végétative, fructification et maturation.

CONSEILS D'UTILISATION

• Bien agiter le produit avant emploi.

• Respecter les doses et les périodes d'application indiquées pour chaque culture.

• Pour les applications en mélange avec des produits phytosanitaires, vérifier au préalable la compatibilité du mélange.

PRÉCAUTIONS ET COMPATIBILITÉ

• Ne pas mélanger AMINOZIME avec des huiles.

• En cas de doute, effectuer un essai préalable sur un petit volume afin de vérifier la compatibilité.

• Utiliser le produit conformément à son étiquette et aux recommandations techniques applicables à la culture.

BH FERTI

CONDITIONNEMENT: 5L