# CITO-CAL

**COMPLEXE DE CALCIUM CHÉLATÉ**

## CARACTÉRISTIQUES

CITO-CAL est un fertilisant riche en calcium. Il se distingue par une absorption et une assimilation rapides par la plante. Sa composition est spécifique à la prévention et au traitement du **BITTER PIT** chez les pommes, de la pourriture apicale de la tomate, de la pourriture du poivron, du dessèchement des feuilles de melon, des brûlures des pointes de laitue et de scarole, de la fosse amère, de la tache violette, du cœur noir, du creux et des craquelures chez la chicorée. Il contribue également à réduire le craquage des cerises, pêches, nectarines et prunes.

Le traitement améliore la fermeté des fruits et leur durée de conservation. CITO-CAL est idéal pour l'application foliaire du calcium et la fertigation grâce au complexe LSA. Appliqué sur les feuilles, il n'est pas phytotoxique et ne provoque pas d'oxydation chez les fruits sensibles. Il améliore la qualité des fruits et aide à prévenir les déséquilibres nutritionnels liés aux carences en calcium.

## COMPOSITION & PROPRIÉTÉS

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Oxyde de calcium (CaO) | 16 % p/p · 20 % p/v |
| Matière organique | 21 % p/p · 26 % p/v |
| Agent complexant | LSA |
| Densité / pH | 1,23 / 5,1 |
| État | Liquide soluble (L.S.) |

## MODE D'APPLICATION & DOSAGE

CITO-CAL est recommandé pour les arbres fruitiers (à noyaux ou sans noyaux), les agrumes, les cultures horticoles, extensives et ornementales. Sa formule assimilable permet une application en fertigation et par voie foliaire. Éviter les heures de fort ensoleillement.

**Dosage général foliaire :** 250–500 cc/hL d'eau.

### APPLICATION FOLIAIRE

- **Arbres fruitiers, oliviers et vigne :** 200–350 cc/hL, tous les 15 jours dès l'apparition du fruit.
- **Agrumes et cultures subtropicales (avocatier) :** 250–500 cc/hL, 4–5 applications à partir de la nouaison.
- **Cultures maraîchères :** 200–300 cc/hL, tous les 15 jours dès le développement végétatif.
- **Fruits rouges :** 200–300 cc/hL, tous les 15 jours dès l'apparition du fruit.
- **Légumes feuilles :** 250–350 cc/hL, chaque semaine de 10 à 15 jours après repiquage.
- **Cultures extensives, florales et ornementales :** 250–300 cc/hL, tous les 15 à 25 jours.

### FERTIGATION

- **Arbres fruitiers :** 5–7 L/ha/application, après apparition des fruits.
- **Maraîchères et fruits rouges :** 3–5 L/ha/application, après apparition du fruit et pendant sa croissance.
- **Cultures en rangs :** 10 L/ha/application.

### PÉRIODES D'APPLICATION

**Cacao :** 1re application en avril, 2e en mai, 3e en octobre et 4e en novembre.

**Cultures fruitières** (mangue, avocatier, anacardier, bananier, papaye, etc.) : 1re application dès la formation des premières fleurs ; 2e application 10 à 15 jours après la première.

### POST-RÉCOLTE

En trempage : 500 cc/100 L. Maintenir les fruits en contact avec la solution pendant 20 à 40 secondes.

### PRÉCONISATIONS D'EMPLOI

- Traiter en dehors des heures chaudes de la journée.
- Respecter les doses prescrites.
- Ne pas mélanger sans test préalable de compatibilité.
- En cas de doute, contacter un technicien.

CITO-CAL ne présente généralement pas de problèmes d'application. En cas de doute, effectuer un test de compatibilité et suivre les recommandations d'application sur le terrain.




Distribué par BH FERTI · Produit destiné à un usage agricole professionnel.

**Conditionnement :** 5 L