
a
Agreement by baseline (n = 1,449)
Spearman ρ (pred vs SuSiE z)
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
F1
A1
G
U
b
Primary contrasts (grey band: ±MEI 0.0228)
F1 − A1
F1 − G
F1 − U
No meaningful difference
Inconclusive
Inconclusive
−0.04 −0.02 0.00 0.02 0.04
Δρ (thick: 95% CI; thin: Holm-level CI)
c
F1 − A1 under pre-specified sensitivity analyses
−MEI
+MEI
Primary (rule P) (n=1,449)
Rule D (closest to splice site) (n=1,449)
Strong variants (DS ≥ 0.10) (n=589)
Weak variants (DS < 0.10) (n=860)
One unit per signal group (n=847)
F1 incl. HSB155 (13 donors) (n=1,449)
Standard regions only (n=1,449)
Spliced fraction ≥ 0.10 (n=1,449)
No thinning (n=1,449)
ε = 0.001 (n=1,449)
ε = 0.1 (n=1,449)
Truth: conditional slope (n=480)
Baseline difference T1 (low) (n=482)
Baseline difference T2 (n=484)
Baseline difference T3 (high) (n=483)
Adult truth (GTEx cortex)* (n=428)
−0.03
−0.02
−0.01
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
Δρ F1 − A1, 95% CI