


- さんの検査結果 2025/10/05

患者氏名：- 生年月日：- 検査日：2025/10/05

正常

前額角

ROI: 86.0 mm²




■ <30μm ■ 30-60μm ■ <60μm ■ >90μm

毛髪/毛包比	<60μm 比率	<30μm 比率
1.36	18%	1%

基準 (A)




本人 (B)



正常

頭頂部

ROI: 86.0 mm²



■ <30μm ■ 30-60μm ■ <60μm ■ >90μm

毛髪/毛包比	<60μm 比率	<30μm 比率
1.44	12%	1%

基準 (A)



本人 (B)



正常

つむじ

ROI: 86.0 mm²




■ <30μm ■ 30-60μm ■ <60μm ■ >90μm

毛髪/毛包比	<60μm 比率	<30μm 比率
1.62	5%	0%

基準 (A)




本人 (B)



正常

後頭部


ROI: 86.0 mm²




■ <30μm ■ 30-60μm ■ <60μm ■ >90μm

毛髪/毛包比	<60μm 比率	<30μm 比率
1.43	23%	3%

基準 (A)



本人 (B)



判定ロジック

- 基準1: <60μm (③) ≥ 30%
- 基準2: 毛髪/毛包比 (②) ≤ 1.80 または <30μm (④) ≥ 15%

部位	③ <60μm	④ <30μm	② 毛髪/毛包比	判定
前額角	18%	1%	1.36	正常
頭頂部	12%	1%	1.44	正常
つむじ	5%	0%	1.62	正常
後頭部	23%	3%	1.43	正常

Hamilton-Norwood 分類

Stage I	参考
Stage II	参考
Stage III	参考
Stage III Vertex	参考
Stage IV	参考
Stage V	参考
Stage VI	参考
Stage VII	参考

推定: I

医師コメント

全領域で基準未満です。撮影条件とROIの一貫性を保ち、経過観察を推奨します。