- さんの検査結果　2025/10/6 9:09:02

患者氏名：-　　生年月日：-　　検査日：**2025/10/6 9:09:02**

薄毛

前額角

ROI: 86.0 mm²



<30μm　30–60μm　60–90μm　>90μm

毛髪/毛包比	<60μm 比率	<30μm 比率
1.19	76%	13%

基準（A）

本人（B）



正常

頭頂部

ROI: 86.0 mm²

<30μm　30–60μm　60–90μm　>90μm

毛髪/毛包比	<60μm 比率	<30μm 比率
1.55	6%	0%

基準（A）

本人（B）



正常

つむじ

ROI: 86.0 mm²

<30μm　30–60μm　60–90μm　>90μm

毛髪/毛包比	<60μm 比率	<30μm 比率
1.47	8%	1%

基準（A）



本人（B）



正常

後頭部

ROI: 86.0 mm²

<30μm　30–60μm　60–90μm　>90μm

毛髪/毛包比	<60μm 比率	<30μm 比率
1.40	8%	1%

基準（A）



本人（B）



判定ロジック

- 基準1：<60μm（③） ≥ **30%**
- 基準2：毛髪/毛包比（②） ≤ **1.80** または <30μm（④） ≥ **15%**

部位	③ <60μm	④ <30μm	② 毛髪/毛包比	判定
前額角	76%	13%	1.19	AGA疑い
頭頂部	6%	0%	1.55	正常
つむじ	8%	1%	1.47	正常
後頭部	8%	1%	1.40	正常

Hamilton-Norwood 分類

- Stage I　参考
- Stage II　参考
- Stage III　参考
- Stage III Vertex　参考
- Stage IV　参考
- Stage V　参考
- Stage VI　参考
- Stage VII　参考

推定: III

医師コメント

前額角で<60μm: 75.7%, 毛髪/毛包比: 1.19 にて細毛化が示唆されます。Hamilton–Norwood分類は III 相当を示唆します。

ppmm/ROI: 太さ[μm] = px/ppmm×1000, 面積[mm²]=(w×h)/ppmm²

Generated by TrichoReport v1.7