

世界观-海怪

海怪是VTG世界观的重要组成部分之一：它们原是地球生态崩溃和环境污染造成的海洋生物变异而来，其中部分又在地海战争前后受到B公司的人工干预（嵌合体试验/变异引导/定向繁殖等）。在VTG的故事开始时（2080年）已经变得面目全非。部分开始飞速变异，体型巨大化并且繁殖与攻击欲望增长。

它们啃食潜艇的外壳，塞入其中产卵，不断有居民在潜艇城市中目击或受到袭击。

近些年被尝试拿来制药。（蓄压）

存在目的：拓宽世界观背景，添加猎奇剧情（正当化我们打克苏鲁的tag的行为），同时作为抽象隐喻：海怪在环境中的出现和主角Sa的状态息息相关。

Art Direction:https://miro.com/app/board/uXjVKzCpFXg=/ 概念设计待更新

重要分类：

- 星脊海怪：**由B公司的生物实验污染造成的有脊椎海怪都有一个共同点：脊椎的横切面是一个六角星形，所以又被称作星脊。基因显示出嵌合体的特征，普遍攻击欲望强烈。
- 大多数为中小型到大型体型。
- 星脊由于移速/坚硬的外壳和容易操作的脑部神经结构，在地海战争期间大量被改造后（头部插入生物电脑元件）用于军事用途。
- 软体海怪：**无脊椎的软体海怪。特征是都拥有带独立神经元触手。部分拥有较高智力和毒性。繁殖欲望极强。
- 体型从小型到大型到巨型不等。
- 拥有多余的气囊，可以在海底盐湖甚至富含氧气的人类潜艇内短暂存活。并且由于其子嗣在发育中可根据周遭环境中含氧量进行变态的属性，大量将卵产在海底城市的潜艇建筑里。

活动海域的深度	海底城市普遍研究机构对不同类型的海怪观察报告显示他们多被目击到在水深300米-1500米的区域活动（再往下缺乏数据）
---------	--

体型	有大有小。小的和一只猫差不多大（比如海底西瓜虫），大的展开面积可以达到一个4层办公楼大小。（仅限居民生活中能目击到的，不算目击较少或者缺乏存在证据的那些） （cheri）衍生：设计大小的时候可以考虑一下square cube law。体积越大的生物因为散热慢，所以不怕冷/ 体积越小的东西因为散热快，所以要吃很多东西来保持热量。圆圆的东西因为体积大，所以比方方的东西散热更慢）
游动方式	在海床/潜艇建筑上爬行，游动，漂浮皆有 还有些会把自己肚皮黏在潜艇建筑上，或者用触须倒挂在潜艇建筑的支架上。 设定一些生物群是海怪和海洋生物组合而成的，也可以有少数生物群是人工干预制造出来的，作为潜艇建筑群外围区域的盾和生物保护膜（只是一个想法） （cheri）（一些深海生物可以在海床上走路/ 用鱼鳍和鱼尾游动/ 漂浮） （衍生：森林里的落叶之间会相互勾着，然后这些树叶会变成一个像地毯一样的结构，所以很难被风吹起来。如果每个海怪像水母一样很轻，但是如果他们能互相interlock起来是不是可以变成超大一片 —— 不但不会被海水冲走，还可以控制游动方向。有点点像ref里面的共生菌体，但是大很多。）
速度	小型的什么速度都有（看是游的还是飘的。能游的除了带肌肉的软体动物结构海怪（乌贼啊章鱼啊）之外基本上都是带脊椎的。 由B公司的生物实验污染造成的有脊椎海怪都有一个共同特征：脊椎的横切面是一个六角星形，所以又被称作星脊。 星脊的普遍游动速度是海怪中最快的，中型星脊（大多具有鲨鱼特征）的速度一般为20-40公里每小时。其中定点强化过的，速度最快的佼佼者有着100公里每小时的记录——此类星脊只在战争年代被记录出现过。 （cheri）（衍生：ref里面的six gill shark是那种在海床上捡垃圾吃的东西，可以一年都不吃新城代谢很慢，所以游的也很慢）
智力，寿命	小型的甲壳类的和虫子差不多。寿命从1-10年不等。繁殖欲较强。 中型的：星脊大部分为普通鲨鱼智力，根据基因嵌合的来源导致不同水平的社会性。少数能达到1-2岁小孩的智力（和狗差不多，所以其实存在驯养可能）有繁殖欲，理论上寿命5-20年不等。 软体海怪拥有较高智力，从一些记录他们试图打开潜艇建筑舱门的录像和极具创意的产卵方式可知。有可能智力上可以达到3-5岁小孩水平。但是它们

	寿命极短，在圈养环境下都只有2年不到。繁殖欲极高。 大型的：未知。现有解剖样本显示大多几乎没有智力，只存在最基本的进食和自我保存本能（甚至连繁殖欲都没有，可能嵌合了巨型水母基因）。极少数拥有发达的大脑和神经元（可能拥有章鱼嵌合基因），但是捕获难度极高所以缺乏有效研究数据。 由于海怪是近100年内才出现的物种，大型海怪能达到的寿命未知。 特殊状况：军用改造。星脊由于移速/坚硬的外壳和容易操作的脑部神经结构，在地海战争期间大量被改造后用于军事用途。改造的星脊头部可以接入生物电脑元件，被远程操纵执行一些侦察或者爆破任务。
处于食物链的哪段/ 生态关系	种类的不同导致食物链的多端都有。中型（星脊，软体海怪）多是掠食者。大型的有的是移动的食物源头（谁见到都能上去吃两口），处于食物链中下层，有些主要是掠食者（潜伏和过滤小型生物） 总体来说对自然海域的食物链是破坏性的，但是破坏程度和其他的污染/战争/人工地形改造几乎不值得一提。
是否群居	1.看类型（是否有群居生物的嵌合基因） 2.其中不乏一些聚在一起密密麻麻的甲壳类海怪（参考海底盐湖变的扇贝） 3.军用改造过的星脊产下的后代也会有群聚本能，会本能地聚集在一起对一个就近目标发起捕猎和破坏 4.少数类型的软体海怪可以通过群居，将自己的神经元通过接触连接在一起，形成一种近乎于蜂群意志的生物结构。
捕猎方式，攻击性和进食方式	各有不同。暂不论述处于食物链的中下层的那些，只谈掠食性海怪。 1.星脊的捕猎方式主要为发现目标后直接攻击，咬中猎物后咀嚼与吞吃。由于海洋生态环境恶劣，猎物减少，星脊比起杀死猎物，更加容易追求直接活吃。它们的食谱中包括其他鱼类，甲壳动物，有时也吃一些腐烂的生物肉，生物垃圾和人造肉。（由于后两者多从人类聚集区被丢弃出来，所以时不时有星脊出现在潜艇建筑附近）攻击性较高。 星脊的牙齿坚硬并且很容易掉落后再设生，所以进食通过直接啃。 虽然一部分星脊的肉/器官有毒性和污染，但他们不会使用毒素进行捕猎。 2.软体海怪更多进行潜伏袭击，它们的外形多拥有拟态/迷彩能力。触碰到猎物后，它们中有些会适用触手绞缠，有些会像猎物注入毒素。食谱和星脊差不多。软体海怪拥有多余的气囊，可以在海底盐湖甚至富含氧气的人类潜艇

	内短暂存活。攻击性一般。 软体海怪的进食大体上分两种，一种是像蛇一样吞进去后慢慢消化，一种是像猎物注入有溶解效果的粘液，在吞食猎物的过程中猎物会慢慢地烂掉。这种粘液甚至有破坏dna的效果，并且化学处理后极其易燃。提取后制造的化学品“溶解剂”被用于生物垃圾处理，也常被用于犯罪后销毁现场。 值得一提的是，软体海怪似乎注意到了人类的潜艇建筑群中潜在的食物资源。近些年常有软体海怪撬开潜艇外层进入产卵的现象，这造成了大量事故和居民困扰。
繁殖方式	1.甲壳类参考现实中的甲壳生物：在环境中释放卵或者精子，成为浮游生物，发育成幼虫后变为成体。 2.星脊：大多为雌雄同体，在特定温度和潮汐力中发情，找到另一只结构类似的星脊交配产下可以自由行动的幼体。幼体大多成型极快，一个星期就能捕猎了。 3.软体海怪：卵生。 软体海怪的卵也是星脊的食物来源之一，并且会散发出极大的信息素。因此软体海怪喜欢把卵产在可以凿出一个小洞塞进去的中空地点（最好还有一些工业味道和振动来驱赶猎食者）：比如人类潜艇建筑群。 如果卵生在有干燥空气而不是海水的区域，一些软体海怪的幼体在从卵成为幼虫时会经历短暂的变态（参考幼虫化为蛹）——并拥有可以呼吸氧气的器官。这种情况下幼虫可以在人类潜艇内部活下去。但是在孵化大约2个月左右会再次有一个变态过程，这种情况下幼虫会想尽一切办法进入海水空间里。 软体海怪大多有小而坚硬的弯刺，可以打洞或者撬动机械结构用。它们造成了大量潜艇建筑的损耗。 4.大型海怪：未知，推测为单性生殖分裂 （c）联想到了蒲公英种子会用它的倒刺来勾在其他植物/生物上方便发芽，如果是海怪的鱼卵的话，是否也可以用一个相似的结构来保证存活率）
骨骼	见不同种类海怪分类。星脊会定期换牙。大型带甲壳的海怪也有甲壳更换周期。 （c）（是软的还是硬的？是外骨骼还是内骨骼？会换壳吗？）（衍生：外骨骼除了硬，他的造型也可以作为防御方式的一种。比如乌龟圆圆的壳可以分散外力。插播：几万只螃蟹每年会聚集在一起换壳）
外观	外观由剧情需要和美术风格决定，参考海怪art direction page

	https://miro.com/app/board/uXjVKzCpFXg=/ (cheri) (有多少四肢/ 触手/ 鱼鳍。有多少对眼睛? 花纹pattern是什么颜色的, 成长的时候这些pattern会变色吗? 是否有camouflauge? 皮肤是光滑的/ 黏黏的/粗糙的?)
视力	(c) (眼球的结构 - 会不会反出红光/ 可以看到多少光谱?) <u>perceive的光谱是否有局限性? 比如可能看不到波长更长的红色, 及红外线; 但可以看到波长短的紫色, 或紫外线</u> <u>也许海怪可能会被某些光谱上的电磁破所吸引, 聚集到一些匪夷所思的地点。但是人类单凭肉眼观察看不出那些地点的奇特性, 看起来就像海怪像在黑暗中朝圣一样</u> (可以作为破案的线索之一 (园丁鸟的抛尸地点和独特标记手法) 还有剧情前进的重大节点 (藤壶部队的生物武器被一个无人注意到的标记吸引着去攻击目标)