

## Teil A

### Aufgabe A38

Gegeben sei ein nicht-leeres Intervall  $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$ , Zahlen  $x, x_0 \in (a, b)$  und eine  $(n+1)$ -mal differenzierbare Funktion  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ .

1. Zeigen Sie, dass die Ableitung der Funktion

$$F : t \in (a, b) \mapsto \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k,$$

durch  $t \in (a, b) \mapsto \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n$  gegeben ist.

2. Wenden Sie den Mittelwertsatz (Theorem 8.29) auf die obige Funktion  $F$  an, um die Formel  $R_{x_0, n}^f(x) = \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(\xi_C) (x - \xi_C)^n (x - x_0)$  für das Restglied nach Cauchy zu beweisen.
3. Verwenden Sie den verallgemeinerten Mittelwertsatz (Satz 8.28) für obiges  $F$  und die Funktion  $g : t \mapsto (x-t)^{n+1}$ , um die Formel  $R_{x_0, n}^f(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi_L) (x - x_0)^{n+1}$  für das Restglied nach Lagrange zu beweisen.

### Lösung

1. Da die Summe endlich ist können wir die Ableitung auf die einzelnen Summanden anwenden:

$$\begin{aligned} F' : t \mapsto \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k+1)}(t)}{k!} (x-t)^k - \sum_{k=1}^n f^{(k)}(t) k-1! (x-t)^{k-1} \\ = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k+1)}(t)}{k!} (x-t)^k - \sum_{k=0}^{n-1} f^{(k+1)}(t) k! (x-t)^k \\ = \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n \end{aligned}$$

Somit folgt die Behauptung.

2. Sei  $x > x_0 \in (a, b)$  dann ist  $F|_{[x_0, x]}$  stetig und auf  $(x_0, x)$  differenzierbar. Dann existiert ein  $\xi_C \in (x_0, x)$ , so dass  $F(x) - F(x_0) \stackrel{\text{MWS}}{=} F'(\xi_C) (x - x_0) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_C)}{n!} (x - \xi_C)^n (x - x_0)$ . Daraus folgt Behauptung.
3. Seien  $x, x_0$  wie oben. Dann ist  $F|_{[x_0, x]}$  stetig und  $g|_{[x_0, x]}$  ebenso, beide sind auf dem offenen Intervall differenzierbar. Dann existiert ein  $\xi_L \in (x_0, x)$ , so dass

$$\begin{aligned} F'(\xi_L) (g(x) - g(x_0)) &= g'(\xi_L) (F(x) - F(x_0)) \\ \Leftrightarrow \frac{f^{(n+1)}(\xi_L)}{n!} (x - \xi_L)^n (-(x - x_0)^{n+1}) &= -(n+1) (x - \xi_L)^n (F(x) - F(x_0)) \\ \Leftrightarrow \frac{f^{(n+1)}(\xi_L)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} &= F(x) - F(x_0) \end{aligned}$$

**Aufgabe A39**

Es sei  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definiert durch

$$f(x) := \int_0^x \log(t + \sqrt{1+t^2}) dt.$$

Beweisen Sie mit Hilfe der Taylor'schen Formel, dass

$$-\frac{1}{24}x^4 \leq f(x) - \frac{1}{2}x^2 \leq 0 \quad \text{für } x \in \mathbb{R}.$$

**Lösung**

Idee: Entwickle  $f$  in eine Taylorreihe um  $x_0 = 0$ .

Bestimme dazu die ersten 4 Ableitungen von  $f$ . Es gilt:

$$f'(x) = \log(x + \sqrt{1+x^2})$$

$$f''(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$f'''(x) = -\frac{1}{2}(1+x^2)^{-3/2} \cdot 2x = -\frac{x}{\sqrt{(1+x^2)^3}}$$

$$\begin{aligned} f^{(iv)}(x) &= -\frac{1 \cdot (1+x^2)^{3/2} - x(1+x^2)^{1/2} \cdot \frac{3}{2} \cdot 2x}{\left[(x^2+1)^{3/2}\right]^2} = -\frac{(1+x^2)^{3/2} - 3x^2(1+x^2)^{1/2}}{(1+x^2)^3} \\ &= -\frac{1}{(1+x^2)^{3/2}} + \frac{3x^2}{(1+x^2)^{5/2}} \end{aligned}$$

Damit gilt:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + \frac{f'(0)}{1!} \cdot x + \frac{f''(0)}{2!} \cdot x^2 + \frac{f'''(0)}{3!} \cdot x^3 + \frac{f^{(iv)}(\xi)}{4!} \cdot x^4 \\ &= 0 + 0 \cdot x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{0}{6} \cdot x^3 + \frac{1}{24} f^{(iv)}(\xi) \cdot x^4 \\ &= \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24} f^{(iv)}(\xi) \cdot x^4 \end{aligned}$$

wobei  $\xi \in (0, x)$  ist. Schätze nun die 4. Ableitung von  $f$  ab. Es gilt:

$$f^{(iv)}(\xi) = \frac{-(1+\xi^2) + 3\xi^2}{(1+\xi^2)^{5/2}} = \frac{2\xi^2 - 1}{(1+\xi^2)^{5/2}} \stackrel{2\xi^2 \geq -\xi^2}{\geq} \frac{-\xi^2 - 1}{(1+\xi^2)^{5/2}} = -\underbrace{\frac{1}{(1+\xi^2)^{3/2}}}_{\geq 1} \geq -1$$

Damit folgt:

$$f(x) - \frac{1}{2}x^2 \geq -1 \cdot \frac{1}{24}x^4 = -\frac{1}{24}x^4$$

Andererseits gilt für  $f$ :

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} \cdot x + \frac{f''(\xi)}{2!} \cdot x^2 = \frac{f''(\xi)}{2}x^2$$

mit  $\xi \in (0, x)$ . Da  $f''(\xi) = \frac{1}{\sqrt{1+\xi^2}} \leq 1$  gilt, folgt:

$$f(x) \leq \frac{1}{2}x^2 \quad \Leftrightarrow \quad f(x) - \frac{1}{2}x^2 \leq 0.$$

Insgesamt erhalten wir also die Behauptung.

**Aufgabe A40**

Man bestimme das Taylorpolynom  $n$ -ten Grades  $T_n(x)$  um  $x_0 = 0$  für  $f(x) := \log(1+x)$  und beweise mit Hilfe des Restgliedes in Integralform, dass für alle  $x \in (-1, 1)$  gilt

$$T_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x).$$

### Lösung

Es gilt  $f'(x) = (1+x)^{-1}$  und damit  $f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1}(n-1)!(1+x)^{-n}$  für  $n \in \mathbb{N}$  (per Induktion)

Dann lautet das Taylorpolynom nach Definition  $T_n(x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k}$  für  $x > -1$  und da  $f$  auf  $(-1, \infty)$  beliebig oft differenzierbar ist, folgt mit Satz 9.46 für festes  $x > -1$

$$\begin{aligned} R_n(x) &= \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt = \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n (-1)^n n! (1+t)^{-n-1} dt \\ &= (-1)^n \int_0^x \frac{1}{1+t} \left( \frac{x-t}{1+t} \right)^n dt = \begin{cases} (-1)^n \int_0^x \frac{1}{1+t} \left( \frac{x-t}{1+t} \right)^n dt, & x \geq 0, \\ (-1)^{n+1} \int_x^0 \frac{1}{1+t} \left( \frac{x-t}{1+t} \right)^n dt, & -1 < x < 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Setze nun  $g : [0, x] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(t) := \frac{x-t}{1+t}$ , falls  $x \geq 0$  und  $g : [x, 0] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(t) := \frac{x-t}{1+t}$ , falls  $-1 < x < 0$ . Dann ist  $g$  auf  $[0, x]$  bzw.  $[x, 0]$  stetig und auf  $(0, x)$  und  $(x, 0)$  differenzierbar mit Ableitung

$$g'(t) = \frac{-(1+t) - (x-t)}{(1+t)^2} = \frac{-1-x}{(1+t)^2} < 0 \quad \text{für alle } t$$

Daher ist  $g$  monoton fallend. Es folgt

$$\frac{x-t}{1+t} \leq \begin{cases} \frac{x-0}{1+0} = x, & x \geq 0, \\ \frac{x-x}{1+x} = 0, & -1 < x < 0. \end{cases} \quad \text{und} \quad \frac{x-t}{1+t} \geq \begin{cases} \frac{x-x}{1+x} = 0, & x \geq 0, \\ \frac{x-0}{1+0} = x, & -1 < x < 0. \end{cases}$$

also insgesamt

$$\begin{aligned} x \geq 0 : 0 &\leq g(t) \leq x, \\ -1 < x < 0 : x &\leq g(t) \leq 0, \end{aligned}$$

stets gilt also  $|g(t)| \leq |x|$ , also  $|g(t)|^n \leq |x|^n$  für alle  $t$ . Somit erhält man

$$|R_n(x)| \leq \int_0^x \left| \frac{1}{1+t} \right| \cdot \left| \frac{x-t}{1+t} \right|^n dx \leq |x|^n \int_0^x \left| \frac{1}{1+t} \right| dt = |x|^n |\log(1+x)|.$$

Genau dann, wenn  $x \in (-1, 1)$ , folgt  $|x|^n |\log(1+x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ , was zu zeigen war.

### Aufgabe A41

Beweisen Sie das folgende Majorantenkriterium für uneigentliche Integrale.

Seien  $f, g : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  auf jedem Intervall  $[a, b]$  mit  $b > a$  Riemann-integrierbar. Für alle  $x \in [a, \infty)$  gelte  $g(x) \geq 0$  und  $|f(x)| \leq g(x)$ . Falls das uneigentliche Integral  $\int_a^\infty g(x) dx$  existiert, dann existiert auch

$$\int_a^\infty f(x) dx.$$

### Lösung

Sei  $\varepsilon > 0$  gegeben und  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  eine beliebige Folge mit  $b_1 = 1$  und  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$ . Dann gilt

$$\int_a^{b_n} f(x) dx = \sum_{k=1}^{n-1} \underbrace{\int_{b_k}^{b_{k+1}} f(x) dx}_{=: F_k} = \sum_{k=1}^n F_k.$$

Außerdem ist

$$|F_k| \leq \int_{b_k}^{b_{k+1}} |f(x)| dx \leq \int_{b_k}^{b_{k+1}} g(x) dx =: G_k.$$

Da  $g$  auf  $[a, \infty)$  uneigentlich integrierbar ist, konvergiert die Reihe

$$\sum_{k=1}^{n-1} G_k = \sum_{k=1}^{n-1} \int_{b_k}^{b_{k+1}} g(x) dx = \int_a^{b_n} g(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_a^{\infty} g(x) dx \in \mathbb{R}.$$

Die Existenz von  $\int_a^{\infty} f(x) dx$  folgt nun aus dem Majorantenkriterium für Reihen und aus der Beliebigkeit der Folge  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

### Aufgabe A42

Untersuchen Sie, für welche reellen Konstanten  $\alpha, \beta$  das folgende uneigentliche Integral konvergiert:

$$\int_1^{\infty} \frac{x^\alpha}{1+x^\beta} dx.$$

### Lösung

Da der Integrand stetig auf  $[1, \infty)$  ist, ist das Integral uneigentlich bezüglich der oberen Grenze.

Wir betrachten zunächst:  $\boxed{\beta > 0}$ . Wegen  $x^\beta \geq 1$  für  $x \geq 1$  gilt:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{x^\alpha}{x^\beta} \leq \frac{x^\alpha}{1+x^\beta} \leq \frac{x^\alpha}{x^\beta}$$

und somit

$$\frac{1}{2} \cdot x^{\alpha-\beta} \leq \frac{x^\alpha}{1+x^\beta} \leq x^{\alpha-\beta}$$

Also ist  $x^{\alpha-\beta}$  eine integrierbare Majorante, falls

$$\alpha - \beta < -1 \quad \Leftrightarrow \quad \alpha < \beta - 1,$$

und eine divergente Minorante, falls

$$\alpha - \beta \geq -1 \quad \Leftrightarrow \quad \alpha \geq \beta - 1$$

Somit folgt:

$$\int_1^{\infty} \frac{x^\alpha}{1+x^\beta} dx \begin{cases} < \infty & \text{falls } \alpha < \beta - 1, \beta > 0 \\ = \infty & \text{falls } \alpha \geq \beta - 1, \beta > 0 \end{cases}$$

Nun zum Fall  $\boxed{\beta < 0}$ : Hier gilt:

$$\frac{x^\alpha}{1+x^\beta} = \frac{x^{-\beta}}{x^{-\beta}} \cdot \frac{x^\alpha}{1+x^\beta} = \frac{x^{\alpha-\beta}}{1+x^{-\beta}}$$

Da  $(-\beta) > 0$  folgt wie oben (mit  $\alpha - \beta = \tilde{\alpha}$ ):

$$\int_1^{\infty} \frac{x^\alpha}{1+x^\beta} dx \begin{cases} < \infty & \text{falls } \alpha < -1, \beta < 0 \\ = \infty & \text{falls } \alpha \geq -1, \beta < 0 \end{cases}.$$

**Teil B****Aufgabe B37**

[9 Punkte]

Es sei  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definiert durch

$$f(x) := \int_0^x \arctan(\sin(t)) \, dt.$$

Beweisen Sie mit Hilfe der Taylor'schen Formel, dass

$$-\frac{1}{2}x^3 \leq f(x) - \frac{1}{2}x^2 \leq 0 \quad \text{für } x \in (0, \pi).$$

**Lösung**

Idee: Entwickle  $f$  in eine Taylorreihe um  $x_0 = 0$ .

Bestimme dazu die ersten 3 Ableitungen von  $f$ . Es gilt:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \arctan(\sin(x)) \\ f''(x) &= \frac{1}{1+\sin^2(x)} \cdot \cos(x) \\ f'''(x) &= \frac{-\sin(x)(1+\sin^2(x)) - \cos(x) \cdot 2\sin(x)\cos(x)}{(1+\sin^2(x))^2} \\ &= -\frac{\sin(x)}{1+\sin^2(x)} - \frac{2\cos^2(x)\sin(x)}{(1+\sin^2(x))^2} \end{aligned}$$

Damit ist die Taylorentwicklung von  $f$  um  $x = 0$  wie folgt:

$$f(x) = f(0) + f'(0) \cdot (x - 0) + \frac{f''(0)}{2!}(x - 0)^2 + \frac{f'''(\xi)}{3!} \cdot (x - 0)^3$$

wobei  $\xi \in (0, x)$  ist. Also gilt:

$$f(x) = 0 + 0 \cdot x + \frac{1}{2} \cdot x^2 + \frac{f'''(\xi)}{6} \cdot x^3, \quad \text{also} \quad f(x) - \frac{1}{2}x^2 = \frac{f'''(\xi)}{6} \cdot x^3$$

Schätze nun die dritte Ableitung von  $f$  ab. Für  $\xi \in (0, \pi)$  gilt:

- $\sin(\xi) > 0$ ,  $\cos^2(\xi) \geq 0$ , also folgt:

$$f'''(\xi) = -\frac{\sin(\xi)}{1+\sin^2(\xi)} - \frac{2\cos^2(\xi)\sin(\xi)}{(1+\sin^2(\xi))^2} \leq 0$$

- $0 < \sin(\xi) \leq 1$ ,  $\cos^2(\xi) \leq 1$ , also folgt:

$$f'''(\xi) \geq \frac{-1}{1} - \frac{2 \cdot 1 \cdot 1}{1} = -3$$

Also gilt insgesamt:

$$-3 \leq f'''(\xi) \leq 0$$

Damit gilt für  $x \in (0, \pi)$ :

$$\begin{aligned} \frac{-3}{6}x^3 &\leq f(x) - \frac{1}{2}x^2 \leq \frac{0}{6}x^3 \\ \Leftrightarrow \quad -\frac{1}{2}x^3 &\leq f(x) - \frac{1}{2}x^2 \leq 0 \end{aligned}$$

Dies ist gerade die Behauptung.

**Aufgabe B38**

[9 Punkte]

Man bestimme das Taylorpolynom  $n$ -ten Grades  $T_n(x; x_0)$  um  $x_0 = 0$  für  $f(x) := \sqrt{1+x}$  und beweise mit Hilfe des Restgliedes in Integralform, dass für alle  $x \in (-1, 1)$  gilt

$$T_n(x; 0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x).$$

**Lösung**

Bestimme exemplarisch die ersten 3 Ableitungen:

$$f'(x) = \frac{1}{2}(1+x)^{\frac{1}{2}-1}, \quad f''(x) = \frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(1+x)^{\frac{1}{2}-2} \quad \text{und} \quad f'''(x) = \frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(2-\frac{1}{2})(1+x)^{\frac{1}{2}-3}$$

Per Induktion folgt, dass  $f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} \frac{1}{2} \prod_{i=1}^{n-1} \left(i - \frac{1}{2}\right) (1+x)^{\frac{1}{2}-n}$  für  $n \geq 2$ .

Dann lautet das Taylorpolynom

$$T_n(x; 0) = f(0) + f'(0)x + \sum_{k=2}^n \left( \frac{1}{k!} (-1)^{k-1} \frac{1}{2} \prod_{i=1}^{k-1} \left(i - \frac{1}{2}\right) x^k \right) = 1 + \frac{1}{2}x + \sum_{k=2}^n \left( \frac{1}{k!} (-1)^{k-1} \frac{1}{2} \prod_{i=1}^{k-1} \left(i - \frac{1}{2}\right) x^k \right)$$

Da  $f$   $n+1$ -mal differenzierbar ist, folgt mit Satz 9.46

$$\begin{aligned} R_n(x; 0) &= \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt \\ &= \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n (-1)^n \frac{1}{2} \prod_{i=1}^n \left(i - \frac{1}{2}\right) (1+t)^{\frac{1}{2}-(n+1)} dt \\ &= (-1)^n \frac{1}{n!} \frac{1}{2} \prod_{i=1}^n \left(i - \frac{1}{2}\right) \int_0^x (1+t)^{-\frac{1}{2}} \left(\frac{x-t}{1+t}\right)^n dt. \end{aligned}$$

Setzt man  $g(t) := \frac{x-t}{1+t}$ , dann gilt  $g(0) = x$ ,  $g(x) = 0$ ,

$$g'(t) = \frac{-(1+t) - (x-t)}{(1+t)^2} = -\frac{1+x}{(1+t)^2} < 0, \text{ für } t \in [0, x]$$

also  $|g(t)| \leq |x|$  und auch  $\left| (1+t)^{-\frac{1}{2}} \left(\frac{x-t}{1+t}\right)^n \right| \leq (1+t)^{-\frac{1}{2}} |x|^n$ .

Somit folgt wegen  $\frac{d}{dt} 2\sqrt{1+t} = (1+t)^{-\frac{1}{2}}$ :

$$|R_n(x, 0)| \leq \frac{1}{n!} \frac{1}{2} \underbrace{\prod_{i=1}^n \left(i - \frac{1}{2}\right)}_{< n!} |x|^n \left| \int_0^x (1+t)^{-\frac{1}{2}} dt \right| < \frac{1}{2} |x|^n |2\sqrt{1+x} - 2| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

was zu beweisen war.

**Aufgabe B39**

[7 Punkte]

Zeigen Sie, dass die beiden folgenden Integrale

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{(x-1)^3} dx, \quad \int_1^5 \frac{1}{(x-1)^3} dx,$$

divergieren, aber der folgende Grenzwert existiert:

$$\lim_{\varepsilon \searrow 0} \left( \int_{-1}^{1-\varepsilon} \frac{1}{(x-1)^3} dx + \int_{1+\varepsilon}^5 \frac{1}{(x-1)^3} dx \right).$$

**Lösung**

Es gilt:

$$\int \frac{1}{(x-1)^3} dx = \int (x-1)^{-3} dx = -\frac{1}{2} \cdot (x-1)^{-2}$$

also:

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{(x-1)^3} dx = \lim_{a \nearrow 1} \int_{-1}^a \frac{1}{(x-1)^3} dx = \lim_{a \nearrow 1} -\frac{1}{2}(x-1)^{-2} \Big|_{-1}^a = \lim_{a \nearrow 1} \left( -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(a-1)^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^2} \right)$$

wegen  $\frac{1}{(a-1)^2} \xrightarrow{a \rightarrow 1} \infty$  ist  $\int_{-1}^1 \frac{1}{(x-1)^3} dx$  divergent.

Weiter gilt:

$$\int_1^5 \frac{1}{(x-1)^3} dx = \lim_{a \searrow 1} \int_a^5 \frac{1}{(x-1)^3} dx = \lim_{a \searrow 1} -\frac{1}{2}(x-1)^{-2} \Big|_a^5 = \lim_{a \searrow 1} -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(a-1)^2}$$

wegen  $\frac{1}{(a-1)^2} \xrightarrow{a \rightarrow 1} \infty$  ist  $\int_1^5 \frac{1}{(x-1)^3} dx$  divergent.

Aber es gilt:

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \searrow 0} \left[ \int_{-1}^{1-\varepsilon} \frac{1}{(x-1)^3} dx + \int_{1+\varepsilon}^5 \frac{1}{(x-1)^3} dx \right] \\ &= \lim_{\varepsilon \searrow 0} \left[ \left( -\frac{1}{2} \right) \cdot \frac{1}{(x-1)^2} \Big|_{-1}^{1-\varepsilon} + \left( -\frac{1}{2} \right) \cdot \frac{1}{(x-1)^2} \Big|_{1+\varepsilon}^5 \right] \\ &= \lim_{\varepsilon \searrow 0} \left[ -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(1-\varepsilon-1)^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(1+\varepsilon-1)^2} \right] \\ &= \lim_{\varepsilon \searrow 0} \left[ \frac{3}{32} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\varepsilon^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\varepsilon^2} \right] \\ &= \lim_{\varepsilon \searrow 0} \frac{3}{32} = \frac{3}{32} \end{aligned}$$

**Aufgabe B40**

[4+5=9 Punkte]

- (i) Verwenden Sie Satz 9.35, um den  $p$ -Test in Beispiel 7.17 zu erhalten.
- (ii) Imitieren Sie des Weiteren die Methodik im Beweis von Satz 9.35 (Skript), um zu zeigen, dass für alle  $N \in \mathbb{N}$  gilt:

$$\left| \log(N) - \sum_{k=1}^N \frac{1}{k} \right| \leq 1.$$

**Lösung**

- (i) Wir betrachten die Funktionenschar  $f_p : [1, \infty] \rightarrow [0, 1] : x \mapsto x^{-p}$  für  $p \in (0, \infty)$ . Offensichtlich ist  $f_p$  monoton fallend.

Nach Satz 9.35 gilt nun, dass  $\sum_{n=2}^{\infty} f_p(n) \leq \int_1^{\infty} f_p(x) dx$ . Nun gilt:

$$\int_1^{\infty} f_p(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \begin{cases} \frac{b^{-p+1}-1}{-p+1} & \text{falls } p \neq 1 \\ \log(b) & \text{falls } p = 1 \end{cases} = \begin{cases} \frac{-1}{-p+1} & \text{falls } p \neq 1 \\ \infty & \text{falls } p \leq 1 \end{cases}$$

Somit konvergiert  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p}$  genau dann, wenn  $p > 1$  ist. Somit konvergiert aber auch  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p} + 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$  genau dann. Dies ist die Aussage von 7.17.

- (ii) Sei  $f = f_1$ , dann gilt: Für  $n \in \mathbb{N}$  und einen beliebigen Zwischenpunkt  $x \in [n, n+1]$  gilt nach Monotonie von  $f$  die Ungleichung  $f(n+1) \leq f(x) \leq f(n)$  und somit

$$f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq f(n),$$

Nach Summation von 1 bis  $n$  erhält man mit Intervalladditivität des Riemann-Integrals

$$\sum_{\ell=2}^{n+1} f(\ell) = \sum_{k=1}^n f(k+1) \leq \int_1^{n+1} f(x) dx \leq \sum_{k=1}^n f(k).$$

Somit gilt mit  $N := n+1$

$$\sum_{k=2}^N \frac{1}{k} \leq \int_1^N \frac{1}{x} dx = \log(N) \leq \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{k}$$

und weiter:

$$\sum_{k=1}^N \frac{1}{k} \leq \log(N) + 1 \leq \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{k} + 1 \leq \sum_{k=1}^N \frac{1}{k} + 1$$

also

$$-1 \leq \log(N) - \sum_{k=1}^N \frac{1}{k} \leq 0$$

Also

$$\left| \log(N) - \sum_{k=1}^N \frac{1}{k} \right| \leq 1$$

### Aufgabe B41

[5 Punkte]

Untersuchen Sie, für welche  $\alpha \in \mathbb{R}$  das folgende Integral konvergiert:

$$\int_2^\infty \frac{1}{x(\log(x))^\alpha} dx$$

### Lösung

Das Integral  $\int_2^\infty \frac{1}{x[\log(x)]^\alpha} dx$  ist uneigentlich bezüglich oberer Grenze, da der Integrand stetig ist für  $x \geq 2$ .

Betrachte also:

$$\begin{aligned} \int_2^R \frac{1}{x[\log(x)]^\alpha} dx &\stackrel{\substack{\log(x)=t \\ \frac{1}{x} dx = dt}}{=} \int_{\log(2)}^{\log(R)} \frac{1}{t^\alpha} dt \\ &= \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha} \cdot t^{1-\alpha} \Big|_{\log(2)}^{\log(R)} & \alpha \neq 1 \\ \log(t) \Big|_{\log(2)}^{\log(R)} & \alpha = 1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha} [(\log(R))^{1-\alpha} - (\log(2))^{1-\alpha}] & \alpha \neq 1 \\ \log(\log(R)) - \log(\log(2)) & \alpha = 1 \end{cases} \\ &\xrightarrow{R \rightarrow \infty} \begin{cases} \frac{1}{\alpha-1} (\log(2))^{1-\alpha} & 1-\alpha < 0 \Leftrightarrow \alpha > 1 \\ \infty & \alpha \leq 1 \end{cases} \end{aligned}$$



Also:

$$\int_0^\infty \frac{1}{x[\log(x)]^\alpha} dx \quad \text{ist} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{konvergent für } \alpha > 1 \\ \text{divergent für } \alpha \leq 1 \end{array} \right\}.$$

**Aufgabe B42**

[10\* Punkte]

*Bonusaufgabe.* Sei  $p \in \mathbb{R}$ ,  $p > 0$ . Für welche  $p$  existiert das uneigentliche Integral

$$\int_0^\infty x \sin(x^p) \, dx?$$

*Hinweis: Betrachten Sie den Grenzwert*

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^{b_k} x \sin(x^p) \, dx$$

für eine geeignete Folge  $(b_k)_{k \in \mathbb{N}}$  und interpretieren Sie das Integral als Reihe. Untersuchen Sie die Reihe auf Konvergenz (Leibniz-Kriterium).

**Lösung**

Aufgabe B42\*  $\int_0^{\infty} x \sin(x^p) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b x \sin(x^p) dx$

Subst.  $\varphi(y) = y^{1/p}$   $\varphi: [0, b^p] \rightarrow [0, b]$  stetig d.b. auf  $(0, b^p)$   
 $\varphi'(y) = \frac{1}{p} y^{\frac{1}{p}-1}$

$$\int_0^b x \sin(x^p) dx = \int_0^{b^p} y^{1/p} \sin(y) \cdot \frac{1}{p} y^{\frac{1}{p}-1} dy$$

$$= \int_0^{b^p} \frac{1}{p} y^{\frac{2}{p}-1} \sin(y) dy$$

Also existiert  $\int_0^{\infty} x \sin(x^p) dx$  g.d.w.  $\int_0^{\infty} x^{\frac{2}{p}-1} \sin(x) dx$  ex.

Sei  $I_k := [k\pi, (k+1)\pi]$

Es gilt  $\sin(x) = 0 \Leftrightarrow x \in \pi\mathbb{Z}$

$$\sin(\pi \cdot 2k + \frac{\pi}{2}) = \sin(\frac{\pi}{2}) = 1 \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin(\pi(2k+1) + \frac{\pi}{2}) = \sin(\pi + \frac{\pi}{2}) = -\sin(\frac{\pi}{2}) = -1 \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

Also gilt  $\sin(x) > 0$  für  $x \in I_k$ ,  $k$  gerade  
 $\sin(x) < 0$  für  $x \in I_k$ ,  $k$  ungerade

(da  $\sin$  auf  $I_k$  keine Nullstellen hat und stetig ist).

$p \leq 2$   $\sin(0) = 0$ ,  $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$ ,  $\sin(\pi) = 0$ ,  $\sin$  stetig.

Also ex.  $(u, v) \subset (0, \pi)$  mit  $\sin(x) \geq \frac{1}{2}$  für alle  $x \in (u, v)$ .

Sei  $J_k := (u, v) + k\pi$ . Dann gilt

•)  $k$  gerade:  $\int_{I_k} \underbrace{\sin(x)}_{\geq 0} x^{\frac{2}{p}-1} dx \geq \int_{J_k} \underbrace{\sin(x)}_{\geq \frac{1}{2}} x^{\frac{2}{p}-1} dx$

$$\geq \frac{1}{2} \int_{J_k} \underbrace{x^{\frac{2}{p}-1}}_{\geq 1} dx \geq \frac{1}{2} |J_k| = \frac{1}{2} |v-u|$$

Es folgt, dass

$$\left| \int_0^{(k+1)\pi} x^{\frac{z}{p}-1} \sin(x) dx - \int_0^{k\pi} x^{\frac{z}{p}-1} \sin(x) dx \right|$$

$$= \int_{I_k} x^{\frac{z}{p}-1} \sin(x) dx \geq \frac{1}{2} |v-u|$$

Also ist  $\left( \int_0^{k\pi} x^{\frac{z}{p}-1} \sin(x) dx \right)_{k \in \mathbb{N}}$  keine Cauchy-Folge.

Also konvergiert die Folge nicht. Insbesondere konvergiert  $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b x^{\frac{z}{p}-1} \sin(x) dx$  nicht.

$p > 2$

Betrachte zunächst  $\left( \int_0^{k\pi} x^{\frac{z}{p}-1} \sin(x) dx \right)_{k \in \mathbb{N}}$   
 $=: A_k$

setze  $a_k := \int_{I_k} x^{\frac{z}{p}-1} \sin(x) dx$

Dann gilt  $a_k = (-1)^k |a_k|$ , sowie  $A_k = \sum_{m=0}^{k-1} a_m$

$$|a_k| = \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} x^{\frac{z}{p}-1} |\sin(x)| dx \leq \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} x^{\frac{z}{p}-1} dx$$

$$\leq \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} (k\pi)^{\frac{z}{p}-1} dx = \pi^{\frac{z}{p}} \cdot k^{\frac{z}{p}-1} \xrightarrow{(k \rightarrow \infty)} 0.$$

$< 0$  da  $p > 2$

Außerdem ist mit der Substitution  $\varphi(y) = y + \pi$ ,  $\varphi'(y) = 1$ :

$$\begin{aligned} |a_{k+1}| &= \int_{(k+1)\pi}^{(k+2)\pi} x^{\frac{z}{p}-1} |\sin(x)| dx = \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \underbrace{(y+\pi)^{\frac{z}{p}-1}}_{\leq y^{\frac{z}{p}-1}} \underbrace{|\sin(y+\pi)|}_{= -\sin(y)} dy \\ &\leq \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} y |\sin(y)| dy = |a_k|. \end{aligned}$$

Also ist  $|a_k|$  mon fallend.

Mit dem Leibniz-Kriterium folgt:

$$\int_0^{k\pi} x^{\frac{z}{p}-1} \sin(x) dx = \sum_{m=0}^{k-1} (-1)^m |a_m| \quad \text{konvergiert.}$$

Sei  $A := \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m |a_m|$  und sei  $\varepsilon > 0$  bel.

Dann ex.  $N \in \mathbb{N}$  s.d. für alle  $k \geq N$  gilt

$$\left| \int_0^{k\pi} x^{\frac{z}{p}-1} \sin(x) dx - A \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Sowie

$$\int_{I_k} x^{\frac{z}{p}-1} |\sin(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Sei  $b \in \mathbb{R}$ ,  $b \geq N$ . Dann existiert  $k \in \mathbb{N}$  mit

$$k\pi \leq b < (k+1)\pi.$$

$$\text{Es gilt } \left| \int_0^b \underbrace{x^{\frac{z}{p}-1} \sin(x) dx}_{=: f(x)} - A \right|$$

$$= \left| \int_0^{k\pi} f(x) dx + \int_{k\pi}^b f(x) dx - A \right|$$

$$\leq \left| \int_0^{k\pi} f(x) dx - A \right| + \left| \int_{k\pi}^b f(x) dx \right|$$

$$\leq \frac{\varepsilon}{2} + \int_{k\pi}^b x^{\frac{z}{p}-1} |\sin(x)| dx \leq \frac{\varepsilon}{2} + \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} x^{\frac{z}{p}-1} |\sin(x)| dx \leq \varepsilon.$$

$$\text{Also gilt } \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b f(x) dx = A.$$