

## Übungsblatt 02

**31.03./01.04.2025**

1. Wie lautet die Ableitung der gegebenen Funktionen nach dem genannten Parameter?

a) Ableitung von  $g(x, y) = (2x - y)^2 + \ln(x \cdot y)$  nach  $x$

b) Ableitung von  $l(u, v, w) = \ln(\sqrt{u \cdot w} \cdot e^{-v})$  nach  $u$

c) Ableitung von  $m(i, j, k) = \ln\left(\frac{j \cdot \sqrt{k}}{i}\right)$  nach  $i$

2. **(Präsentation der Lösung)** Berechnen Sie die 1. partiellen Ableitungen der folgenden Funktionen.

a)  $f(x, y) = 2x^2 - 3xy - 4y^2$

b)  $f(x, y) = \frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{x}$ ,  $x \neq 0$ ,  $y \neq 0$

c)  $f(x, y) = \sin(2x + 3y)$

3. Sind die folgenden Funktionen im Punkt  $(0, 0)$  stetig?

a)  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x \cdot y^2}{x^2 + y^4} & \text{für } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{für } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

b)  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x \cdot y^2}{x^2 + y^2} & \text{für } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{für } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

4. **(Präsentation der Lösung)** Lassen sich folgende Funktionen im Nullpunkt stetig ergänzen und, wenn ja, wie?

a)  $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 4} - 2}$

b)  $f(x, y) = \frac{x^3 + 2yx^2 + xy^2 + 2y^3}{x + 2y}$

5. **(Präsentation der Lösung)** Berechnen Sie die Gradienten der folgenden Funktionen

a)  $f(x, y) = \sin(x) \cdot \cos(y)$

b)  $g(x, y) = (x + y) \cdot e^{-x^2 - y^2}$

c)  $h(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z^2 + x \cdot z + 3z + 1$

6. **(Präsentation der Lösung)** Berechnen Sie zur Funktion  $f(x, y) = ye^{x-1}$  die Tangentialebene im Punkt  $x_0 = 1, y_0 = 3$  in kartesischer Form, also

$$T(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + f_y(x_0, y_0) \cdot (y - y_0)$$

und vektorieller Form

$$T = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \vec{v}_1 + \mu \cdot \vec{v}_2$$