

Aufgabe 1. Für $p > 0$ ist die größte Nullstelle von $x^2 + 2px - 1$ gegeben durch

(3 PUNKTE)

$$f(p) = -p + \sqrt{1 + p^2}.$$

Bestimmen Sie eine *obere Schranken* für die absolute Konditionszahl von f für $p, p' \in [0, 10]$

Aufgabe 2. Berechnen Sie die LU-Zerlegung für die Matrix

(7 PUNKTE)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -3 \\ -2 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Lösen Sie anschließend $Ax = b$ für $b = (6, 12, 0, 7)^T$ ohne die Matrix erneut zu zerlegen.

Aufgabe 3. Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ mit

(5+1 PUNKTE)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

- Berechnen Sie (mit dem Taschenrechner, auf 6 führende Stellen genau) die Iterierten $x_1, \dots, x_5$ für das Jakobi- sowie das Gauß-Seidel-Verfahren zum Startwert $x_0 = (0, 0)^T$.
- Bestimmen Sie die Iterationsmatrizen B_J und B_{GS} der beiden Verfahren sowie deren Spektralradien.

Aufgabe 4. Betrachten Sie die Funktion

(1+3+4 PUNKTE)

$$f(x) = e^{-x} - \sin(x).$$

- Zeigen Sie, dass f in $[0, 2]$ mindestens eine Nullstelle besitzt.
- Ermitteln Sie mit dem Bisektionsverfahren ein Teilintervall von $[0, 2]$ mit Länge $\frac{1}{4}$, das eine Nullstelle von f enthält.
- Verbessern Sie das Resultat aus (b) mit dem Newton-Verfahren. Verwenden Sie als Startwert die Intervallmitte des *letzten* Intervalls aus (b). Iterieren Sie so lange, bis sich die ersten 6 führenden Ziffern nicht mehr verändern.

Aufgabe 5. Bestimmen Sie für die Punkte (x_i, y_i) , $i = 0, \dots, 3$,

(4+4 PUNKTE)

i	0	1	2	3
x_i	0	2	3	5
y_i	1	1	4	4

- das Interpolationspolynom in Newton-Darstellung. Benutzen Sie dividierte Differenzen

$$d_{ii} = y_i \quad i = 0, 1, \dots \quad d_{nm} = \frac{d_{n,m+1} - d_{n-1,m}}{x_n - x_m} \quad n > m.$$

- das lineare Ausgleichspolynom $p(x) = a + bx$.