Pôle APICULTURE
GDS Réunion

PROTOCOLES DES TRAITEMENTS VARROAS AUTORISÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME SANITAIRE D'ÉLEVAGE

Département de la Réunion — Cofinancé par l'Union européenne — GDS Réunion



LEGENDE / TRAITEMENTS DISPONIBLES : Conventionnel longue durée : Apivar®, Apistan® — Naturel sans encagement : Apilife Var®, Formic Pro®, Varromed®, Calistrip Biox® — Naturel avec encagement : Oxybee®, Calistrip Biox®

LES RÉGLES DE BASE :

- Ne pas traiter en présence de hausse
- Ne pas extraire de miel issu du corp de ruche
- Traiter toutes les ruches du rucher en même temps

LUTTER CONTRE L'APPARITION DE VARROAS RÉSISTANTS :

- Respecter les doses et les durées d'application
- Ne pas appliquer 2 traitements longue durée par an
- A l'exception des traitements flash, alterner les molécules entre les miellées et d'une année sur l'autre
- Effectuer des comptages régulièrement

QUAND FAIRE DES COMPTAGES VARROAS ?

- **En sortie de miellée…** pour choisir le traitement adapté et déterminer sa période d'application
  - Si VP100 ≤ 3, Renouveler le comptage dans un mois
  - Si 3 ≤ VP100 ≤ 10, Respecter le calendrier de traitement prévu
  - Si VP100 > 10, Appliquer dès maintenant le traitement prévu
  - Si VP100 > 15, Retirer le couvain fermé en le combinant à l'application d'un traitement flash et renouveler le comptage pour évaluer la nécessité d'un traitement de rattrapage
- **En fin de traitement…** pour vérifier l'efficacité du traitement
  - Si VP100 ≤ 3, le traitement a été efficace.
  - Si VP100 > 3, envisager un traitement de rattrapage.

DES VARROAS RÉSIDUELS ? QUESAKO ?



Les varroas résiduels sont les varroas qui survivre après l'application du traitement :

Leur nombre dépend du niveau d'infestation initial et de l'efficacité du traitement. Plus le nombre de varroas résiduels et les réinfestations seront importants, plus l'augmentation de la population sera rapide, d'où l'intérêt de faire des comptages et de traiter régulièrement.

DES EFFETS SECONDAIRES LIÉS À LA TEMPÉRATURE ?

En cas de températures élevées, l'acide formique et le thymol vont se vaporiser plus rapidement et conduire à une concentration plus élevée dans la colonie à l'origine d'effets secondaires exacerbés.

Sur les conseils d'un vétérinaire, les modalités d'application de l'Apilifevar et du Formic pro peuvent être adaptées aux conditions tropicales.

COMMENT CHOISIR SON PROTOCOLE ?

PROTOCOLE CLASSIQUE

- Facilité d'application des traitements longs
- Haut niveau de protection des colonies en période estivale
- Permet selon les secteurs de viser les miellées intermédiaires d'hiver
- Effets secondaires de l'Apilifevar exacerbés l'hiver

PROTOCOLE INVERSÉ

- Facilité d'application des traitements longs
- Haut niveau de protection des colonies en période hivernale
- Bon redémarrage des colonies à la fin de l'hiver
- Permet selon les secteurs de viser les miellées intermédiaires d'été

PROTOCOLE BIO SANS ENCAGEMENT

- Traitements de courte durée permettant une plus grande flexibilité
- Moindre technicité que pour les protocoles avec encagements

PROTOCOLE BIO 1 À 3 ENCAGEMENTS

- Traitements de courte durée permettant une plus grande flexibilité
- Technique pouvant être couplée au remérage
- L'encagement peut contribuer à améliorer le remplissage des hausses en fin de miellée

PROTOCOLE FORÊT

- Parcours de transhumance plus complet et productivité augmentée

GDS Réunion / 1 rue du Père Hauck, PK23 / Bâtiment E.F.G / 97418 La plaine des Cafres
T : 02 62 27 54 07 / M : courrier@gds974.re / www.gds974.re

© Mai 2025 / GDS Réunion tous droits réservés / Service communication / Crédits : Antoine FRANCK Cirad / Adobe stock / Frédéric BONNIER GDS