EOB 轨道动力学模拟实现

——中国科学院上海天文台实习记录以及毕设进展记录

HUST

HW Zhong PHYS.1701.

2020年8月7日

目录

Ι	上海	天文台实习	3
1	实习的	前准备	5
	1.1	June 22^{nd}	5
	1.2	June 23^{rd}	5
	1.3	June $24th$	5
	1.4	June 25^{th}	6
		1.4.1 线性引力论全部推导过程	6
	1.5	June 28^{th}	9
2	实习。	†	L 1
	2.1	June 29^{th}	
	:	2.1.1 第一篇文献	
		2.1.2 第二篇文献	
		June 30^{th}	
	2.3	July 1^{st}	17
	:	2.3.1 第二篇文章	17
	:	2.3.2 第一篇文章	18
	2.4	July 2^{nd}	18
	2.5	July 3^{rd}	18
	2.6	July 4^{th}	20
	2.7	July 5^{th}	21
	2.8	$\mathrm{July}\ 6^{th}$	22
	2.9	July 7^{th}	22
	2.10	July 8^{th}	24
	2.11	July 9^{th}	24
	2.12	July 10^{th}	27
		$_{ m July}^{ m v}$ 11 th	31
		$\overset{\circ}{ ext{July }}12^{th}$	
		July 13^{th}	
		v	36

	2.17 July 15^{th}	41
	2.18 July 16^{th}	46
	2.19 July 17^{th}	47
	2.20 July 19^{th}	49
	2.21 July 20^{th}	50
	2.22 July 21^{th}	50
	2.23 July 23^{th}	51
	2.24 July 24^{th}	
	2.25 July 25^{th}	53
	2.26 July 26^{th}	53
	2.27 July 27^{th}	55
	2.28 July 28^{th}	58
	2.29 July 29^{th}	64
	2.30 July 30^{th}	
	2.31 July 31^{th}	
	2.32 Aug 1^{st}	
	2.33 Aug 2^{st}	
	2.34 Aug 3^{st}	74
	2.35 Aug 4^{st}	
	2.36 Aug 5^{st}	75
3	黑洞物理学习	76
	3.1 The Schwarzschiled black hole	
	3.1.1 Spacetime extensions	
	毕设推进	78
Π	毕设推进	7 9

Part I 上海天文台实习

论文阅读准则

- 1. 作者想要解决什么问题?
- 2. 作者为什么研究这个课题?
- 3. 目前这个课题 (小领域) 的研究进行到了哪一阶段?
- 4. 作者使用理论基于哪些假设?
- 5. 作者通过什么理论/模型来解决这个问题?
- 6. 作者给出的答案是什么?
- 7. 这篇文章存在哪些缺陷?

Chapter 1

实习前准备

1.1 June 22^{nd}

复习梁先生书本第 4 章。完成了对 Lee 导数的进一步理解以及计算练习。

1.2 June 23^{rd}

复习梁先生书本第4章剩余内容以及第5章。完成了对微分形式场以及对偶微分形式场的深入学习。

1.3 June 24th

复习梁先生书本第6章,第七章内容。

开始阅读文献:遇到了几个生词希望在接下来几天解决掉。首先我们要明确我们要面对是 *Kerr-Newman* 度规,我们要处理的是用 *Kerr-Newman* 度规描述的带电而且有自转的黑洞。目前碰到的概念有

- Teukolsky's perturbation formalism
- 黑洞的无量纲自旋 χ
- dominant (ℓ, m) gravitational-wave mode
- matched-filtering technique: 这是一个从充满噪音的信号中提取引力波信号的手段。
- PN,EOB 提出的目的:在互相绕转 (*inspiring*) 的过程中,通常的近似还可以,所以可以用 PN 来做,但是之后的剧烈的合并过程没法做了,必须数值求解。所以提出了 EOB 来描述 "The last stages of inspiral, plunge, merger, and ringdown." 在文中提到了非常重要的一点,核心思想是 These result from EOB, at the interface between numerical and analytical relativity. 在参考文献 9,10 中第一次提出了 EOB 的概念,之后在 11-13 中进行了改进。文章中采用的哈密顿量参考 34,35;引力波能流 38,39。
- $\chi = 0.44$?

1.4 June 25^{th}

1.4.1 线性引力论全部推导过程

我们考虑在闵氏度规基础上存在一个微扰:

$$g_{ab} = \eta_{ab} + \gamma_{ab}$$

$$q^{ab} = \eta^{ab} - \gamma^{ab}$$

所谓微扰的意思是微扰度规在所有分量在任何一个坐标系中的坐标分量都是一阶小量。接下来计算克氏符:

$$\Gamma_{ab}^{c} = \frac{1}{2}g^{cd} \left(\partial_{a}g_{bd} + \partial_{b}g_{ad} - \partial_{d}g_{ab} \right) = \frac{1}{2}\eta^{cd} \left(\partial_{a}\gamma_{bd} + \partial_{b}\gamma_{ad} - \partial_{d}\gamma_{ab} \right)$$

接下来计算黎曼曲率张量:

$$R_{abc}^d = \partial_b \Gamma_{ac}^d - \partial_a \Gamma_{bc}^d + \underbrace{\left\{ \Gamma_{be}^d \Gamma_{ca}^c - \Gamma_{cb}^e \Gamma_{ae}^d \right\}}_{\text{$=$} \text{\square} \text{$\upsigma heights}}$$

将我们计算出来的克氏符代入:

$$\Gamma_{ac}^{d} = \frac{1}{2} \eta^{de} \Big(\partial_a \gamma_{ce} + \partial_c \gamma_{ae} - \partial_e \gamma_{ac} \Big)$$
$$\Gamma_{bc}^{d} = \frac{1}{2} \eta^{ed} \Big(\partial_b \gamma_{ce} + \partial_c \gamma_{be} - \partial_e \gamma_{bc} \Big)$$

代入曲率张量表达式中可以得到:

$$R_{abcd}^{(1)} = \partial_b \partial_{[c} \gamma_{d]a} + \partial_a \partial_{[d} \gamma_{c]b} = \partial_b \partial_{[c} \gamma_{d]a} - \partial_a \partial_{[c} \gamma_{d]b}$$

将 $a \leftrightarrow b, c \leftrightarrow d$ 可以得到:

$$R_{bdac}^{(1)} = \partial_d \partial_{[a} \gamma_{c]b} - \partial_b \partial_{[a} \gamma_{c]d}$$

由于曲率张量前后两对指标是对称的因此有:

$$R_{acbd}^{(1)} = \partial_d \partial_{[a} \gamma_{c]b} - \partial_b \partial_{[a} \gamma_{c]d}$$

得到这个重要的式子之后用 η^{cd} 升指标并且缩并:

$$R_{ab}^{(1)} = \partial^c \partial_{(a} \gamma_{b)c} - \frac{1}{2} \partial^c \partial_c \gamma_{ab} - \frac{1}{2} \partial_a \partial_b \gamma$$

$$R^{(1)} = \partial^c \partial^b \gamma_{bc} - \partial^c \partial_c \gamma$$

于是我们就得到了线性化的爱因斯坦方程:

$$\partial^c\partial_{(a}\gamma_{b)c}-\frac{1}{2}\partial^c\partial_c\gamma_{ab}-\frac{1}{2}\partial_a\partial_b\gamma-\frac{1}{2}\eta_{ab}\Big(\partial^c\partial^b\gamma_{bc}-\partial^c\partial_c\gamma\Big)=8\pi T_{ab}$$

下一步令

$$\boxed{\bar{\gamma_{ab}} \equiv \gamma_{ab} - \frac{1}{2}\eta_{ab}\gamma}$$

经过痛苦的计算我们会发现恰好有:

$$\partial^c \partial_{(a} \bar{\gamma}_{b)c} - \frac{1}{2} \partial^c \partial_c \bar{\gamma}_{ab} - \frac{1}{2} \eta_{ab} \partial^c \partial^b \bar{\gamma}_{bc} = 8\pi T_{ab}$$

我们令

$$\tilde{\gamma}_{ab} = \gamma_{ab} + \partial_a \xi_b + \partial_b \xi_a$$

这个变换实际上代表存在一个满足线性爱因斯坦方程的等价类! 我们可以计算得到:

$$\Gamma_{bc}^{\prime d} = \Gamma_{bc}^d + 2\partial_b\partial_c\xi^d$$

其中第二部分的存在并不会导致曲率张量的变化,因此也不会导致里奇张量,曲率标量的变化,因此说如果 γ_{ab} 是爱因斯坦方程的解,那么 $\tilde{\gamma}_{ab}$ 也一定是。更进一步我们可以证明的是**一定存在** $\tilde{\gamma}_{ab}$ **使得**

$$\partial^b \tilde{\gamma}_{ab} = 0$$

这就导致线性爱因斯坦方程进一步化简为:

$$\partial^c \partial_c \bar{\gamma}_{ab} = -16\pi T_{ab}$$

下面尝试导出 **TT** gauge。现在采用我找到的讲义里的记号,首先说清楚无穷小坐标变换的来历。我们考虑我们已经找到了一个 *near-cartesian* 坐标系,再做一个无穷小坐标变换:

$$x'^{\alpha} = x^{\alpha} + \xi^{\alpha} \qquad |\xi|^{\alpha} \ll 1$$

可以计算得到:

$$\frac{\partial x^{\beta}}{\partial x'^{\alpha}} = \delta^{\beta}_{\alpha} - \partial_{\alpha} \xi^{\beta}$$

于是就可以计算度规:

$$g'_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} - \partial_{\mu}\xi_{\nu} - \partial_{\nu}\xi_{\mu} + h_{\mu\nu}$$

也就得到了我们之前得到的一个变换:

$$h'_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \partial_{\mu}\xi_{\nu} - \partial_{\nu}\xi_{\mu}$$

我们再考虑 Lorenz gauge

$$0 = \partial_{\mu}H^{\mu\nu} = \partial_{\mu}(h^{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta^{\mu\nu}h)$$

我们可以计算变换后的关系,为此需要先计算一下变换后的迹:

$$h' = \eta^{\mu\nu} h'_{\mu\nu} = h - 2\eta^{\mu\nu} \partial_{\nu} \xi_{\mu}$$

$$H'_{\mu\nu} = H_{\mu\nu} - \partial_{\mu} \xi_{\nu} - \partial_{\nu} \xi_{\mu} + \eta_{\mu\nu} \eta^{\alpha\beta} \partial_{\alpha} \xi_{\beta}$$

我们希望找到一个 ξ^{α} 对任意的 $H^{\mu\nu}$ 都满足

$$\partial_{\mu}H'^{\mu\nu}=0$$

$$0=\partial_{\mu}H'^{\mu\nu}=\partial_{\mu}H^{\mu\nu}-\partial_{\mu}\partial^{\mu}\xi^{\nu}$$

只需要保证

$$\Box^2 \xi^{\nu} = \partial_{\mu} H^{\mu\nu}$$

就可以保证洛伦兹规范在变换后的坐标系中仍然满足。这本质上是 4 个微分方程,数学上可以证明一定有解。不过这只是一组通解,即使给定一个 $H^{\mu\nu}$ 和一个坐标系满足洛伦兹规范,我们仍然有极大的规范自由度,可以选择满足

$$\Box^2 \xi^{\nu} = 0$$

的无穷小坐标变换,变换后仍然满足洛伦兹规范。

现在我们面对如下方程:

$$\Box^{2}H^{\mu\nu} = -16\pi G T^{\mu\nu} \quad H^{\mu\nu} \equiv h^{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta^{\mu\nu}h \quad g_{\mu\nu} \equiv \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu} \quad |h_{\mu\nu}| \ll 1$$

并且满足洛伦兹规范:

$$\partial_{\mu}H^{\mu\nu} = 0$$

但是我们仍然有规范自由度:

$$x'^{\alpha} = x^{\alpha} + \xi^{\alpha}$$
 $|\xi^{\alpha}| \ll 1$ $\Box^2 \xi^{\alpha} = 0$

之前我们计算过的

$$H'_{\mu\nu} = H_{\mu\nu} - \partial_{\mu}\xi_{\nu} - \partial_{\nu}\xi_{\mu} + \eta_{\mu\nu}\eta^{\alpha\beta}\partial_{\alpha}\xi_{\beta}$$

稍微变换一下:

$$H^{\prime\mu\nu} = H^{\mu\nu} - \partial^{\mu}\xi^{\nu} - \partial^{\nu}\xi^{\mu} + \eta^{\mu\nu}\partial_{\alpha}\xi^{\alpha}$$

如果在真空中,那很幸福,直接能动张量为0。我们可以得到:

$$\Box^2 H^{\mu\nu} = 0 \Rightarrow H^{\mu\nu} = A^{\mu\nu} \cos k_{\sigma} k^{\sigma} = A^{\mu\nu} \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)$$

其中 A 是一个常矩阵, k_σ 是常协变矢量。我们把这个方程代入爱因斯坦方程和洛伦兹规范以及观察对称性有:

$$\underbrace{k^{\alpha}k_{\alpha}=0}_{\text{Einstein equation}} \quad \underbrace{k_{\mu}A^{\mu\nu}=0}_{\text{Lorenz gauge}} \quad \underbrace{A^{\mu\nu}=A^{\nu\mu}}_{\text{Symmetry}}$$

第一个式子告诉我们:

$$\omega = k \Rightarrow v = \frac{\omega}{k} = 1 = c!!!$$

问题来了,度规张量出现了对闵氏度规的偏离可能是真正的引力波,但是也可能只是因为我们选取的不是 Cartesian 坐标系,比如考虑球坐标系下的度规张量,如何判断到底是真的物理还是坐标系的欺骗呢?我 们尝试尽可能地找出 A 这个矩阵的非零量,如果真的找不到办法消除了,那就是真的物理。当然了,度规张量可能会骗我们,可是曲率张量是判断时空到底是否弯曲的唯一标准!我们就去计算一个度规张量!我们只需要计算 21 个独立的分量,但是由于循环恒等式的存在我们只需要计算 20 个! 为了方便,我们考虑

$$k_t = -\omega, k_x = 0, k_y = 0, k_z = \omega$$

可以得到:

$$A^{tt} = A^{zt} = A^{tz}$$

$$A^{tx} = A^{zx} = A^{xt} = A^{xz}$$

$$A^{ty} = A^{zy} = A^{yt} = A^{yz}$$

$$A^{tz} = A^{zz}$$

以及我们可以得到:(这里波采用正弦形式)

$$\partial_{\beta}\partial_{\mu}h_{\alpha\nu} = -\partial_{\beta}\partial_{\mu}(H_{\alpha\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\alpha\nu}H)\sin k_{\sigma}x^{\sigma}$$

当然了,我们可以知道如果 A 的指标中含有 1 个时分量那么协变逆变形式差 1 个负号,其他情况都是相等的。之后可以计算得到所有曲率张量的值:其中

$$a \equiv \frac{1}{4}\omega^2 (A_{xx} - A_{yy}) \sin k_{\sigma} x^{\sigma} \qquad b \equiv \frac{1}{2}\omega^2 A_{xy} \sin k_{\sigma} x^{\sigma}$$

我们可以做一些聪明的变换, 令 $A = A^{xx} + A^{yy}$:

$$A_{new}^{xx} = A^{xx} - \frac{1}{2}A = \frac{1}{2}(A^{xx} - A^{yy})$$
$$A_{new}^{yy} = A^{yy} - \frac{1}{2}A = -\frac{1}{2}(A^{xx} - A^{yy})$$

于是我们就得到了:

$$H_{TT}^{\mu\nu} = \left(A_{+} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + A_{\times} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) \cos k_{\sigma} x^{\sigma}$$

值得注意的一点是,在 TT gautge 下有:

$$h_{TT}^{\mu\nu} = H_{TT}^{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta^{\mu\nu}H_{TT} = H_{TT}^{\mu\nu}$$

1.5 June 28th

今天是实习前的最后一天了,我想要把论文的脉络给完全把控住,细节肯定是没法理解透彻的。大致看下来,留在我的脑子里的行文逻辑是首先介绍 **EOB** 动力学以及波形,之后给出了一些参数的取值范围,之后就是利用 **NR** 的 waveform 进行 calibrate,然后对比出结果。我觉得难点有三个,一个是在于 **EOB** 动力学,其中还涉及到大量的 **PN** 让我感觉非常困难,第二点在于那些非常不自然的数字是用什么算出来的?是用 Mathematica?最后一点在于我到目前为止没有找到哪里可以进行数值积分的微分方程,感觉非常困难。全文的脉络如下(由作者在 Introduction 最后一部分给出):

• Sec. II

介绍 spin EOB model 以及它的 dynamics, waveforms, and adjustable parameters.

• Sec. III A

介绍在低频波段通过比较 EOB & NR 的 waveform 来校准 (alignment) 的过程。并且给出了用来量化 波形差距的参数 \mathcal{M}

• Sec. III B

具体介绍 calibrate 的细节。

• Sec. IV

将 Sec. III A 的结论同参考文献 [28] 的结论相结合来构建 **prototyple EOB model**。这里利用到了插值并且外推到了更加大的参数空间,最后利用两个没有参与校准的 *nearly extremal spin* 的 **NR waveform** 来检验模型的效果。

Sec. V总结全文结论。

• Appendix

给出一些诡异的参数的显示表达。

这篇文章最大的贡献应该在于考虑了自旋。

Chapter 2

实习中

2.1 June 29^{th}

今天是实习第一天,早上听了韩老师的组会,大致了解了一下他的学生目前在从事的课题,还是非常有意思的。师姐的题目是关于轨道偏心率的问题,根据我的印象,师姐提到了产生引力波的几个天体系统有三个可能的形成机制。

- 原本就是双星系统,在互相绕转的过程中发生 inspiral-merger-ringdown 的过程,值得注意的是这个物理过程它们的绕转轨道必然是不存在偏心率 e 的。
- 动力学捕获。这也是比较有意思的一个过程,就是说非常巧合的在演化过程中发生了捕获,根据我听到的内容是对于这样的形成过程将有百分之5的概率出现偏心率。
- Kozai-Lidov 过程。这是一个三体系统,这种形成机制将会导致百分之 90(听到的内容,并不一定准确)的轨道出现偏心率。

2.1.1 第一篇文献

下面简单说一下我的任务,现在非常明确了就是将 **EOB** 轨道动力学的模型给吃透,只需要考虑动力学部分,能够将文章中的公式完全吃透并且可以做轨道的计算。我暂时不需要思考波形到底该如何产生,目前我就考虑轨道的问题。

在最开始同样需要定义一些等效单体的物理量:类似于牛顿力学中的等效单体,在这里我们用到的是这样的等效:

$$m_1, \mathbf{S_1} \longrightarrow \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}, \mathbf{S^*}$$
 $m_2, \mathbf{S_2} \longrightarrow M = m_1 + m_2, \mathbf{S}_{\text{Kerr}}$

首先明确对于等效的单体我们用位矢 \mathbf{R} , 动量 \mathbf{P} 来表征, 为了方便还定义了 reduced variables

$$m{r}\equiv rac{m{R}}{M}, m{p}\equiv rac{m{P}}{\mu}$$

重要的还有事定义了无量纲的自旋变量 χ_i ,由于我们仅仅考虑的是自旋角动量的方向要么和轨道角动量方向平行要么反平行,于是就很简单的有:

$$oldsymbol{S_i} \equiv \chi_i m_i^2 \hat{oldsymbol{L}}, oldsymbol{S}_{ ext{Kerr}} \equiv \chi_{ ext{Kerr}} M_i^2 \hat{oldsymbol{L}}$$

这些定义都是十分清晰的。最重要的东西是 EOB/real Hamiltonian:

$$H_{
m real} \equiv \mu \hat{H}_{
m real} = M \sqrt{1 + 2
u \Big(rac{H_{
m eff}}{\mu} - 1\Big)} - M$$

在下面我会着重提到哈密顿量的计算,在此之前需要明确一下自旋的计算:(这里的所有的 η 均为原文中的 ν)

$$\begin{split} \boldsymbol{S_{\mathrm{Kerr}}} &= \boldsymbol{S_1} + \boldsymbol{S_2} \\ \boldsymbol{S^*} &= \frac{m_2}{m_1} \boldsymbol{S_1} + \frac{m_1}{m_2} \boldsymbol{S_2} + \Delta_{\sigma^*}^{(1)} + \Delta_{\sigma^*}^{(2)} + \frac{d_{SO}\nu}{r^3} \left(\frac{m_2}{m_1} \boldsymbol{S_1} + \frac{m_1}{m_2} \boldsymbol{S_2} \right) \\ \boldsymbol{\Delta_{\sigma^*}^{(1)}} &= & \boldsymbol{\sigma^*} \left[\frac{1}{6} \left(-4b_0 + 7\eta \right) \frac{M}{r} + \frac{1}{3} \left(2b_0 + \eta \right) \left(Q - 1 \right) \right. \\ &\left. - \frac{1}{2} \left(4b_0 + 5\eta \right) \frac{\Delta_r}{\Sigma} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^2 \right] + \boldsymbol{\sigma} \left[-\frac{2}{3} \left(a_0 + \eta \right) \frac{M}{r} \right. \\ &\left. + \frac{1}{12} \left(8a_0 + 3\eta \right) \left(Q - 1 \right) - \left(2a_0 + 3\eta \right) \frac{\Delta_r}{\Sigma} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^2 \right] \end{split}$$

$$\begin{split} \boldsymbol{\Delta}_{\sigma^*}^{(2)} = & \boldsymbol{\sigma}^* \left[\frac{1}{36} \left(-56b_0 - 24b_2 + 353\eta - 60b_0\eta - 27\eta^2 \right) \left(\frac{M}{r} \right)^2 + \frac{5}{3} \left(-2b_3 + 3b_0\eta + 3\eta^2 \right) \frac{\Delta_r^2}{\Sigma^2} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^4 \right. \\ & + \frac{1}{72} \left(-4b_0 + 48b_1 - 23\eta - 12b_0\eta - 3\eta^2 \right) (Q - 1)^2 + \frac{1}{36} \left(-14b_0 - 24b_1 + 24b_2 - 103\eta + 66b_0\eta + 60\eta^2 \right) \frac{M}{r} (Q - 1) \\ & + \frac{1}{12} \left(2b_0 - 24b_1 + 24b_3 + 16\eta - 30b_0\eta - 21\eta^2 \right) \frac{\Delta_r}{\Sigma} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^2 (Q - 1) + \frac{1}{12} \left(-24b_0 - 16b_1 - 32b_2 \right) \\ & - 24b_3 + 47\eta - 24b_0\eta - 54\eta^2 \right) \frac{M}{r} \frac{\Delta_r}{\Sigma} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^2 \right] + \boldsymbol{\sigma} \left[\frac{1}{9} \left(-14a_0 - 6a_2 - 56\eta - 15a_0\eta - 21\eta^2 \right) \left(\frac{M}{r} \right)^2 \right. \\ & + \frac{5}{24} \left(-16a_3 + 24a_0\eta + 27\eta^2 \right) \frac{\Delta_r^2}{\Sigma^2} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^4 + \frac{1}{144} \left(-8a_0 + 96a_1 - 45\eta - 24a_0\eta \right) (Q - 1)^2 \\ & + \frac{1}{36} \left(-14a_0 - 24a_1 + 24a_2 - 109\eta + 66a_0\eta + 51\eta^2 \right) \frac{M}{r} (Q - 1) + \frac{1}{24} \left(4a_0 - 48a_1 + 48a_3 + 6\eta - 60a_0\eta - 39\eta^2 \right) \frac{\Delta_r}{\Sigma} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^2 (Q - 1) + \frac{1}{24} \left(-48a_0 - 32a_1 - 64a_2 - 48a_3 - 16\eta - 48a_0\eta - 147\eta^2 \right) \frac{M}{r} \frac{\Delta_r}{\Sigma} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^2 \right] \end{split}$$

为了搞清楚怎么求解轨道,我首先得搞明白哈密顿量(不是说搞清楚来龙去脉,而是说能够进行计算知道怎么代入数据)。文中提到的哈密顿量为:

$$\frac{H_{\text{eff}}}{\mu} = \beta^{i} p_{i} + \alpha \sqrt{1 + \gamma^{ij} p_{i} p_{j} + \mathcal{Q}_{4}(\boldsymbol{P})} + \frac{H_{SO}}{\mu} + \frac{H_{SS}}{\mu} - \frac{1}{2Mr^{5}} (r^{2} \delta^{ij} - 3r^{i} r^{j}) S_{i}^{*} S_{j}^{*} + \frac{d_{SS} \nu}{r^{4}} \left(\frac{m_{2}}{m_{1}} \boldsymbol{S}_{1} + \frac{m_{1}}{m_{2}} \boldsymbol{S}_{2} \right) \cdot \left(\boldsymbol{S}_{1} + \boldsymbol{S}_{2} \right) \cdot \left(\boldsymbol{S}_{2} + \boldsymbol{S}_{2} \right)$$

这里的下标都是非常清晰的,SS:Spin+Spin;SO:Spin+Orbit。重点在于其中的每一个值都是怎么算的,因此我在这里罗列一下:

The deformed metric takes the form:

$$\begin{split} g^{tt} &= -\frac{\Lambda_t}{\Delta_t \Sigma} \\ g^{rr} &= \frac{\Delta_r}{\Sigma} \\ g^{\theta\theta} &= \frac{1}{\Sigma} \\ g^{\phi\phi} &= \frac{1}{\Lambda_t} \Big(-\frac{\tilde{\omega}_{fd}^2}{\Delta_t \Sigma} + \frac{\Sigma}{\sin^2 \theta} \Big) \\ g^{t\phi} &= -\frac{\tilde{\omega}_{fd}}{\Delta_t \Sigma} \end{split}$$

而这里又引入了很多参数,具体形式如下:

$$\Delta_t(u) = \frac{1}{u^2} \Delta_u(u)$$

$$\Delta_u(u) = A(u) + \chi_{\text{Kerr}}^2 u^2$$

$$A(u) = 1 - 2u + 2\nu u^3 + \nu \left(\frac{94}{3} - \frac{41}{32}\pi^2\right) u^4$$

$$u = \frac{1}{r}$$

在**文献 34** 中将 $\Delta_u(u)$ 又做了一个改写:

$$\Delta_u(u) = \bar{\Delta}_u(u) \Big[1 + \nu \Delta_0 + \nu \log(1 + \Delta_1 u + \Delta_2 u^2 + \Delta_3 u^3 + \Delta_4 u^4) \Big]$$

而这里面用到的参数如下:

$$\bar{\Delta}_{u}(u) = \chi_{\text{\tiny Kerr}}^{2} \left(u - \frac{1}{r_{+}^{\text{\tiny EOB}}} \right) \left(u - \frac{1}{r_{-}^{\text{\tiny EOB}}} \right)$$
$$r_{\pm}^{\text{\tiny EOB}} = \left(1 \pm \sqrt{1 - \chi_{\text{\tiny Kerr}}^{2}} \right) (1 - K\nu)$$

Note: 这里我得回去把 Kerr 黑洞的基础的东西学习一下,不能说连这个东西都不懂。

在原文中说 r_{\pm}^{EOB} are radii reducing to those of the Kerr event and Cauchy horizons when the EOB adjustable parameter K goes to zero。

$$\begin{split} &\Delta_0 = K(\nu K - 2) \\ &\Delta_1 = -2(\nu K - 1)(K + \Delta_0) \\ &\Delta_2 = \frac{1}{2}\Delta_1(-4\nu K + \Delta_1 + 4) - \frac{a^2}{M^2}(\eta K - 1)^2\Delta_0 \\ &\Delta_3 = \frac{1}{3}\Big[-\Delta_1^3 + 3(\nu K - 1)\Delta_1^2 + 3\Delta_2\Delta_1 + 3\Delta_2\Delta_1 - 6(\nu K - 1) \times (-\nu K + \Delta_2 + 1) - 3\frac{a^2}{M^2}(\nu K - 1)^2\Delta_1\Big] \\ &\Delta_4 = \frac{1}{12}\Big\{6\frac{a^2}{M^2}(\Delta_1^2 - 2\Delta_2)(\nu K - 1)^2 + 3\Delta_1^4 - 8(\nu K - 1)\Delta_1^3 - 12\Delta_2\Delta_1^2 + 12[2(\nu K - 1)\Delta_2 + \Delta_3]\Delta_1 \\ &\quad + 12\Big(\frac{94}{3} - \frac{41}{23}\pi^2\Big)(\nu K - 1)^2 + 6[\Delta_2^2 - 4\Delta_3(\nu K - 1)]\Big\} \end{split}$$

最后需要知道的物理量是:

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{-g^{tt}}}$$
$$\beta^i = \frac{g^{ti}}{g^{tt}}$$

$$\gamma^{ij} = g^{ij} - \frac{g^{ti}g^{tj}}{g^{tt}}$$

还有很重要的一环就是两个系数 H_{SO} , H_{SS} :

$$\begin{split} H_{\mathrm{SO}} = & \frac{e^{2\nu - \tilde{\mu}} \left(e^{\tilde{\mu} + \nu} - \tilde{B} \right) (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r) \left(\boldsymbol{S} \cdot \hat{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{Kerr}} \right)}{\tilde{B}^{2} \sqrt{Q} \xi^{2}} + \frac{e^{\nu - 2\tilde{\mu}}}{\tilde{B}^{2} (\sqrt{Q} + 1) \sqrt{Q} \xi^{2}} \left\{ (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{\xi}) \tilde{\boldsymbol{J}} \left[\mu_{r} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v}r) (\sqrt{Q} + 1) - \mu_{\cos \theta} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{n}) \xi^{2} \right. \\ & \left. - \sqrt{Q} \left(\nu_{r} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v}r) + (\mu_{\cos \theta} - \nu_{\cos \theta}) (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{n}) \xi^{2} \right) \right] \tilde{B}^{2} + e^{\tilde{\mu} + \nu} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r) (2\sqrt{Q} + 1) \left[\tilde{\boldsymbol{J}} \nu_{r} (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{v}) - \nu_{\cos \theta} (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{n}) \xi^{2} \right] \tilde{B} \\ & \left. - \tilde{\boldsymbol{J}} \tilde{B}_{r} e^{\tilde{\mu} + \nu} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r) (\sqrt{Q} + 1) (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{v}) \right\} \\ H_{\mathrm{SS}} = & \omega \left(\boldsymbol{S} \cdot \hat{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{Kerr}} \right) + \frac{e^{-3\tilde{\mu} - \nu} \tilde{\boldsymbol{J}} \omega_{r}}{2\tilde{B} (\sqrt{Q} + 1) \sqrt{Q} \xi^{2}} \left\{ -e^{\tilde{\mu} + \nu} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v}r) (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r) (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{\xi}) \tilde{\boldsymbol{B}} + e^{2(\tilde{\mu} + \nu)} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r)^{2} (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{v}) \right. \\ & \left. + e^{2\tilde{\mu}} (1 + \sqrt{Q}) \sqrt{Q} (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{v}) \xi^{2} \tilde{\boldsymbol{B}}^{2} + \tilde{\boldsymbol{J}} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{n}) [(\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v}r) (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{n}) - \tilde{\boldsymbol{J}} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{n}) (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{v})] \xi^{2} \tilde{\boldsymbol{B}}^{2} \right\} \\ & + \frac{e^{-3\tilde{\mu} - \nu} \omega_{\cos \theta}}{2\tilde{\boldsymbol{B}} (\sqrt{Q} + 1) \sqrt{Q}} \left\{ -e^{2(\tilde{\mu} + \nu)} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r)^{2} (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{n}) + e^{\tilde{\mu} + \nu} \tilde{\boldsymbol{J}} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{n}) (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r) (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{\xi}) \tilde{\boldsymbol{B}} \right. \\ & + \left[(\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{n}) (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v}r)^{2} - \tilde{\boldsymbol{J}} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{n}) (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{v}) (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v}r) - e^{2\tilde{\mu}} (1 + \sqrt{Q}) \sqrt{Q} (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{n}) \xi^{2} \right] \tilde{\boldsymbol{B}}^{2} \right\} \end{split}$$

2.1.2 第二篇文献

暂时把刚才的那篇文章给放一下,重点把老师给我的另一篇文献给读透。A Surrogate Model for Gravitational Wave Signals from Comparable- to Large- Mass-Ratio Black Hole Binaries

研究的目的和原因

目的很简单,要提出一种好的模板或者说算法。因为目前的 inspiral-merger-ringdown(IMR)models 只对比较 moderate 质量比的系统进行了校准,这其实就导致对于那些质量比较大的系统这种传统方法的适用性不好。本文提出了一种叫做 EMRISur1dq1e4 的替代方法适用于 $q \in [3,10000]$ 的系统。这个取值范围是超过目前所有方法的。我粗略地阅读下来感觉,这篇文章的处理方法是有点类似于机器学习的,通过训练根据 $point-particle\ black\ hole\ perturbation\ theory(ppBHPT)$ 产生的数据就可以得到一个很好的模型。我尝试一句话概括说作者通过运用 ppBHPT 方法生成数据并且进行训练得到了一个可以适用于大质量比甚至是极端质量比的系统产生的引力波信号的比对,数据处理的模型。文中也提到了 EOB 这个方法本质上是唯象的一个方法,通过物理直觉 "猜出模型",然后根据真实的数据也好,数值相对论的波形也好来校准 (calibrate)。但是!作者声称他们提出的这种方式是不依赖于任何 underlying phenomenology 的。这个 model follows a data-driven learning strategy.

接下来讨论一下研究的过程。目前碰到了一个疑问点,什么叫 The model spans 13500M in duration?为什么时间可以用 M 作为衡量的单位?是不是因为取了 G=c=1,然后看不出来呢? 我觉得我需要补上关于 Kerr 黑洞的知识,还是不能操之过急,从最基础的史瓦西黑洞开始! 通常的球坐标系下的史瓦西线元:

$$ds^{2} = -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right)dt^{2} + \left(1 - \frac{2GM}{r}\right)^{-1}dr^{2} + r^{2}d\Omega^{2}$$

其中

$$d\Omega^2 \equiv d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2$$

下面定义乌龟坐标 r*

$$r^* := r + 2GM \ln \left| \frac{r}{2GM} - 1 \right|$$

满足如下关系:

$$\frac{dr^*}{dr} = \left(1 - \frac{2GM}{r}\right)^{-1}$$

很显然若 r 从视界外接近 2GM 那么 r^* 将会趋向于负无穷,因为 r 在减小,同时导数为正无穷,反之亦然。总之视界处 r=2GM 对于乌龟坐标就是 $-\infty$

2.2 June 30^{th}

今天是实习的第二天,首先安排一下今天的工作。我目前初步规定自己用周二和周三完成老师新给的文献的精读,我自己是希望能够对其中的一些代码跑一跑的。对了,对其中的基础的理论知识需要再补一补,特别是那个方程 Teukolsky equation。当然如果有空的话可以看一看科尔时空的相关内容。

下午的一些想法: 我找到了文章的源代码, 我希望能够真正地理解一下源代码, 我应该要至少可以运行, 并且应该可以在运行的过程中有一些收获。其次是我真的很想对球谐函数展开有更深的理解, 应该要再找一些资料看一看。然后对于量纲的问题我现在是这么思考的, 首先是对于长度而言我们有三个特征量:

$$r = \frac{2GM}{c^2}, r = \frac{3GM}{c^2}, r = \frac{6GM}{c^2}$$

但是我们一旦取了几何单位制之后就会得到:

$$r = 2M, 3M, 6M$$

那么我们再考虑时间,因为速度的"量纲"变为了 1,那么很自然的就有时间和长度等价。因此说时间也是用 M 作为衡量单位的。在找到的一篇 doctor thesis 里面提到了如下关系:

$$1M_{\odot} = 1.47 \text{km} = 4.92 \times 10^{-6} \text{seconds}$$

文章里面提到的比较的方法还是比较合理的,利用 $\mathbf{L2}$ 范数进行比较,如果是少数的点的话是用求和,连续就用积分:

$$\min_{\alpha} \frac{\sum |\tilde{x}_i - x_i|^2}{\sum |x_i|^2} \to \min_{\alpha} \frac{\int |\tilde{x}_i - x_i|^2}{\int |x_i|^2}$$

下面我开始读一下这篇博士论文, Kerr 度规:

$$ds^{2} = -\left(1 - \frac{2Mr}{\Sigma}\right)dt^{2} + \frac{\Sigma}{\Delta}dr^{2} + \Sigma d\theta^{2} + \left(r^{2} + a^{2} + \frac{2Ma^{2}r}{\Sigma}\sin^{2}\theta\right)\sin^{2}\theta d\phi^{2} - \frac{4Mar}{\Sigma}\sin^{2}\theta dt d\phi$$

这里有两个参数是老朋友了:

$$\Delta = r^2 - 2Mr + a^2 \qquad \qquad \Sigma = r^2 + a^2 \cos^2 \theta$$

这里的其他参数都是很明确的,新出现的 a 其实是单位质量的角动量:

$$a := \frac{\mathcal{J}}{M}$$

不知道为什么,a 的取值范围只能是 -M < a < M,因此经常引入无量纲参数 q 来描述

$$q := \frac{a}{M} \in [-1, 1]$$

我们当然也可以用同样的方法计算出 Kerr 黑洞的视界:

$$\Delta \equiv 0 \Rightarrow r_{+} = M + \sqrt{M^2 - a^2}$$

靠近事件视界的地方, space 被扭曲, 所有的物体都会沿着黑洞自旋的方向被吸进去, 没有任何东西可以停留在相同的空间位置, 这个被称为 ergosphere。

接下来继续倒一倒最初的那篇文献中的关系。因为要求轨道,显然我需要六个微分方程,而这正是哈密顿正则方程:

$$rac{dm{r}}{d\hat{t}} = rac{\partial \hat{H}_{ ext{real}}}{\partial m{p}}$$
 $rac{dm{p}}{d\hat{t}} = -rac{\partial \hat{H}_{ ext{real}}}{\partial m{r}} + \hat{m{\mathcal{F}}} = -rac{\partial \hat{H}_{ ext{real}}}{\partial m{r}} + rac{1}{
u\hat{\Omega}|m{r} imes m{p}|} rac{dE}{dt}m{p}$

最后显然我要用的是分量关系,直接用对应的分量就可以了。为了直观一点,我这里把哈密顿量再拿出来一下:

$$H_{ ext{real}} \equiv \mu \hat{H}_{ ext{real}} = M \sqrt{1 + 2
u \Big(rac{H_{ ext{eff}}}{\mu} - 1\Big)} - M$$

注意了微分关系中的哈密顿量是约化哈密顿量,不能够直接用,应该要用 $\frac{H_{\rm real}}{\mu}$ 具体的偏微分关系需要我手算或者用 ${f Mathematica}$ 来计算。

我目前的想法是将所有的参数一个一个慢慢磨掉

1. *β*

$$eta^i = rac{g^{ti}}{g^{tt}}$$
 $g^{t heta} = g^{tr} = 0$ $g^{tt} = -rac{\Lambda_t}{\Delta_t \Sigma}$

其实我们直接就可以发现

$$\beta^r = \beta^\theta = 0$$
 $\beta^\phi = \frac{\varpi_{fd}}{\Lambda_t}$

而

$$\varpi_{fd} = 2aMr + \omega_1^{fd}\nu \frac{aM^3}{r} + \omega_2^{fd}\nu \frac{aM^3}{r}$$

而

$$\Lambda_t = \varpi^4 - a^2 \Delta_t \sin^2 \theta \qquad \Delta_t = r^2 \Big[A(u) + \frac{a^2}{M^2} u^2 \Big]$$

$$A(u) = 1 - 2u + 2\nu u^3 + \nu \Big(\frac{94}{3} - \frac{41}{32} \pi^2 \Big) u^4 \qquad u = \frac{M}{r}$$

$$\varpi^2 = a^2 + \omega^2$$

代入就可以得到:

$$\beta^{r} = \beta^{\theta} = 0 \qquad \beta^{\phi} = \frac{2aMr + \omega_{1}^{fd}\nu^{\frac{aM^{3}}{r}} + \omega_{2}^{fd}\nu^{\frac{aM^{3}}{r}}}{(a^{2} + \omega^{2})^{4} - a^{2}r^{2}\sin^{2}\theta \left[1 - 2u + 2\nu u^{3} + \nu\left(\frac{94}{3} - \frac{41}{32}\pi^{2}\right)u^{4} + \frac{a^{2}}{M^{2}}u^{2}\right]}$$

这样就得到了 β 的显式表达式。但是具体计算过程中肯定是用 $\{x,y,z\}$ 的,因此还是需要把 β^{ϕ} 转换为 $\beta^{x,y,z}$,根据 e_{ϕ} 同 e_{x},e_{y},e_{z} 的转换关系,这个太麻烦了,先放着。

2. **p**

$$\boldsymbol{p} = \left\{ p^1, p^2, p^3 \right\} \equiv \left\{ p_x, p_y, p_z \right\}$$

3. α

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{-g^{t\bar{t}}}} = \sqrt{\frac{\Delta_t(r^2 + a^2\cos\theta^2)}{\varpi^4 - a^2\Delta_t\sin\theta^2}}$$

写在今天的最后,感觉到困难重重,一个是由于黑洞物理学习不多导致很多概念上的缺失,目前我还是没有搞明白 T 方程提出的目的和意义,没有明白球谐函数展开,没有明白第二篇文章的具体操作和代码,同时感觉我是不是对于第一篇文章需要代码求解的东西产生了理解偏差?那个东西有点太过夸张了。

现在,我就通过每天晚上的时间来补充学习黑洞物理的基础知识以及其他的相关内容。

2.3 July 1^{st}

今天是实习的第三天! 我希望今天能够完成两件事情,一个是跟着代码把第二篇文献的逻辑给理清楚,第二个是把第一篇文献中的计算关系再推进一点然后去找一下老师问一下问题。

2.3.1 第二篇文章

现在这篇文章的目的已经非常明确了,EMRISur1dq1e4 是一个计算波形的替代 NR 以及 EOB 的方法。同其他唯象的经验理论不同,这个方法是类似于机器学习的 Data Driven 的方法。而用来训练的数据都是根据 ppBHPT 方法产生的,适用于 $q \in [3,\infty]$,这是目前唯一使用范围如此之广的方法。有意思的一点在于质量比做了一个映射,这个关系是通过拟合或者插值出来的。在读了代码之后,仍然对于他具体的操作有些迷糊,目的是要插值或者说拟合找出 $A_S^{\ell,m}$, $\Phi_S^{\ell,m}$ 来代替真正的 $A^{\ell,m}$, $\Phi^{\ell,m}$,但是他具体的操作流程呢?我还是不太清楚,因此我找到了他们之前的工作也就是参考文献【47】,其中有比较具体的算法的描述。主要分成四个步骤:

Step 1: Greedy selection of parameter samples and reduced basis

比如说我现在有 \mathcal{N} 个数据,每一个数据包含了一组参数 $\{\Lambda\}$,以及在这组参数下的波形信息 $h(t,\Lambda)$,那 么我手头上就有了一个数据集,我们利用这么多的波形通过贪心算法去找到一组 m 个 \mathbf{RB} ,以及每一个 \mathbf{RB} 对应的参数组 (比如 q,a,Q)。(具体的算法我暂时不去关心。) 这个和量子力学其实就很像,只不过量子力学理我们解析地去求解得到本征波函数,然后用这组 (无穷个) 本征波函数将这个希尔伯特空间里的所有可能出现的波函数进行线性展开。i.e.:

$$h(t, \boldsymbol{\lambda}) = \sum_{i=1}^{m} c_i(\boldsymbol{\lambda}) e_i(t)$$

每一个基矢其实就是一个仅仅同 t 有关的函数。当然了,我们需要去验证这个展开的好坏就需要引入一个人为挖制的 ϵ :

$$\sigma_m \equiv \max_{oldsymbol{\lambda}} \min_{c_i \in \mathbb{C}} \left\| h(\cdot; oldsymbol{\lambda}) - \sum_{i=1}^m c_i(oldsymbol{\lambda}) e_i(\cdot) \right\|^2$$

$$c_i(oldsymbol{\lambda}) = \langle h(\cdot; oldsymbol{\lambda}), e_i(\cdot) \rangle$$

Step 2: Greedy selection of time samples and empirical interpolation

第二步,同样通过贪心算法去找到最好的时间点,同样是 m 个,这个个数的选择应该和插值有关。

Step 3:Fitting at empirical nodes 挑选完了基底和利用 EMI 挑选出时间点之后,随机地挑选一组参数 $\{\Lambda\}$,将它所对用的波形尝试用 $\{h(T_i; \Lambda_j)\}_{j=1}^m$ 来拟合出来。当然了,我们将波形分成了振幅和幅角两个部分:

$$h(t, \lambda) = A(t; \lambda)e^{-i\phi(t; \lambda)}$$

于是我们的任务就变成了找到 2m 个方程来近似波形:

$$\{A_i(\boldsymbol{\lambda})\}_{i=1}^m$$
 and $\{\phi_i(\boldsymbol{\lambda})\}_{i=1}^m$

Step4:Blablabla 总之最后就得到了模型。

我终于成功安装了 gwsurrogate 下面我就跟着程序跑一跑,但是好像我没有他们的那个数据?找到了数据。

2.3.2 第一篇文章

没看。

2.4 July **2**nd

已经基本明白了第二篇文章的意思,并且完成了 Slides 的制作,但是还有一些细节有点迷糊,先放一天,星期六再看看吧。现在的主要的精力就投入到第一篇文章中。我希望首先能够实现一下最开始的文章,画个图。最开始的文章理论太多,不搞了。

2.5 July 3^{rd}

今天的目标就是能够尝试完成最简单的情况的哈密顿量的导数符号计算,如果可能的话写成 Python 代码。最简单的情况如下:

$$\hat{H}_{ ext{real}} = rac{M}{\mu} \Big[\sqrt{1 + 2
u \Big(rac{H_{ ext{eff}}}{\mu} - 1\Big)} - 1 \Big]$$

代入哈密顿正则方程而且忽略耗散项就有:

$$\frac{d\boldsymbol{r}}{dt} = \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{p}} \left\{ \frac{1}{\mu} \left[\sqrt{1 + 2\nu \left(\frac{H_{\text{eff}}}{\mu} - 1 \right)} - 1 \right] \right\}$$

$$\frac{d\boldsymbol{p}}{dt} = -\frac{\partial}{\partial\boldsymbol{r}} \Big\{ \frac{1}{\mu} \Big[\sqrt{1 + 2\nu \Big(\frac{H_{\mathrm{eff}}}{\mu} - 1\Big)} - 1 \Big] \Big\}$$

因此关键点就在于

$$\frac{H_{\text{eff}}}{u}$$

这一项。简化后的这一项约等于:

$$\frac{H_{\text{eff}}}{\mu} \approx \beta^i p_i + \alpha \sqrt{1 + \gamma^{ij} p_i p_j}$$

其中 α, β, γ 完全由度规决定。

和老师的谈话结果如下:

- 1. 确实不需要考虑耗散 F 和 Q_4
- 2. 分开去算,不要一股脑儿代进去
- 3. rescaling 的原因是用了微扰理论,但是事实上通常并不是微扰,因此要做一个尺度变换。

下面我进行一下简单的计算,第一步:

$$rac{\partial \hat{H}_{ ext{real}}}{\partial oldsymbol{X}} = rac{\partial \hat{H}_{ ext{real}}}{\partial (rac{H_{ ext{eff}}}{\mu})} rac{\partial (rac{H_{ ext{eff}}}{\mu})}{\partial oldsymbol{X}} \hspace{1cm} oldsymbol{X} = \{oldsymbol{r}, oldsymbol{p}\}$$

其中:

$$rac{\partial \hat{H}_{ ext{real}}}{\partial (rac{H_{ ext{eff}}}{\mu})} = rac{M^2
u}{\mu (\mu \hat{H}_{ ext{real}} + M)}$$

因此求导的结果就应该为:

$$rac{\partial \hat{H}_{ ext{real}}}{\partial oldsymbol{X}} = rac{M^2
u}{\mu (\mu \hat{H}_{ ext{real}} + M)} rac{\partial (rac{H_{ ext{eff}}}{\mu})}{\partial oldsymbol{X}} \hspace{1cm} oldsymbol{X} = \{oldsymbol{r}, oldsymbol{p}\}$$

下面对第二项进行求导: (角动量应该守恒)

$$\frac{H_{\text{eff}}}{\mu} = \beta^i p_i + \alpha \sqrt{1 + \gamma^{ij} p_i p_j} = \beta^\phi p_\phi + \alpha \sqrt{1 + \gamma^{rr} p_r^2 + \gamma^{\theta\theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi\phi} p_\phi^2}$$

我们要注意到, α , β , γ 完全由度规决定,因此只是广义坐标 r 的函数,再进一步,由于 (deformd)Kerr 度规是轴对称度规,显然是和 ϕ 无关的,也就是有:

$$\beta = \beta(r, \theta), \alpha = \alpha(r, \theta), \gamma^{ij} = \gamma^{ij}(r, \theta)$$

而广义动量显然只是广义动量的函数。我下面全都写出来:

$$-\dot{p_r} = \frac{M^2 \nu}{\mu(\mu \hat{H}_{\rm real} + M)} \frac{\partial(\frac{H_{\rm eff}}{\mu})}{\partial r} = \frac{M^2 \nu}{\mu(\mu \hat{H}_{\rm real} + M)} \left[\frac{\partial \beta^{\phi}}{\partial r} p_{\phi} + \frac{\partial \alpha}{\partial r} \sqrt{1 + \gamma^{rr} p_r^2 + \gamma^{\theta\theta} p_{\theta}^2 + \gamma^{\phi\phi} p_{\phi}^2} + \frac{\alpha \left(\frac{\partial \gamma^{rr}}{\partial r} p_r^2 + \frac{\partial \gamma^{\theta\theta}}{\partial r} p_{\theta}^2 + \frac{\partial \gamma^{\phi\phi}}{\partial r} p_{\phi}^2 \right)}{2\sqrt{1 + \gamma^{rr} p_r^2 + \gamma^{\theta\theta} p_{\theta}^2 + \gamma^{\phi\phi} p_{\phi}^2}} \right]$$

$$-\dot{p_{\theta}} = \frac{M^2 \nu}{\mu(\mu \hat{H}_{\rm real} + M)} \frac{\partial(\frac{H_{\rm eff}}{\mu})}{\partial \theta} = \frac{M^2 \nu}{\mu(\mu \hat{H}_{\rm real} + M)} \left[\frac{\partial \beta^{\phi}}{\partial \theta} p_{\phi} + \frac{\partial \alpha}{\partial \theta} \sqrt{1 + \gamma^{rr} p_r^2 + \gamma^{\theta\theta} p_{\theta}^2 + \gamma^{\phi\phi} p_{\phi}^2} + \frac{\alpha \left(\frac{\partial \gamma^{rr}}{\partial r} p_r^2 + \frac{\partial \gamma^{\theta\theta}}{\partial \theta} p_{\theta}^2 + \frac{\partial \gamma^{\phi\phi}}{\partial \theta} p_{\phi}^2 \right)}{2\sqrt{1 + \gamma^{rr} p_r^2 + \gamma^{\theta\theta} p_{\theta}^2 + \gamma^{\phi\phi} p_{\phi}^2}} \right]$$

$$-\dot{p_{\phi}} = \frac{M^2 \nu}{\mu(\mu \hat{H}_{\text{real}} + M)} \frac{\partial \left(\frac{H_{\text{eff}}}{\mu}\right)}{\partial \phi} = 0$$

这也说明了角动量

$$p_{\phi} = const \equiv \mathcal{J}$$

下一步就是对广义动量求导了:

$$\dot{r} = \frac{M^2 \nu}{\mu(\mu \hat{H}_{\text{real}} + M)} \frac{\partial (\frac{H_{\text{eff}}}{\mu})}{\partial p_r} = \frac{M^2 \nu}{\mu(\mu \hat{H}_{\text{real}} + M)} \frac{\alpha \gamma^{rr} p_r}{\sqrt{1 + \gamma^{rr} p_r^2 + \gamma^{\theta \theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi \phi} p_\phi^2}}$$

$$\dot{\theta} = \frac{M^2 \nu}{\mu(\mu \hat{H}_{\text{real}} + M)} \frac{\partial(\frac{H_{\text{eff}}}{\mu})}{\partial p_{\theta}} = \frac{M^2 \nu}{\mu(\mu \hat{H}_{\text{real}} + M)} \frac{\alpha \gamma^{\theta \theta} p_{\theta}}{\sqrt{1 + \gamma^{rr} p_r^2 + \gamma^{\theta \theta} p_{\theta}^2 + \gamma^{\phi \phi} p_{\phi}^2}}$$

$$\dot{\phi} = \frac{M^2 \nu}{\mu(\mu \hat{H}_{\text{real}} + M)} \frac{\partial(\frac{H_{\text{eff}}}{\mu})}{\partial p_{\phi}} = \frac{M^2 \nu}{\mu(\mu \hat{H}_{\text{real}} + M)} \frac{\alpha \gamma^{\phi \phi} p_{\phi}}{\sqrt{1 + \gamma^{rr} p_r^2 + \gamma^{\theta \theta} p_{\theta}^2 + \gamma^{\phi \phi} p_{\phi}^2}}$$

假如我考虑一个圆轨道:

$$p_r = \dot{p_r} = 0, \dot{r} = 0, r = const, \phi_0 = 0, \theta_0 = \frac{\pi}{2}$$

将这个条件带进去就有对于: $\dot{r}=0$ 这个条件带进去其实就是得到 $p_r=0$,是一个 trivial 的条件,没得到啥别的有效信息。但是我可以用来化简这几个关系,注意了 $\beta^r=\beta^\theta=0$ 因此有:

$$\begin{split} \dot{p_r} &= -\frac{M^2 \nu}{\mu(\mu \hat{H}_{\rm real} + M)} \left[\frac{\partial \beta^\phi}{\partial r} \mathcal{J} + \frac{\partial \alpha}{\partial r} \sqrt{1 + \gamma^{\theta\theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{J}^2} + \frac{\alpha \left(\frac{\partial \gamma^{\theta\theta}}{\partial r} p_\theta^2 + \frac{\partial \gamma^{\phi\phi}}{\partial r} \mathcal{J}^2 \right)}{2 \sqrt{1 + \gamma^{\theta\theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{J}^2}} \right] = 0 \Rightarrow \mathbb{E}$$
 是否是一个限制?
$$\dot{p_\theta} &= -\frac{M^2 \nu}{\mu(\mu \hat{H}_{\rm real} + M)} \left[\frac{\partial \beta^\phi}{\partial \theta} \mathcal{J} + \frac{\partial \alpha}{\partial \theta} \sqrt{1 + \gamma^{\theta\theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{J}^2} + \frac{\alpha \left(\frac{\partial \gamma^{\theta\theta}}{\partial \theta} p_\theta^2 + \frac{\partial \gamma^{\phi\phi}}{\partial \theta} \mathcal{J}^2 \right)}{2 \sqrt{1 + \gamma^{\theta\theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{J}^2}} \right] \\ \dot{p_\phi} &= 0 \Rightarrow p_\phi = \mathcal{J} \\ \dot{r} &= 0 \Rightarrow r = const \\ \dot{\theta} &= \frac{M^2 \nu}{\mu(\mu \hat{H}_{\rm real} + M)} \frac{\alpha \gamma^{\theta\theta} p_\theta}{\sqrt{1 + \gamma^{\theta\theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{J}^2}} \\ \dot{\phi} &= \frac{M^2 \nu}{\mu(\mu \hat{H}_{\rm real} + M)} \left[\beta^\phi + \frac{\alpha \gamma^{\phi\phi} \mathcal{J}}{\sqrt{1 + \gamma^{\theta\theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{J}^2}} \right] \end{split}$$

所以现在唯一的任务就是搞清楚度规到底该如何取?需要求导的量如下:

$$\partial_r \alpha, \partial_\theta \alpha, \partial_r \beta^\phi, \partial_\theta \beta^\phi, \partial_r \gamma^{\theta\theta}, \partial_r \gamma^{\phi\phi}, \partial_\theta \gamma^{\theta\theta}, \partial_\theta \gamma^{\phi\phi}$$

我还算了一下角动量:

$$\mathcal{J} = -\frac{2\partial_r \alpha (1 + \gamma^{\theta\theta} p_\theta^2) + \alpha \partial_r \gamma^{\theta\theta} p_\theta^2}{\alpha \partial_r \gamma^{\phi\phi} + 2\gamma^{\phi\phi} \partial_r \alpha}$$

这应该是一个常数,从这里可以得到什么信息呢?有些困难。

我现在想一想感觉度规那里复杂了,不应该那么复杂,等我复习完 Fortran 完后再考虑度规的问题。现在主要复习 Fortran,为之后的数值积分做准备。我来定一下 Fortran 的复习计划,第一步是复习数据结构,定义的方式,这是十分重要的。第二步是复习输入输出方式,第三步是复习选择结构,第四步是复习循环结构。最后复习一下 subroutine 和 funciton 的定义方式。

2.6 July 4th

今天我主要工作是两个方面,第一是把度规过一遍,第二就是准备要把度规以及其他参数代入方程了,如果顺利的话应该就可以得到正则方程的简化形式了。我本来是考虑可不可以直接手算出度规的最简形式?后来想了想这不是一个好办法,因为原来的形式是很简单的,算出那些量之后都会存在内存里,计算机会直接调用而不是重新计算,但是如果我手动地把它们都算出来只是弄巧成拙而且加大了我自己的工作量,我要用到

的其实仅仅是求导后的结果罢了。现在开始检查一下哈密顿量的计算。经过验证,昨天的计算是正确的。考虑 到结果中的根号出现了多次,我可以定义一个变量:

The_guy_with_alpha :=
$$\sqrt{1 + \gamma^{rr}p_r^2 + \gamma^{\theta\theta}p_\theta^2 + \gamma^{\phi\phi}p_\phi^2}$$

而且这一项很友善的地方是不用求导。

我看了一下张晨师兄展示的一个哈密顿量对 p_r 的求导结果,是超乎我想象的简单,显然我的求导策略出现了问题。

2.7 July 5^{th}

我做了进一步的计算:

$$\begin{split} \frac{\partial \alpha}{\partial x} &= \frac{1}{2(-g^{tt})^{\frac{3}{2}}} \frac{\partial g^{tt}}{\partial x} \\ \frac{\partial \beta^{\phi}}{\partial x} &= \frac{1}{(g^{tt})^2} \left[\frac{\partial g^{t\phi}}{\partial x} g^{tt} - \frac{\partial g^{tt}}{\partial x} g^{t\phi} \right] \\ \frac{\partial \gamma^{\theta\theta}}{\partial x} &= \frac{\partial g^{\theta\theta}}{\partial x} \\ \frac{\partial \gamma^{\phi\phi}}{\partial x} &= \frac{\partial g^{\phi\phi}}{\partial x} - \frac{1}{(g^{tt})^2} \left[2g^{t\phi} g^{tt} \frac{\partial g^{t\phi}}{\partial x} - (g^{t\phi})^2 \frac{\partial g^{tt}}{\partial x} \right] \end{split}$$

于是归根结底,把问题化归为了度规的求导:我需要求导的有以下几个量:

$$oxed{rac{\partial g^{tt}}{\partial r},rac{\partial g^{tt}}{\partial heta},rac{\partial g^{t\phi}}{\partial r},rac{\partial g^{t\phi}}{\partial heta},rac{\partial g^{ heta heta}}{\partial r},rac{\partial g^{ heta heta}}{\partial r},rac{\partial g^{ heta heta}}{\partial heta},rac{\partial g^{\phi \phi}}{\partial heta}}{\partial heta}}$$

针对最简单的圆轨道的话, 我们要考虑的仅仅有 4 个对 θ 的导数!!

$$\left[rac{\partial g^{tt}}{\partial heta}, rac{\partial g^{t\phi}}{\partial heta}, rac{\partial g^{ heta heta}}{\partial heta}, rac{\partial g^{\phi\phi}}{\partial heta}
ight]$$

进一步计算可以得到简单得惊人的结果!

$$\begin{split} \frac{\partial g^{tt}}{\partial \theta} &= -\frac{1}{\Delta_t(r)} \frac{\Sigma \frac{\partial \Lambda_t}{\partial \theta} - \Lambda_t \frac{\partial \Sigma}{\partial \theta}}{\Sigma^2} = \frac{a^2 \sin(2\theta) \left[a^2 \Delta_t + r^2 \Delta_t - \varpi^4 \right]}{\Delta_t \Sigma^2} \\ \frac{\partial g^{t\phi}}{\partial \theta} &= -\frac{1}{\Delta_t} \frac{a^2 \sin(2\theta) \tilde{\omega}_{fd}}{\Sigma^2} \\ \frac{\partial g^{\theta\theta}}{\partial \theta} &= \frac{a^2 \sin(2\theta)}{\Sigma^2} \\ \frac{\partial g^{\phi\phi}}{\partial \theta} &= \frac{a^2 \sin(2\theta)}{(\Lambda_t)^2} \left[\frac{2\Sigma \Delta_t - \Lambda_t}{\sin^2 \theta} - \frac{\tilde{\omega}_{fd}^2 (\Delta_t \Sigma + \Lambda_t)}{\Delta_t \Sigma^2} \right] \end{split}$$

我的计算应该是没有问题的,但是我现在就是要解决手头上的这个**初值如何取的问题**,但是其实质量,自旋以及 r 这些量都是我给定的,我现在的唯一任务就是去算出 $p_{\phi} = \mathcal{J}$,我要找一找这个关系,由于是守恒动力学部分,而且我只是先算一个圆轨道,那么很显然我要考虑的就是 p_{θ} ,但是我之前没有考虑到**能量守恒**这个条件,我可以直接从这里就计算出 $p_{\phi} = \mathcal{J}$

2.8 July 6^{th}

今天开了组会,做了一下报告,然后发现我对初始条件还是完全没有感觉。类似于质量,角动量以及 p_{ϕ}, p_{θ} 到底该如何取,仍然没有一个感觉。

2.9 July 7^{th}

早上我解决了动图以及可视化的问题,这个成果可以下周组会的时候报告来展示一下,现在我手头上有两个任务,一个是帮张晨师兄解决那个求积分的问题,第二个就是解决我圆轨道的初值问题,并且我之前忽略掉的积分上限问题,积分到什么地方停止?对了,我现在就直接用 Runge – Kutta 方法把欧拉法换掉。粗略看了一下,不太容易搞,但是应该也不难实现,放到最后去思考。

和张晨师兄交流之后感觉受益匪浅。我之前一直在思考

$$\dot{p_r} = 0$$

这一项该如何使用?但是实际上由于

$$r = \text{const} \Rightarrow \dot{r} = p_r = 0$$

 $p_r = 0$ 这一项本身就已经体现在我的哈密顿量里面了,我一直用的是没有 p_r 的哈密顿量,那么就说明 $p_r \equiv 0$,这里面已经包含了 $p_r = 0$ 。师兄说,我应该手动输入两个 θ 的极值,直接从 θ 的最小值开始积分,这是有道理的。因为我目前手头上的其实是有这么一个关系:

$$\beta^{\phi} \mathcal{L} + \alpha \sqrt{1 + \gamma^{\theta\theta} p_{\theta}^2 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^2} = \text{const}$$

由于我这个是圆轨道还更加简单,我完全不需要考虑 r, 我只需要任意地去取两个点,然后利用这个条件去计算出

$$\mathcal{L} \equiv p^{\phi} = \mathrm{const}$$

一旦我计算出 p_{θ} 之后,我没有必要再利用微分方程去计算 p_{θ} 的演化,而是可以直接通过守恒的哈密顿量去计算出 p_{θ} 在任意 θ 情况下的取值。假设我取定如下 θ 的最大,最小值:

$$\theta_{max} \equiv \theta_{+}$$
 $\theta_{min} \equiv \theta_{-}$

于是我有如下条件:

$$\beta^{\phi}(\theta_{-})\mathcal{L} + \alpha\sqrt{1 + \gamma^{\phi\phi}(\theta_{-})\mathcal{L}^{2}} = \beta^{\phi}(\theta_{+})\mathcal{L} + \alpha\sqrt{1 + \gamma^{\phi\phi}(\theta_{+})\mathcal{L}^{2}}$$

下面将采用如下记号 $\beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2$,利用 Mathematica 可以计算得到如下结果:

$$\mathcal{L} = \sqrt{\frac{\alpha_2^2(\beta_1 - \beta_2)^2 - \alpha_1^4 \gamma_1 + 2\sqrt{\alpha_1^2 \alpha_2^2 (\beta_1 - \beta_2)^2 \left[(\beta_1 - \beta_2)^2 - (\alpha_1^2 - \alpha_2^2)(\gamma_1 - \gamma_2)\right] - \alpha_2^4 \gamma_2 + \alpha_1^2 \left[(\beta_1 - \beta_2)^2 + \alpha_2^2 (\gamma_1 + \gamma_2)\right]}{\left[(\beta_1 - \beta_2)^2 - \alpha_1^2 \gamma_1\right]^2 - 2\alpha_2^2 \left[(\beta_1 - \beta_2)^2 + \alpha_1^2 \gamma_1\right] \gamma_2 + \alpha_2^4 \gamma_2^2}}$$

但是我之前没有注意到实际上一共有两个正数解: 所以我推测可能是我之前取的那个解不行? 我检查一下, 在

这里完整地给出四个解:

$$\mathcal{L}_{1} = \sqrt{\frac{\alpha_{2}^{2}(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} - \alpha_{1}^{4}\gamma_{1} + 2\sqrt{\alpha_{1}^{2}\alpha_{2}^{2}(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} \left[(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} - (\alpha_{1}^{2} - \alpha_{2}^{2})(\gamma_{1} - \gamma_{2})\right]} - \alpha_{2}^{4}\gamma_{2} + \alpha_{1}^{2} \left[(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} + \alpha_{2}^{2}(\gamma_{1} + \gamma_{2})\right]}}{\left[(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} - \alpha_{1}^{2}\gamma_{1}\right]^{2} - 2\alpha_{2}^{2} \left[(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} + \alpha_{1}^{2}\gamma_{1}\right]\gamma_{2} + \alpha_{2}^{4}\gamma_{2}^{2}}$$

$$\mathcal{L}_{2} = \sqrt{\frac{\alpha_{2}^{2}(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} - \alpha_{1}^{4}\gamma_{1} - 2\sqrt{\alpha_{1}^{2}\alpha_{2}^{2}(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} \left[(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} - (\alpha_{1}^{2} - \alpha_{2}^{2})(\gamma_{1} - \gamma_{2})\right] - \alpha_{2}^{4}\gamma_{2} + \alpha_{1}^{2} \left[(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} + \alpha_{2}^{2}(\gamma_{1} + \gamma_{2})\right]}}{\left[(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} - \alpha_{1}^{2}\gamma_{1}\right]^{2} - 2\alpha_{2}^{2} \left[(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} + \alpha_{1}^{2}\gamma_{1}\right]\gamma_{2} + \alpha_{2}^{4}\gamma_{2}^{2}}$$

$$\mathcal{L}_{3} = -\sqrt{\frac{\alpha_{2}^{2}(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} - \alpha_{1}^{4}\gamma_{1} + 2\sqrt{\alpha_{1}^{2}\alpha_{2}^{2}(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} \left[(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} - (\alpha_{1}^{2} - \alpha_{2}^{2})(\gamma_{1} - \gamma_{2})\right] - \alpha_{2}^{4}\gamma_{2} + \alpha_{1}^{2} \left[(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} + \alpha_{2}^{2}(\gamma_{1} + \gamma_{2})\right]}}{\left[(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} - \alpha_{1}^{2}\gamma_{1}\right]^{2} - 2\alpha_{2}^{2} \left[(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} + \alpha_{1}^{2}\gamma_{1}\right]\gamma_{2} + \alpha_{2}^{4}\gamma_{2}^{2}}$$

$$\mathcal{L}_{4} = -\sqrt{\frac{\alpha_{2}^{2}(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} - \alpha_{1}^{4}\gamma_{1} - 2\sqrt{\alpha_{1}^{2}\alpha_{2}^{2}(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} \left[(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} - (\alpha_{1}^{2} - \alpha_{2}^{2})(\gamma_{1} - \gamma_{2})\right] - \alpha_{2}^{4}\gamma_{2} + \alpha_{1}^{2} \left[(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} + \alpha_{2}^{2}(\gamma_{1} + \gamma_{2})\right]}}{\left[(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} - \alpha_{1}^{4}\gamma_{1} - 2\sqrt{\alpha_{1}^{2}\alpha_{2}^{2}(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} \left[(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} - (\alpha_{1}^{2} - \alpha_{2}^{2})(\gamma_{1} - \gamma_{2})\right] - \alpha_{2}^{4}\gamma_{2} + \alpha_{1}^{2} \left[(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} + \alpha_{2}^{2}(\gamma_{1} + \gamma_{2})\right]}}{\left[(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} - \alpha_{1}^{2}\gamma_{1}\right]^{2} - 2\alpha_{2}^{2} \left[(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} + \alpha_{1}^{2}\gamma_{1}\right]\gamma_{2} + \alpha_{2}^{4}\gamma_{2}^{2}}}$$

我认为 \mathcal{L}_1 , \mathcal{L}_3 等价, \mathcal{L}_2 , \mathcal{L}_4 是等价的,只不过是一个逆时针转,一个顺时针转而已,我为了方便不妨取正数解,但是这两个真的都可以吗? 我觉得我直接加绝对值的做法是错误的,我应该找出哪个是对的才行。于是我们就求出了这个情况下守恒的轨道角动量 L, 下面再次利用守恒关系

$$E = \beta_1(\theta_-)\mathcal{L} + \alpha_1(\theta_-)\sqrt{1 + \gamma_1(\theta_-)\mathcal{L}^2} = const$$

于是

$$E = \beta^{\phi}(\theta)\mathcal{L} + \alpha(\theta)\sqrt{1 + \gamma^{\phi\phi}(\theta)\mathcal{L}^2 + \gamma^{\theta\theta}p_{\theta}^2}$$

观察这个式子我们很容易就可以得到:

$$p_{\theta} = \sqrt{\frac{\left(\frac{E - \beta^{\phi}(\theta)\mathcal{L}}{\alpha(\theta)}\right)^{2} - \gamma^{\phi\phi}(\theta)\mathcal{L}^{2} - 1}{\gamma^{\theta\theta}}}$$

这样的话,我们就没有必要再利用微分方程去计算得到 p_{θ} 了,而是可以直接利用守恒关系来得到 p_{θ} ,这显然 也降低了误差,而且很关键的一点我们可以发现,在 $\dot{\theta}$, $\dot{\phi}$ 里面,其实是不含有任何一个导数项的,只含有 θ 项,但是实际上我之前还忽略了很重要的一点:

$$m{r} \equiv rac{m{R}}{M}$$
 $m{p} \equiv rac{m{P}}{\mu}$ $\hat{t} \equiv rac{t}{M}$ $rac{dm{r}}{d\hat{t}} = rac{dm{R}}{dt}$ $rac{dm{p}}{d\hat{t}} = rac{dm{P}}{dt} rac{M}{dt}$

这样实际上就是:

不过我先别考虑这么多,记住:

$$egin{aligned} oldsymbol{r} &= oldsymbol{r}_0 + rac{doldsymbol{r}}{d\hat{t}}d\hat{t} \ oldsymbol{p} &= oldsymbol{p}_0 + rac{doldsymbol{p}}{d\hat{t}}d\hat{t} \end{aligned}$$

等我最后积分结束之后我再考虑

$$oldsymbol{r} o oldsymbol{R} \qquad oldsymbol{p} o oldsymbol{P}$$

下面我要考虑把刚才干出来的东西写进代码里面,但是由于这就要求我需要首先根据初始条件去定出 β_1 , β_2 , α_1 , α_2 , 但是这就要求我再一次计算度规,那么显然我不能够采用目前的这种非常 dirty 的编程方法了,我需要定义函数,然后每次调用函数即可。下面开始重构代码。但是其实尝试了一下定义这些函数未必方便,继续尝试。

2.10 July 8^{th}

今天的目标就是写完代码,然后能够跑出正确的结果来,当然首先是用欧拉法去解微分方程,因为他简单,同时要改成 Runge-Kutta 法其实要废不少的脑筋,目前我碰到的问题是计算出来的 p_{ϕ} 和总能量 E 不是个数了,我猜测基本是因为根号下面出现了负数导致的,下一步就是要检查一下代码和计算的公式是否正确。我觉得有点奇怪,先把整理好的角动量表达式写下来:

$$\mathcal{L}_{1} = \sqrt{\frac{(\alpha_{1}^{2} + \alpha_{2}^{2})(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} - (\alpha_{1}^{4}\gamma_{1} + \alpha_{2}^{4}\gamma_{2}) + \alpha_{1}^{2}\alpha_{2}^{2}(\gamma_{1} + \gamma_{2}) + 2\sqrt{\alpha_{1}^{2}\alpha_{2}^{2}(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} \left[(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} - (\alpha_{1}^{2} - \alpha_{2}^{2})(\gamma_{1} - \gamma_{2})\right]}}{(\beta_{1} - \beta_{2})^{4} - 2(\beta_{1} - \beta_{2})^{2}(\alpha_{1}^{2}\gamma_{1} + \alpha_{2}^{2}\gamma_{2}) - 2\alpha_{1}^{2}\alpha_{2}^{2}\gamma_{1}\gamma_{2} + \alpha_{1}^{4}\gamma_{1}^{2} + \alpha_{2}^{4}\gamma_{2}^{2}}}$$

$$\mathcal{L}_{2} = \sqrt{\frac{(\alpha_{1}^{2} + \alpha_{2}^{2})(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} - (\alpha_{1}^{4}\gamma_{1} + \alpha_{2}^{4}\gamma_{2}) + \alpha_{1}^{2}\alpha_{2}^{2}(\gamma_{1} + \gamma_{2}) - 2\sqrt{\alpha_{1}^{2}\alpha_{2}^{2}(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} \left[(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} - (\alpha_{1}^{2} - \alpha_{2}^{2})(\gamma_{1} - \gamma_{2})\right]}}{(\beta_{1} - \beta_{2})^{4} - 2(\beta_{1} - \beta_{2})^{2}(\alpha_{1}^{2}\gamma_{1} + \alpha_{2}^{2}\gamma_{2}) - 2\alpha_{1}^{2}\alpha_{2}^{2}\gamma_{1}\gamma_{2} + \alpha_{1}^{4}\gamma_{1}^{2} + \alpha_{2}^{4}\gamma_{2}^{2}}}$$

$$\mathcal{L}_{3} = -\sqrt{\frac{(\alpha_{1}^{2} + \alpha_{2}^{2})(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} - (\alpha_{1}^{4}\gamma_{1} + \alpha_{2}^{4}\gamma_{2}) + \alpha_{1}^{2}\alpha_{2}^{2}(\gamma_{1} + \gamma_{2}) + 2\sqrt{\alpha_{1}^{2}\alpha_{2}^{2}(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} \left[(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} - (\alpha_{1}^{2} - \alpha_{2}^{2})(\gamma_{1} - \gamma_{2})\right]}}{(\beta_{1} - \beta_{2})^{4} - 2(\beta_{1} - \beta_{2})^{2}(\alpha_{1}^{2}\gamma_{1} + \alpha_{2}^{2}\gamma_{2}) - 2\alpha_{1}^{2}\alpha_{2}^{2}\gamma_{1}\gamma_{2} + \alpha_{1}^{4}\gamma_{1}^{2} + \alpha_{2}^{4}\gamma_{2}^{2}}}$$

$$(\beta_{1} - \beta_{2})^{4} - 2(\beta_{1} - \beta_{2})^{2}(\alpha_{1}^{2}\gamma_{1} + \alpha_{2}^{2}\gamma_{2}) - 2\alpha_{1}^{2}\alpha_{2}^{2}\gamma_{1}\gamma_{2} + \alpha_{1}^{4}\gamma_{1}^{2} + \alpha_{2}^{4}\gamma_{2}^{2}$$

$$(\alpha_{1}^{2} + \alpha_{2}^{2})(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} - (\alpha_{1}^{4}\gamma_{1} + \alpha_{2}^{4}\gamma_{2}) + \alpha_{1}^{2}\alpha_{2}^{2}(\gamma_{1} + \gamma_{2}) - 2\sqrt{\alpha_{1}^{2}\alpha_{2}^{2}(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} \left[(\beta_{1} - \beta_{2})^{2} - (\alpha_{1}^{2} - \alpha_{2}^{2})(\gamma_{1} - \gamma_{2})\right]}$$

$$(\beta_{1} - \beta_{2})^{4} - 2(\beta_{1} - \beta_{2})^{2}(\alpha_{1}^{2}\gamma_{1} + \alpha_{2}^{2}\gamma_{2}) - 2\alpha_{1}^{2}\alpha_{2}^{2}\gamma_{1}\gamma_{2} + \alpha_{1}^{4}\gamma_{1}^{2} + \alpha_{2}^{4}\gamma_{2}^{2}$$

$$(\beta_{1} - \beta_{2})^{4} - 2(\beta_{1} - \beta_{2})^{2}(\alpha_{1}^{2}\gamma_{1} + \alpha_{2}^{2}\gamma_{2}) - 2\alpha_{1}^{2}\alpha_{2}^{2}\gamma_{1}\gamma_{2} + \alpha_{1}^{4}\gamma_{1}^{2} + \alpha_{2}^{4}\gamma_{2}^{2}$$

我做了一下测试发现连最基本的 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 的情况程序都跑不了,基本判定是程序的其他地方出错了,下面开始排查程序中的问题。

问题发现了,问题在于这个做法本身就是失效的,最上面的和最下面的两个点本质上是等价的,因此遮掩是没有办法计算出来的,我这个时候可能必须要去考虑 $\dot{p}_r = 0$ 的这个条件来提供第二个约束条件了。

2.11 July 9^{th}

今天的任务就是求出角动量和能量,然后尝试完善代码。经过我的手推证明这是一个可行的办法,我目前需要处理的有三个对r的导数

$$\frac{\partial \beta}{\partial r} \qquad \frac{\partial \alpha}{\partial r} \qquad \frac{\partial \gamma^{\phi\phi}}{\partial r}$$

最终要求解的式子是:

$$aL + b\sqrt{1 + cL^2} + \frac{\alpha dL^2}{2\sqrt{1 + cL^2}} = 0$$

其中 $q \equiv \partial_r \beta^\phi \Big|_{\theta_-}$ $b \equiv \partial_r \alpha \Big|_{\theta_-}$ $c \equiv \gamma^{\phi\phi} \Big|_{\theta_-}$ $d \equiv \partial_r \gamma^{\phi\phi} \Big|_{\theta_-}$ 我一共得到四个解如下:

$$\mathcal{L}_1 = -\sqrt{\frac{-2b^2}{-q^2 + 2b^2c + bd\alpha + \sqrt{q^4 - 2q^2bd\alpha}}}$$

$$V - q^2 + 2b^2c + ba\alpha + \sqrt{q^4 - 2q^2ba\alpha}$$

$$\mathcal{L}_2 = -\sqrt{\frac{2b^2}{q^2 - 2b^2c - bd\alpha + \sqrt{q^4 - 2q^2bd\alpha}}} \qquad \checkmark$$

$$\mathcal{L}_3 = \sqrt{\frac{-2b^2}{-q^2 + 2b^2c + bd\alpha + \sqrt{q^4 - 2q^2bd\alpha}}} \qquad \checkmark$$

$$\mathcal{L}_3 = \sqrt{\frac{-2b^2}{-q^2 + 2b^2c + bd\alpha + \sqrt{q^4 - 2q^2bd\alpha}}}$$

$$\mathcal{L}_4 = \sqrt{\frac{2b^2}{q^2 - 2b^2c - bd\alpha + \sqrt{q^4 - 2q^2bd\alpha}}}$$

具体的取值也是到时候再考虑,但是可以确定的是仍然是 $\mathcal{L}_1 \Leftrightarrow \mathcal{L}_3, \mathcal{L}_2 \Leftrightarrow \mathcal{L}_4$ 。 下面开始考虑具体的导数计算:

$$\beta^{\phi} = \frac{\tilde{\omega}_{\mathrm{fd}}}{\Lambda_t} \Rightarrow \partial_r \beta^{\phi} = \frac{(\tilde{\omega}_{\mathrm{fd}})' \Lambda_t - (\Lambda_t)' \tilde{\omega}_{\mathrm{fd}}}{\Lambda_t^2}$$

$$(\beta^{\phi})' = \frac{2aM\Lambda_t - 2aMr(\Lambda_t)'}{\Lambda_t^2} = \frac{2aM}{\Lambda_t} \left(1 - r\frac{\Lambda_t'}{\Lambda_t}\right)$$

这里面就出现了两个需要我们处理的导数项

$$\underbrace{(\tilde{\omega}_{\mathrm{fd}})'}_{\text{easy to deal with}} (\Lambda_t)' \Rightarrow (\Delta_t)' \qquad \checkmark$$

这里的第一项是十分容易处理的,第二项比较复杂,但是仍然是可以接受的范围之内,之后会进行仔细的处 理。

$$\partial_r \alpha = \frac{-1}{2(-q^{tt})^{3/2}} \frac{(\Lambda_t)' \Delta_t \Sigma - \left[(\Delta_t)' \Sigma + (\Sigma)' \Delta_t \right] \Lambda_t}{(\Delta_t \Sigma)^2}$$

稍作化简:

$$\partial_r \alpha = \frac{-1}{2(-g^{tt})^{3/2}} \frac{(\Lambda_t)' \Delta_t \Sigma - \left[(\Delta_t)' \Sigma + 2r \Delta_t \right] \Lambda_t}{(\Delta_t \Sigma)^2}$$

这里出现的导数其实在之前我们就已经碰到过了。下面处理最后一项:

$$\partial_r \gamma^{\phi\phi} = \partial_r g^{\phi\phi} - \frac{2g^{t\phi}g^{tt}(g^{t\phi})' - (g^{t\phi})^2(g^{tt})'}{(g^{tt})^2}$$

$$(g^{tt})' = -\frac{(\Lambda_t)'\Delta_t\Sigma - \left[(\Delta_t)'\Sigma + (\Sigma)'\Delta_t\right]\Lambda_t}{(\Delta_t\Sigma)^2}$$

$$(g^{tt})' = -\frac{(\Lambda_t)' \Delta_t \Sigma - \left[(\Delta_t)' \Sigma + 2r \Delta_t \right] \Lambda_t}{(\Delta_t \Sigma)^2}$$

这一项其实就是之前计算 α 的时候已经碰到过的东西。

$$(g^{t\phi})' = \frac{\tilde{\omega}_{\text{fd}}[(\Delta_t)'\Sigma + (\Sigma)'\Delta_t] - (\tilde{\omega}_{\text{fd}})'\Delta_t\Sigma}{(\Delta_t\Sigma)^2}$$

$$(g^{t\phi})' = \frac{\tilde{\omega}_{\text{fd}}[(\Delta_t)'\Sigma + 2r\Delta_t] - 2aM\Delta_t\Sigma}{(\Delta_t\Sigma)^2}$$

$$(g^{\phi\phi})' = \frac{-2\Lambda_t \Delta_t \Sigma \tilde{\omega}_{\text{fd}}(\tilde{\omega}_{\text{fd}})' + \tilde{\omega}_{\text{fd}}^2 \left[(\Lambda_t)' \Delta_t \Sigma + \Lambda_t (\Delta_t)' \Sigma + \Lambda_t \Delta_t (\Sigma)' \right]}{(\Lambda_t \Delta_t \Sigma)^2} + \frac{(\Sigma)' \Lambda_t - (\Lambda_t)' \Sigma}{\Lambda_t^2 \sin^2 \theta}$$

$$(g^{\phi\phi})' = \frac{-8a^2M^2r\Lambda_t\Delta_t\Sigma + \tilde{\omega}_{td}^2\left[(\Lambda_t)'\Delta_t\Sigma + \Lambda_t(\Delta_t)'\Sigma + 2r\Lambda_t\Delta_t\right]}{(\Lambda_t\Delta_t\Sigma)^2} + \frac{2r\Lambda_t - (\Lambda_t)'\Sigma}{\Lambda_t^2\sin^2\theta}$$

下面开始显式地处理这些表达式:

1. $(\tilde{\omega}_{fd})'$ 这其实是最简单的一项

$$\tilde{\omega}_{\mathrm{fd}} = 2aMr \Rightarrow (\tilde{\omega}_{\mathrm{fd}})' = 2a$$

2. $(\Lambda_t)'$ 这一项可以化归为对 Δ_t 的偏导数:

$$\Lambda_t = (r^2 + a^2)^2 - a^2 \sin^2 \theta \Delta_t \Rightarrow (\Lambda_t)' = 4r(r^2 + a^2) - a^2 \sin^2 \theta (\Delta_t)'$$

3. $(\Sigma)'$

$$\Sigma = r^2 + a^2 \cos^2 \theta \Rightarrow (\Sigma)' = 2r$$

4. $(\Delta_t)'$

其实这里面就是这一项在捣乱,这一项是一切复杂的根源所在,下面我就来分析它:

$$\Delta_t(u) = \frac{\Delta_u(u)}{u^2} \Rightarrow (\Delta_t(u))' = 2r\Delta_u - \frac{\partial \Delta_u}{\partial u}$$

$$\Delta_u = \left[\chi_{\text{Kerr}}^2 u^2 + \frac{2u}{\nu K - 1} + \frac{1}{(\nu K - 1)^2} \right] \left[1 + \nu \Delta_0 + \nu \log \left(1 + \Delta_1 \nu + \Delta_2 \nu^2 + \Delta_3 \nu^3 + \Delta_4 \nu^4 \right) \right]$$

下面要做的就是这个东西对 u 求导:

$$\frac{\partial \Delta_u}{\partial u} = \frac{\nu \left(\Delta_1 + 4\Delta_4 u^3 + 3\Delta_3 u^2 + 2\Delta_2 u\right) \left[\frac{1}{(K\nu - 1)^2} + \frac{2u}{K\nu - 1} + u^2 \chi^2\right]}{\Delta_4 u^4 + \Delta_3 u^3 + \Delta_2 u^2 + \Delta_1 u + 1} + \left(\frac{2}{K\nu - 1} + 2u\chi^2\right) \left[\Delta_0 \nu + \nu \log\left(\Delta_4 u^4 + \Delta_3 u^3 + \Delta_2 u^2 + \Delta_1 u + 1\right) + 1\right] \qquad \checkmark$$

于是到这里为止所有的导数都已经搞定了! 为了写代码更加方便, 现在把它们全都整合在一起

$$q \equiv \partial_r \beta^{\phi} = \frac{2aM\Lambda_t - 2aMr(\Lambda_t)'}{\Lambda_t^2} = \frac{2aM}{\Lambda_t} \left(1 - r\frac{\Lambda_t'}{\Lambda_t}\right)$$

$$b \equiv \partial_r \alpha = \frac{-1}{2(-g^{tt})^{3/2}} \frac{(\Lambda_t)'\Delta_t \Sigma - \left[(\Delta_t)'\Sigma + 2r\Delta_t\right]\Lambda_t}{(\Delta_t \Sigma)^2}$$

$$d = \partial_r \gamma^{\phi\phi} = \partial_r g^{\phi\phi} - \frac{2g^{t\phi}g^{tt}(g^{t\phi})' - (g^{t\phi})^2(g^{tt})'}{(g^{tt})^2}$$

$$(g^{tt})' = -\frac{(\Lambda_t)'\Delta_t \Sigma - \left[(\Delta_t)'\Sigma + 2r\Delta_t\right]\Lambda_t}{(\Delta_t \Sigma)^2}$$

$$(g^{t\phi})' = \frac{\tilde{\omega}_{tt}\left[(\Delta_t)'\Sigma + 2r\Delta_t\right] - 2aM\Delta_t \Sigma}{(\Delta_t \Sigma)^2}$$

$$(g^{\phi\phi})' = \frac{-8a^2M^2r\Lambda_t\Delta_t \Sigma + \tilde{\omega}_{td}^2\left[(\Lambda_t)'\Delta_t \Sigma + \Lambda_t(\Delta_t)'\Sigma + 2r\Lambda_t\Delta_t\right]}{(\Lambda_t\Delta_t \Sigma)^2} + \frac{2r\Lambda_t - (\Lambda_t)'\Sigma}{\Lambda_t^2 \sin^2 \theta}$$

$$(\Lambda_t)' = 4r(r^2 + a^2) - a^2 \sin^2 \theta(\Delta_t)'$$

$$(\Delta_t(u))' = 2r\Delta_u - \frac{\partial \Delta_u}{\partial u}$$


$$\frac{\partial \Delta_u}{\partial u} = \frac{\nu(\Delta_1 + 4\Delta_4 u^3 + 3\Delta_3 u^2 + 2\Delta_2 u)\left[\frac{1}{(K\nu - 1)^2} + \frac{2u}{K\nu - 1} + u^2\chi^2\right]}{\Delta_4 u^4 + \Delta_3 u^3 + \Delta_2 u^2 + \Delta_1 u + 1}$$

$$+ \left(\frac{2}{K\nu - 1} + 2u\chi^2\right)\left[\Delta_0 \nu + \nu \log\left(\Delta_4 u^4 + \Delta_3 u^3 + \Delta_2 u^2 + \Delta_1 u + 1\right) + 1\right]$$

下午的工作就是写这个代码咯, 首先把 $(\Lambda_t)', (\Delta_t)'$ 搞定就可以全盘皆活了! 已经成功绘制出了图像!

2.12 July 10^{th}

今天的任务首先是把之前所有的内容做一个检查和汇总,虽然图像出来了,但是也并不就是说这一定是正确的了,还是需要小心地验证,上午我主要是考虑做一些理论的计算分析和整合,将整个程序以流程图的形式绘制出来。下午是再一次检查代码,然后考虑用 Runge-Kutta4(5) 法进行优化。



1. 输入两黑洞参数

输入两黑洞质量,比如 $m_1=1, m_2=0.001 \Rightarrow M:=m_1+m_2$ 。根据这个就可以得到两个非常重要的参数

$$\mu := \frac{m_1 m_2}{M} \qquad \quad \nu := \frac{\mu}{M}$$

然后输入自旋 S_1, S_2 ,但是要保证 $|S_i| < m_i$,根据自旋可以计算出 a, χ_{Kerr}

- 2. 人为指定 $\Theta_{min}, \Theta_{max}$ 指定这两个值是为了下一步利用守恒量计算 $\mathcal{H}_{eff}, \mathcal{L}$
- 3. 计算度规

$$g^{tt} = -\frac{\Lambda_t}{\Delta_t \Sigma} \qquad \checkmark$$

$$g^{rr} = \frac{\Delta_r}{\Sigma} \qquad \checkmark$$

$$g^{\theta\theta} = \frac{1}{\Sigma} \qquad \checkmark$$

$$g^{\phi\phi} = \frac{1}{\Lambda_t} \left(-\frac{\tilde{\omega}_{fd}^2}{\Delta_t \Sigma} + \frac{\Sigma}{\sin^2 \theta} \right) \qquad \checkmark$$

$$g^{t\phi} = -\frac{\tilde{\omega}_{fd}}{\Delta_t \Sigma} \qquad \checkmark$$

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{-g^{4t}}}$$

$$\beta^{i} = \frac{g^{4i}}{g^{4t}}$$

$$\gamma^{ij} = g^{ij} - \frac{g^{ii}g^{tj}}{g^{tt}}$$

$$\Sigma = r^{2} + a^{2} \cos^{2}\theta$$

$$\Delta_{t} = \varpi^{4} - a^{2}\Delta_{t} \sin^{2}\theta$$

$$D^{-1}(u) = 1 + \log(1 + 6\nu u^{2} + 2(26 - 3\nu)\nu u^{3})$$

$$\bar{\Delta}_{u}(u) = \bar{\chi}^{2}u^{2} + \frac{2u}{\nu K - 1} + \frac{1}{(\nu K - 1)^{2}}$$

$$\Delta_{u}(u) = \bar{\Delta}_{u}(u) \left[1 + \nu \Delta_{0} + \nu \log(1 + \Delta_{1}u + \Delta_{2}u^{2} + \Delta_{3}u^{3} + \Delta_{4}u^{4}) \right]$$

$$\Delta_{t}(u) = \frac{\Delta_{u}(u)}{u^{2}}$$

$$\Delta_{r}(u) = \Delta_{t}(u)D^{-1}(u)$$

$$\bar{\omega}_{fd} = 2aMr + \omega_{1}\nu \frac{aM^{3}}{r} + \omega_{2}\nu \frac{Ma^{3}}{r}$$

$$K = 1.4467 \times (1 - 4\nu)^{2} + 4(1 - 2\nu)\nu$$

$$\Delta_{0} = K(\nu K - 2)$$

$$\Delta_{1} = -2(\nu K - 1)(K + \Delta_{0})$$

$$\Delta_{2} = \frac{1}{2}\Delta_{1}(-4\nu K + \Delta_{1} + 4) - \frac{a^{2}}{M^{2}}(\nu K - 1)^{2}\Delta_{0}$$

$$\Delta_{3} = \frac{1}{3} \left[-\Delta_{1}^{3} + 3(\nu K - 1)\Delta_{1}^{2} + 3\Delta_{2}\Delta_{1} - 6(\nu K - 1) \times (-\nu K + \Delta_{2} + 1) - 3\frac{a^{2}}{M^{2}}(\nu K - 1)^{2}\Delta_{1} \right]$$

$$\Delta_{4} = \frac{1}{12} \left\{ 6\frac{a^{2}}{M^{2}}(\Delta_{1}^{2} - 2\Delta_{2})(\nu K - 1)^{2} + 3\Delta_{1}^{4} - 8(\nu K - 1)\Delta_{1}^{3} - 12\Delta_{2}\Delta_{1}^{2} + 12[2(\nu K - 1)\Delta_{2} + \Delta_{3}]\Delta_{1} + 12\left(\frac{94}{3} - \frac{41}{32}\pi^{2}\right)(\nu K - 1)^{2} + 6[\Delta_{2}^{2} - 4\Delta_{3}(\nu K - 1)] \right\}$$

4. 计算 \mathcal{L} , \mathcal{H}_{eff}

第一步需要利用我们设置的 $\Theta_{min}, \Theta_{max}$ 来计算出 $p_{\phi} = const \equiv \mathcal{L}$

$$q \equiv \partial_r \beta^{\phi} \Big|_{\theta_-}, b \equiv \partial_r \alpha \Big|_{\theta_-}, c \equiv \gamma^{\phi \phi} \Big|_{\theta_-}, d \equiv \partial_r \gamma^{\phi \phi} \Big|_{\theta_-}$$

$$\mathcal{L} = \sqrt{\frac{2b^2}{q^2 - 2b^2c - bd\alpha + \sqrt{q^4 - 2q^2bd\alpha}}} \qquad \checkmark$$

$$E \equiv \mathcal{H}_{eff} = \beta_1(\theta_-)\mathcal{L} + \alpha_1(\theta_-)\sqrt{1 + \gamma_1(\theta_-)\mathcal{L}^2} = const$$

$$= \pm \sqrt{\frac{\left(\frac{E - \beta^{\phi}(\theta)\mathcal{L}}{\alpha(\theta)}\right)^2 - \gamma^{\phi \phi}(\theta)\mathcal{L}^2 - 1}{\gamma^{\theta \theta}}} = \frac{\pm}{\alpha} \sqrt{\frac{(E - \beta L)^2 - \alpha^2(1 + \gamma^{\phi \phi}L^2)}{\gamma^{\theta \theta}}}$$

$$q \equiv \partial_r \beta^{\phi} = \frac{2aM\Lambda_t - 2aMr(\Lambda_t)'}{\Lambda_t^2} = \frac{2aM}{\Lambda_t} \left(1 - r\frac{\Lambda_t'}{\Lambda_t} \right)$$

$$b \equiv \partial_r \alpha = \frac{1}{2(-g^{tt})^{3/2}} \frac{\left[(\Delta_t)'\Sigma + 2r\Delta_t \right] \Lambda_t - (\Lambda_t)'\Delta_t \Sigma}{(\Delta_t \Sigma)^2}$$

$$d = \partial_r \gamma^{\phi\phi} = \partial_r g^{\phi\phi} - \frac{2g^{t\phi}g^{tt}(g^{t\phi})' - (g^{t\phi})^2(g^{tt})'}{(g^{tt})^2}$$

$$(g^{tt})' = \frac{\left[(\Delta_t)'\Sigma + 2r\Delta_t \right] \Lambda_t - (\Lambda_t)'\Delta_t \Sigma}{(\Delta_t \Sigma)^2}$$

$$(g^{t\phi})' = \frac{\tilde{\omega}_{\text{fd}} \left[(\Delta_t)'\Sigma + 2r\Delta_t \right] - 2aM\Delta_t \Sigma}{(\Delta_t \Sigma)^2}$$

$$(g^{\phi\phi})' = \frac{\tilde{\omega}_{\text{fd}} \left[(\Lambda_t)'\Delta_t \Sigma + \Lambda_t (\Delta_t)'\Sigma + 2r\Lambda_t \Delta_t \right] - 8a^2M^2r\Lambda_t \Delta_t \Sigma}{(\Lambda_t \Delta_t \Sigma)^2} + \frac{2r\Lambda_t - (\Lambda_t)'\Sigma}{\Lambda_t^2 \sin^2 \theta}$$

$$(\Lambda_t)' = 4r(r^2 + a^2) - a^2 \sin^2 \theta (\Delta_t)'$$

$$(\Delta_t(u))' = 2r\Delta_u - \frac{\partial \Delta_u}{\partial u}$$

$$\frac{\partial \Delta_u}{\partial u} = \frac{\nu \left(\Delta_1 + 4\Delta_4 u^3 + 3\Delta_3 u^2 + 2\Delta_2 u\right) \left[\frac{1}{(K\nu - 1)^2} + \frac{2u}{K\nu - 1} + u^2 \chi^2\right]}{\Delta_4 u^4 + \Delta_3 u^3 + \Delta_2 u^2 + \Delta_1 u + 1} + \left(\frac{2}{K\nu - 1} + 2u\chi^2\right) \left[\Delta_0 \nu + \nu \log\left(\Delta_4 u^4 + \Delta_3 u^3 + \Delta_2 u^2 + \Delta_1 u + 1\right) + 1\right]$$

5 利用哈密顿正则方程得到演化的微分方程

$$\dot{\theta} = \frac{M^2 \nu}{\mu(\mu \hat{H}_{\text{real}} + M)} \frac{\alpha \gamma^{\theta \theta} p_{\theta}}{\sqrt{1 + \gamma^{\theta \theta} p_{\theta}^2 + \gamma^{\phi \phi} \mathcal{J}^2}}$$

$$\dot{\phi} = \frac{M^2 \nu}{\mu(\mu \hat{H}_{\text{real}} + M)} \left[\beta^{\phi} + \frac{\alpha \gamma^{\phi \phi} \mathcal{J}}{\sqrt{1 + \gamma^{\theta \theta} p_{\theta}^2 + \gamma^{\phi \phi} \mathcal{J}^2}} \right]$$

可以发现这里其实完全没有涉及到导数了,本质上只要知道目前所在的位置就可以求出度规和 p_{θ} ,演化方程非常容易处理。

经过测试发现代码还是有问题,当我取 $\Theta_{min} = \Theta_{max} = \frac{\pi}{2}$ 的时候,轨道出现了之前那样的一种塌缩的现象。 我现在准备基本全用 **Mathematica** 来计算,避免出现错误,首先可以明确的是出错的大概率是在几个 对 α, β, γ 求导的时候出现的。最后得到角动量的那个根式一定是对的。下面列出 **Mathematica** 给出的结果:

$$\frac{\partial \beta^{\phi}}{\partial r} = \frac{2aM \left[a^2 \cos^2(\theta) + (a^2 - 3r^2) (a^2 + r^2) \right]}{\left[a^2 \cos^2(\theta) + (a^2 + r^2)^2 \right]^2}$$

$\textbf{2.13} \quad \textbf{July } \textbf{11}^{th}$

功夫不负有心人啊,终于是解决了问题,首先是把我的方法的所有项全都检查了一遍,发现是没有问题的,然后我开始怀疑是 K 的取值的问题,后来发现应该是没问题的。之后我改了张晨师兄的代码,发现不管是能量也好还是角动量也好,都是对得上的。那基本确定代码的前半部分是没有问题的了,那么接下去要做的就是利用微分方程进行迭代更新了,但是碰到一个问题就是**如果我直接希望利用能量守恒去计算出** p_{θ} 的话我一定会碰到开根号的问题,但是理论上在 θ 极值点的时候 p_{θ} 极其小,极其趋近于 0,对于计算机来说很有可能计算出一个很小的负数导致 NAN。因此这个方法是行不通的。最好的办法还是直接利用哈密顿正则方程去求出 p_{θ} 演化的规律。理论上:

$$p_{\theta} = \pm \frac{1}{\alpha} \sqrt{\frac{(E - \beta^{\phi} \mathcal{L})^2 - \alpha^2 (\gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^2 - 1)}{\gamma^{\theta\theta}}}$$

这种做法对于计算机而言是行不通的,本来我是希望通过定义一个 $\epsilon \ll 1$ 来判断什么时候 p_{θ} 取正号,什么时候取负号,但是这种方法必然导致轨迹是不连续的,在 Θ_{\max} , Θ_{\min} 的时候轨迹会出现非常尖锐的形状,因此这种方法会带来两个问题,一是可能出现十分小的负数无法开方,二是边界处十分难处理。想要解决这两个问题是十分困难的,因此不如不用这种方式去计算 p_{θ} ,直接采用:

$$\dot{p_{\theta}} = -\frac{M^{2}\nu}{\mu(\mu\hat{H}_{real} + M)} \left[\frac{\partial\beta^{\phi}}{\partial\theta} \mathcal{J} + \frac{\partial\alpha}{\partial\theta} \sqrt{1 + \gamma^{\theta\theta}p_{\theta}^{2} + \gamma^{\phi\phi}\mathcal{J}^{2}} + \frac{\alpha\left(\frac{\partial\gamma^{\theta\theta}}{\partial\theta}p_{\theta}^{2} + \frac{\partial\gamma^{\phi\phi}}{\partial\theta}\mathcal{J}^{2}\right)}{2\sqrt{1 + \gamma^{\theta\theta}p_{\theta}^{2} + \gamma^{\phi\phi}\mathcal{J}^{2}}} \right]$$

这里不涉及什么危险的开根号,因此是一定安全而且准确的。下面我要考虑利用 Runge-Kutta 方法进行微分方程的优化了。

2.14 July 12^{th}

我今天的任务就是完成用 RTF48 方法求解微分方程组的代码优化工作。如果这个工作能够顺利展开,那么最后的代码应该会更加简洁漂亮,之后就是需要考虑引入那些复杂的自旋量了,这应该会比较难,加油!我似乎理解错了 Runge-Kutta 方法? 定义里给的情况是:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

然后再去讨论变化 x 和 y 情况下不同的导数。但是我目前的情况是这样的:

$$\dot{p}_{\theta} = f_1(\theta, p_{\theta})$$
$$\dot{\theta} = f_2(\theta, p_{\theta})$$
$$\dot{\phi} = f_3(\theta, p_{\theta})$$

因此我认为更新应该是这样的一个过程:

$$\begin{cases} K_{p_{\theta_{1}}} = f_{1}(\theta, p_{\theta}) & K_{\theta_{1}} = f_{2}(\theta, p_{\theta}) & K_{\theta_{3}} = f_{3}(\theta, p_{\theta}) \\ K_{p_{\theta_{2}}} = f_{1}\left(\theta + \frac{h}{2}K_{\theta_{1}}, p_{\theta} + \frac{h}{2}K_{p_{\theta_{1}}}\right) & K_{\theta_{2}} = f_{2}\left(\theta + \frac{h}{2}K_{\theta_{1}}, p_{\theta} + \frac{h}{2}K_{p_{\theta_{1}}}\right) & K_{\phi_{2}} = f_{3}\left(\theta + \frac{h}{2}K_{\theta_{1}}, p_{\theta} + \frac{h}{2}K_{p_{\theta_{1}}}\right) \\ K_{p_{\theta_{3}}} = f_{1}\left(\theta + \frac{h}{2}K_{\theta_{2}}, p_{\theta} + \frac{h}{2}K_{p_{\theta_{2}}}\right) & K_{\theta_{3}} = f_{2}\left(\theta + \frac{h}{2}K_{\theta_{2}}, p_{\theta} + \frac{h}{2}K_{p_{\theta_{2}}}\right) & K_{\phi_{3}} = f_{3}\left(\theta + \frac{h}{2}K_{\theta_{2}}, p_{\theta} + \frac{h}{2}K_{p_{\theta_{2}}}\right) \\ K_{p_{\theta_{4}}} = f_{1}\left(\theta + hK_{\theta_{3}}, p_{\theta} + hK_{p_{\theta_{3}}}\right) & K_{\theta_{4}} = f_{2}\left(\theta + hK_{\theta_{3}}, p_{\theta} + hK_{p_{\theta_{3}}}\right) & K_{\phi_{4}} = f_{3}\left(\theta + hK_{\theta_{3}}, p_{\theta} + hK_{p_{\theta_{3}}}\right) \end{cases}$$

$$p_{\theta} := p_{\theta} + \frac{h}{6} (K_{p_{\theta_1}} + 2K_{p_{\theta_2}} + 2K_{p_{\theta_3}} + K_{p_{\theta_4}})$$

$$\theta := \theta + \frac{h}{6} (K_{\theta_1} + 2K_{\theta_2} + 2K_{\theta_3} + K_{\theta_4})$$

$$\phi := \phi + \frac{h}{6} (K_{\phi_1} + 2K_{\phi_2} + 2K_{\phi_3} + K_{\phi_4})$$

我用 RK4 跑了一下代码发现结果是非常精彩的,应该说比原来的 Euler Method 的结果好了非常非常多。 下面我的工作是把 RK4 再一次升级为 RKF45。算法描述如下:

Algorithm 1 RKF45

set
$$w_0 = \alpha$$

$$k_1 = hf(t_i, w_i)$$

$$k_2 = hf\left(t_i + \frac{h}{4}, w_i + \frac{k_1}{4}\right)$$

$$k_3 = hf\left(t_i + \frac{3h}{8}, w_i + \frac{3}{32}k_1 + \frac{9}{32}k_2\right)$$

$$k_4 = hf\left(t_i + \frac{12h}{13}, w_i + \frac{1932}{2197}k_1 - \frac{7200}{2197}k_2 + \frac{7296}{2197}k_3\right)$$

$$k_5 = hf\left(t_i + h, w_i + \frac{439}{216}k_1 - 8k_2 + \frac{3680}{513}k_3 - \frac{845}{4104}k_4\right)$$

$$k_6 = hf\left(t_i + \frac{h}{2}, w_i - \frac{8}{27}k_1 + 2k_2 - \frac{3546}{2565}k_3 + \frac{1859}{4104}k_4 - \frac{11}{40}k_5\right)$$

$$w_{i+1} = w_i + \frac{25}{216}k_1 + \frac{1408}{2565}k_3 + \frac{2197}{4104}k_4 - \frac{1}{5}k_5$$

$$\tilde{w}_{i+1} = w_i + \frac{16}{135}k_1 + \frac{6656}{12858}k_3 + \frac{28561}{56430}k_4 - \frac{9}{50}k_5 + \frac{2}{55}k_6$$

$$R = \frac{1}{h}|\tilde{w}_{i+1} - w_{i+1}|$$

$$\delta = 0.84\left(\frac{\epsilon}{R}\right)^{1/4}$$
if $R \le \epsilon$ then

if $R \leq \epsilon$ then

keep w as the current step solution and move to the next step with step size δh

else

recalculate the current step with step size δh

end if

上面这种应该是比较纯正的 RKF45 方法, 但是对于微分方程组而言我觉得其实并不好处理, 这个自适 应反而不是一个好现象。下面我有找到了一个比较容易处理的一种 RK45 方法。

我完成了 RK45 的代码编写, 跑出来的结果也是非常振奋人心的, 今天可以说是顺利完成了自己安排的 任务。那么阶段性地总结一下我两周以来的成果吧:第一周我花了很多时间去尝试理解,然后写了第一版本非 常错误的代码,当时没有认识到初值的取值方法,之后找到了很多条错误的途径,最终发现了错误,完成了代 码的编写。明天组会后应该要和老师交流下一步的工作是什么,是完善这个代码加上那些多余的项还是考虑 要开始计算波形了?

$\mathbf{July} \,\, \mathbf{13}^{th}$ 2.15

今天应该是我实习的第 15 天了,今天早上的目标就是能够加入那些被我忽略的项,然后尝试考虑了所有 的项之后仍然能够运行代码,现在开始尝试! 直观的感受是这实在是太难了,基本就不可能实现呀。但是我们

Algorithm 2 adaptive RK45

```
Given t_0, t_f, x_0, h_0, n_{max}, e_{min}, e_{max}, h_{min}, h_{max}
Set h = h_0, t = t_0, x_0 = x_0, k = 0
while (k < n_{max} \text{ and } t < t_f) \text{ do}
  if h > h_{max} then
    h = h_{max}
  end if
  Compute RKF4,RKF5, and e = |RKF4 - RKF5|
  if (e > e_{max} \text{ and } h > h_{min}) then
    h = h/2; (reject the step)
  else
    k = k + 1; t = t + h; x_k = RKF5
  end if
  if e < e_{min} then
    h = 2h
  end if
end while
```

$$H_{SO} = \frac{e^{2\nu - \tilde{\mu}}(e^{\tilde{\mu} + \nu} - \tilde{B})(\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r)(\boldsymbol{S} \cdot \hat{\boldsymbol{S}}_{Kerr})}{\tilde{B}^{2}\sqrt{Q}\xi^{2}} + \frac{e^{\nu - 2\tilde{\mu}}}{\tilde{B}^{2}(\sqrt{Q} + 1)\sqrt{Q}\xi^{2}} \{ (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{\xi})\tilde{\boldsymbol{J}}[\mu_{r}(\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v}r)(\sqrt{Q} + 1) - \mu_{\cos\theta}(\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{n})\xi^{2} \\ - \sqrt{Q}(\nu_{r}(\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v}r) + (\mu_{\cos\theta} - \nu_{\cos\theta})(\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{n})\xi^{2})]\tilde{B}^{2} + e^{\tilde{\mu} + \nu}(\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r)(2\sqrt{Q} + 1)[\tilde{\boldsymbol{J}}\nu_{r}(\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{v}) - \nu_{\cos\theta}(\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{n})\xi^{2}]\tilde{\boldsymbol{B}} \\ - \tilde{\boldsymbol{J}}\tilde{\boldsymbol{B}}_{r}e^{\tilde{\mu} + \nu}(\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r)(\sqrt{Q} + 1)(\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{v}) \}, \tag{4.18}$$

and

$$\begin{split} H_{\text{SS}} &= \omega(S \cdot \hat{S}_{\text{Kerr}}) + \frac{e^{-3\tilde{\mu} - \nu} \tilde{J} \omega_r}{2\tilde{B}(\sqrt{Q} + 1)\sqrt{Q} \xi^2} \{ -e^{\tilde{\mu} + \nu} (\hat{p} \cdot \boldsymbol{v}r) (\hat{p} \cdot \boldsymbol{\xi}r) (S \cdot \boldsymbol{\xi}) \tilde{B} + e^{2(\tilde{\mu} + \nu)} (\hat{p} \cdot \boldsymbol{\xi}r)^2 (S \cdot \boldsymbol{v}) \\ &+ e^{2\tilde{\mu}} (1 + \sqrt{Q}) \sqrt{Q} (S \cdot \boldsymbol{v}) \xi^2 \tilde{B}^2 + \tilde{J} (\hat{p} \cdot \boldsymbol{n}) [(\hat{p} \cdot \boldsymbol{v}r) (S \cdot \boldsymbol{n}) - \tilde{J} (\hat{p} \cdot \boldsymbol{n}) (S \cdot \boldsymbol{v})] \xi^2 \tilde{B}^2 \} \\ &+ \frac{e^{-3\tilde{\mu} - \nu} \omega_{\cos\theta}}{2\tilde{B}(\sqrt{Q} + 1)\sqrt{Q}} \{ -e^{2(\tilde{\mu} + \nu)} (\hat{p} \cdot \boldsymbol{\xi}r)^2 (S \cdot \boldsymbol{n}) + e^{\tilde{\mu} + \nu} \tilde{J} (\hat{p} \cdot \boldsymbol{n}) (\hat{p} \cdot \boldsymbol{\xi}r) (S \cdot \boldsymbol{\xi}) \tilde{B} \\ &+ [(S \cdot \boldsymbol{n}) (\hat{p} \cdot \boldsymbol{v}r)^2 - \tilde{J} (\hat{p} \cdot \boldsymbol{n}) (S \cdot \boldsymbol{v}) (\hat{p} \cdot \boldsymbol{v}r) - e^{2\tilde{\mu}} (1 + \sqrt{Q}) \sqrt{Q} (S \cdot \boldsymbol{n}) \xi^2] \tilde{B}^2 \}, \end{split} \tag{4.19}$$

尝试着拆分目标,把这一大堆的东西拆分着来看。首先熟悉明确一下物理量:

$$\begin{split} &\omega = \frac{\tilde{\omega}_{\mathrm{fd}}}{\Lambda_t} \\ &e^{2\nu} = \frac{\Delta_t \Sigma}{\Lambda_t} \\ &B_r = \frac{\sqrt{\Delta_r \Delta_t'} - 2\Delta_t}{2\sqrt{\Delta_r \Delta_t} R} \\ &\omega_r = \frac{-\Lambda_t' \tilde{\omega}_{\mathrm{fd}} + \Lambda_t \tilde{\omega}_{\mathrm{fd}}'}{\Lambda_t^2} \\ &\nu_r = \frac{r}{\Sigma} + \frac{\varpi^2 (\varpi^2 \Delta_t' - 4r \Delta_t)}{2\Lambda_t \Delta_t} \\ &\mu_r = \frac{r}{\Sigma} - \frac{1}{\sqrt{\Delta_r}} \\ &B_{\cos \theta} = 0 \\ &\omega_{\cos \theta} = -\frac{2a^2 \cos \theta \Delta_t \tilde{\omega}_{\mathrm{fd}}}{\Lambda_t^2} \\ &\nu_{\cos \theta} = \frac{a^2 \varpi^2 \cos(\varpi^2 - \Delta_t)}{\Lambda_t \Sigma} \\ &\mu_{\cos \theta} = \frac{a^2 \cos \theta}{\Sigma} \\ &\tilde{B} = BR = \sqrt{\Delta_t} \\ &\tilde{B}_r = B_r R = \frac{\sqrt{\Delta_r \Delta_t'} - 2\Delta_t}{2\sqrt{\Delta_r \Delta_t}} \\ &e^{2\tilde{\mu}} = e^{2\mu} R^2 = \Sigma \\ &\tilde{J} = JR = \sqrt{\Delta_r} \\ &Q := 1 + \frac{\Delta_r (\hat{p} \cdot n)^2}{\Sigma} + \frac{(\hat{p} \cdot \xi r)^2 \Sigma}{\Lambda_t \sin^2 \theta} + \frac{(\hat{p} \cdot vr)^2}{\Sigma \sin^2 \theta} \\ &\xi^2 = \sin^2 \theta \end{split}$$

首先思考一下如果全部处理妥当了,把这些项加进我的哈密顿里会得到什么结果呢? 首先由于角动量是我通过 $\dot{p}_r=0$ 计算出来的,因此角动量的表达式显然就变了,其次我用来更新的微分方程本质上还是通过对哈密顿量求导得到的,因此如果改变了哈密顿量那么微分方程也需要修改,不过好消息是基本碰到的方程都是线性的,除了角动量可能难以处理一些,其他的地方都只需要线性叠加上新的要处理的项即可。不过 Q_4 确实是一个非常难以处理的项,而且它本身就在根号里面。假如我先不考虑 Q_4 这一项,只考虑另外的三项的话现在碰到了几个问题如下:

$$\Delta_{\sigma}^{(1)}, \Delta_{\sigma}^{(2)}$$

的表达式实在是太过于复杂,其次是出现了一些我暂时不清楚如何处理的项:

$$a_0,b_0,\hat{m{p}}\cdotm{n},\hat{m{p}}\cdotm{\xi}r,\hat{m{p}}\cdotm{v}r,r^ir^jS_i^*S_j^*$$

那么我今天给自己定一个小目标就是说我能够理解这些式子在表达什么意思,我应该如何写代码去实现它们, 别的就先不管,今天就争取能把这些东西搞清楚,吃透。我分几个部分去考虑这个问题吧:

1. $r^i r^j S_i^* S_i^*$

由于这个量本质上是一个标量与我选择的坐标系显然是无关的,我没有必要去用球坐标系,完全可以采

用 Cartesian 坐标也就是说处理的问题变为了:

$$\left\{r,\theta,\phi\right\}\cdot\left\{S_r,S_\theta,S_\phi\right\} \Longrightarrow \left\{x,y,z\right\}\cdot\left\{S_x,S_y,S_z\right\}$$

由于我们不考虑自旋和轨道角动量方向存在夹角,也就是仅仅考虑自旋向上或者自旋向下的简单情况,那么问题就进一步简化为了:

$$\{x, y, z\} \cdot \{S_x, S_y, S_z\} \Longrightarrow \{0, 0, r \cos \theta\} \cdot \{0, 0, S\} = Sr \cos \theta$$

在进一步考虑我们要处理的式子本身:

$$r^i r^j S_i^* S_j^* = r^i S_i^* r^j S_j^* = r^2 \cos^2 \theta(S^*)^2$$

我刚才还在思考为啥不直接写成平方的形式,现在看了一下因为这本身就是描述的自旋和自旋的耦合, 其实是最微弱的一项,那么这项如何处理已经非常明了了,我把整个式子写出来就是

$$\begin{split} &-\frac{1}{2Mr^5}(r^2\delta^{ij}-3r^ir^j)S_i^*S_j^* = -\frac{1}{2Mr^5}\Big[r^2(S^*)^2 - 3r^2\cos^2\theta(S^*)^2\Big] \\ \Rightarrow \text{LHS} = &-\frac{1}{2Mr^5}\Big[(r^2-3r^2\cos^2\theta)(S^*)^2\Big] = -\frac{1}{2Mr^3}\Big[(1-3\cos^2\theta)(S^*)^2\Big] \end{split}$$

那么这个东西处理起来基本就是没有难度的了。但是看起来虽然简单,实际上还是要考虑复杂的自旋项,两个 $\Delta_{\sigma}^{(1)}$, $\Delta_{\sigma}^{(2)}$ 简直是噩梦的来源。当然了,在另一篇文献中给出的一个算式更加印证了我的计算是正确的,参考文献 35 中给出的表达式为:

$$-\frac{\mu}{2Mr^3} \Big[\delta^{ij} - 3n^i n^j \Big] S_i^* S_j^*$$

而这个结果实际上是和我之前计算的相同的。

2. Q_4

这一项我觉得非常诡异,目前找到的所有文献里都说是参考文献 11 里给了表达式,但是我看来看去没有发现,大概是因为是最原始的文章,我没有了解背景还没办法搞明白,但是我可以发现在参考文献 12 里给了 2 个 Q_4 的具体的表达式,这个放到最后去考虑,等到把更加重要的 $\Delta_{\sigma}^{(1)}, \Delta_{\sigma}^{(2)}, S_1^*, S_2^*$ 搞清楚再集中精力考虑 Q_4 。刚才和张晨师兄讨论了一下,结果却是就是在这第 12 篇参考文献中给出的,现在可以仔细查看一下。文章里给出了显式的表达式:

$$Q_4 = \frac{2}{\mu^2} (4 - 3\nu) \nu \frac{(GM)^2}{r^2 + a^2 \cos^2 \theta} (\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{p})^4$$

这里的 4 次方也就是 Q_4 的由来,当然了如果用自然单位制那分子处的 G = 1,这里留有疑问的项也只剩下了 n, p,其中 n 其实是位矢的单位矢量:

$$n^{i} \equiv \frac{x^{i}}{r} \Longrightarrow \boldsymbol{n} = \left\{ \sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta \right\}$$

当然了,文章里还定义了

$$\hat{p}_i \equiv \frac{p_i}{\mu}, \hat{u}_\rho \equiv \frac{GM}{\sqrt{\rho^2}}$$

实际上这里的 \hat{p}_i 就是我用的 p_i , 那么考虑了 Q_4 之后的 H_{NS} 就表示为:

$$H_{\rm NS} = \beta^i p_i + \alpha \sqrt{1 + \gamma^{ij} p_i p_j + 2(4 - 3\nu)\nu \hat{u}_{\rho}^2 (n^i p_i)^4 - 1}$$

这个其实并不难处理其中的内积为:

$$n^i p_i = n^r p_r + n^\theta p_\theta + n^\varphi p_\varphi$$

那对于我的圆轨道而言就是没有 $p_r = 0$ 而且 $p_\phi \equiv \mathcal{L} = \mathrm{const}$ 因此处理起来其实也很方便这一项就成了:

$$Q_4 = \frac{2(4-3\nu)\nu M^2}{r^2 + a^2\cos^2\theta} \left(n^\theta p_\theta + n^\varphi \mathcal{L}\right)^4 = \frac{2(4-3\nu)\nu M^2}{r^2 + a^2\cos^2\theta} \left(\sin\theta\sin\varphi p_\theta + \cos\theta\mathcal{L}\right)^4$$

这一项其实处理起来并没有那么困难,是可以解决的问题。

3. $\hat{\boldsymbol{p}}$, $\hat{\boldsymbol{n}}$

这两个问题其实在尝试解决 Q_4 这个问题的时候已经搞清楚了,这只是简单的一个变换:

$$\hat{p}_i \equiv rac{p_i}{\mu}$$
 $\hat{m{n}} \equiv rac{m{x}}{r}$

本质上这里定义的 $\hat{p_i}$ 就是我用的 p_i

4. ξ, v

$$oldsymbol{\xi} = \hat{oldsymbol{S}}_{ ext{ iny Kerr}} imes oldsymbol{n} \qquad oldsymbol{v} = oldsymbol{n} imes oldsymbol{\xi}$$

对于我考虑的自旋仅仅是向上或者向下的简单情况而言:

$$\boldsymbol{\xi} = \left\{0, 0, \pm 1\right\} \times \left\{\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta\right\} = \left\{\mp\sin\theta\sin\varphi, \pm\sin\theta\cos\varphi, 0\right\}$$

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{n} \times (\hat{\boldsymbol{S}}_{\text{Kerr}} \times \boldsymbol{n}) = (\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{n}) \hat{\boldsymbol{S}}_{\text{Kerr}} - (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{S}}_{\text{Kerr}}) \boldsymbol{n} = \hat{\boldsymbol{S}}_{\text{Kerr}} - \boldsymbol{n} \cos \theta = \left\{ -\sin \theta \cos \theta \cos \varphi, -\sin \theta \cos \theta \sin \varphi, \pm 1 - \cos^2 \theta \right\}$$

2.16 July 14^{th}

早上划水的时候背了单词,并且弄明白了如何给 *gfortran* 编译出来的文件命名的方式只需要用如下语法即可:

今天的任务就是能够彻底拎清楚完整的哈密顿量的计算方式,特别是搞清楚 H_{so} , H_{ss} 的具体计算方式,之后在求具体方程的时候需要做偏微分,但是老师说这个偏微分可以用差分代替没有必要老老实实地把一长串东西的偏微分都搞出来,那样会很复杂。

昨天基本上是把所有的物理量已经搞明白了,下面就可以去考虑这两个量本身了。其中还出现了

$$\hat{m{S}}_{ ext{Kerr}} \equiv rac{m{S}_{ ext{Kerr}}}{|m{S}_{ ext{Kerr}}|}$$

公式里还提到了S 那显然就是等效单体的自旋了。一眼看过去物理量基本已经清晰了。我把他们全部罗列出来:

$$\begin{split} &\omega = \frac{\tilde{\Delta}_{td}}{\Lambda_{t}} \\ &e^{2\nu} = \frac{\Delta_{t}\Sigma}{\Lambda_{t}} \\ &B_{r} = \frac{\Delta_{t}\Sigma}{2\sqrt{\Delta_{r}\Delta_{t}}R} \\ &\omega_{r} = \frac{-\Lambda_{t}'\tilde{\omega}_{td} + \Lambda_{t}\tilde{\omega}_{td}'}{\Lambda_{t}^{2}} \\ &\nu_{r} = \frac{r}{\Sigma} + \frac{\varpi^{2}(\varpi^{2}\Delta_{t}' - 4r\Delta_{t})}{2\Lambda_{t}} \\ &\nu_{r} = \frac{r}{\Sigma} - \frac{1}{\sqrt{\Delta_{r}}} \\ &B_{\cos\theta} = 0 \\ &\omega_{\cos\theta} = -\frac{2a^{2}\cos\theta\Delta_{t}\tilde{\omega}_{td}}{\Lambda_{t}^{2}} \\ &\nu_{\cos\theta} = \frac{a^{2}\varpi^{2}\cos(\varpi^{2} - \Delta_{t})}{\Lambda_{t}\Sigma} \\ &\mu_{\cos\theta} = \frac{a^{2}\cos\theta}{\Sigma} \\ &\tilde{B} = BR = \sqrt{\Delta_{t}} \\ &\tilde{B}_{r} = B_{r}R = \frac{\sqrt{\Delta_{r}\Delta_{t}'} - 2\Delta_{t}}{2\sqrt{\Delta_{r}\Delta_{t}}} \\ &e^{2\tilde{\mu}} = e^{2\mu}R^{2} = \Sigma \\ &\tilde{J} = JR = \sqrt{\Delta_{r}} \\ &Q_{:} = 1 + \frac{\Delta_{r}(\hat{p} \cdot n)^{2}}{\Sigma} + \frac{(\hat{p} \cdot \xi r)^{2}\Sigma}{\Lambda_{t}\sin^{2}\theta} + \frac{(\hat{p} \cdot vr)^{2}}{\Sigma\sin^{2}\theta} \\ &\xi^{2} = \sin^{2}\theta \\ &Q_{4} = \frac{2(4 - 3\nu)\nu M^{2}}{r^{2} + a^{2}\cos^{2}\theta} \left(n^{\theta}p_{\theta} + n^{\varphi}\mathcal{L}\right)^{4} = \frac{2(4 - 3\nu)\nu M^{2}}{r^{2} + a^{2}\cos^{2}\theta} \left(\sin\theta\sin\varphi p_{\theta} + \cos\theta\mathcal{L}\right)^{4} \\ &\hat{p}_{i} \equiv \frac{p_{i}}{\mu} \qquad \hat{n} \equiv \frac{x}{r} \\ &Just \ p_{i} \ \text{what I used} \\ &\xi = \hat{\S}_{\text{Kerr}} \times n \qquad v = n \times \xi \\ &\xi = \left\{0, 0, \pm 1\right\} \times \left\{\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta\right\} = \left\{\mp\sin\theta\sin\varphi, \pm\sin\theta\cos\varphi, 0\right\} \\ &v = n \times (\hat{\S}_{\text{Kerr}} \times n) = (n \cdot n)\hat{\S}_{\text{Kerr}} - (n \cdot \hat{\S}_{\text{Kerr}})n = \hat{\S}_{\text{Kerr}} - n\cos\theta \\ &= \left\{-\sin\theta\cos\theta\cos\varphi, -\sin\theta\cos\theta\sin\varphi, \pm 1 - \cos^{2}\theta\right\} \\ &\xi^{2} = \sin^{2}\theta \\ &\cos\theta = \hat{\S}_{\text{Kerr}} \cdot n \end{aligned}$$

看了一下公式有一个好的消息,就是那些导数我之前已经算过了,所以这次就不需要再手算了,现在的目标就只剩下把 S 搞出来了。但是我回看了一下原文发现我之前对 Q_4 的选取可能是有问题的,文章里用到的表达

式是:

$$Q_4 \propto \frac{p_{r*}^4}{r^2} (r^2 + \chi_{\text{Kerr}}^2)^4$$

好像有点对不上,没关系,我先思考S,回过头来最后思考这个问题。

$$\boldsymbol{S}^* = \frac{m_2}{m_1} \boldsymbol{S}_1 + \frac{m_1}{m_2} \boldsymbol{S}_2 + \boldsymbol{\Delta}_{\sigma^*}^{(1)} + \boldsymbol{\Delta}_{\sigma^*}^{(2)} + \boldsymbol{\Delta}_{\sigma^*}^{(3)}$$

其中

$$\Delta_{\sigma^*}^{(1)}, \Delta_{\sigma^*}^{(2)} \Longrightarrow \operatorname{Ref}[34,35]$$

$$\Delta_{\sigma^*}^{(3)} = \frac{d_{\text{SO}}\nu}{r^3} \left(\frac{m_2}{m_1} S_1 + \frac{m_1}{m_2} S_2\right)$$

$$\Delta_{\sigma^*}^{(1)} = \sigma^* \left[\frac{1}{6} \left(-4b_0 + 7\eta \right) \frac{M}{r} + \frac{1}{3} \left(2b_0 + \eta \right) \left(Q - 1 \right) - \frac{1}{2} \left(4b_0 + 5\eta \right) \frac{\Delta_r}{\Sigma} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^2 \right] + \sigma \left[-\frac{2}{3} \left(a_0 + \eta \right) \frac{M}{r} + \frac{1}{12} \left(8a_0 + 3\eta \right) \left(Q - 1 \right) - \left(2a_0 + 3\eta \right) \frac{\Delta_r}{\Sigma} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^2 \right]$$

这里再一次出现了无数的变量,提到了 σ^* ,还有一大堆的a,b,接下去就要搞明白这些是啥玩意儿。

$$oldsymbol{\sigma}^* = rac{m_2}{m_1} oldsymbol{S}_1 + rac{m_1}{m_2} oldsymbol{S}_2 \qquad oldsymbol{\sigma} = oldsymbol{S}_1 + oldsymbol{S}_2$$

这个是简单的而且显然的。公式里的其他 a_i , b_i 都是 gauge parameter,它们都是由于正则变换做映射而引入的量,但是在我读的这篇文章里提到了如果可以做到任意阶的后牛顿展开这些规范参数就没有存在的必要,但是正是因为我们做不到任意阶的展开,因此说这些参数有存在的价值,可以反映出真实的物理,但是在这篇文章里提到了,把所有的参数都设为 0,同时引入一个 4.5**PN** 项。如果把所有的规范参数都设为 0 那么会得到如下的结果:

$$\boldsymbol{\Delta}_{\sigma^*}^{(1)} = \boldsymbol{\sigma}^* \left[\frac{7}{6} \eta \frac{M}{r} + \frac{\eta}{3} (Q - 1) - \frac{5}{2} \eta \frac{\Delta_r}{\Sigma} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^2 \right] + \boldsymbol{\sigma} \left[-\frac{2}{3} \eta \frac{M}{r} + \frac{1}{4} \eta (Q - 1) - 3 \eta \frac{\Delta_r}{\Sigma} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^2 \right]$$

$$\Delta_{\sigma^*}^{(2)} = \sigma^* \left[\frac{1}{36} (353\eta - 27\eta^2) \left(\frac{M}{r} \right)^2 + 5\eta^2 \frac{\Delta_r^2}{\Sigma^2} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^4 - \frac{1}{72} (23\eta - 3\eta^2) (Q - 1)^2 + \frac{1}{36} (-103\eta + 60\eta^2) \frac{M}{r} (Q - 1) \right. \\
\left. + \frac{1}{12} (16 - 21\eta^2) \frac{\Delta_r}{\Sigma} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^2 (Q - 1) + \frac{1}{12} \left(47\eta - 54\eta^2 \right) \frac{M}{r} \frac{\Delta_r}{\Sigma} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^2 \right] + \\
\sigma \left[\frac{1}{9} \left(-56\eta - 21\eta^2 \right) \left(\frac{M}{r} \right)^2 + \frac{45}{8} \eta^2 \frac{\Delta_r^2}{\Sigma^2} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^4 - \frac{5}{16} \eta (Q - 1)^2 + \frac{1}{36} \left(-109\eta + 51\eta^2 \right) \frac{M}{r} (Q - 1) \right. \\
\left. + \frac{1}{8} \left(2\eta - 13\eta^2 \right) \frac{\Delta_r}{\Sigma} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^2 (Q - 1) + \frac{1}{24} \left(-16\eta - 147\eta^2 \right) \frac{M}{r} \frac{\Delta_r}{\Sigma} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^2 \right] \right.$$

那么这个东西就搞定了。如果我对文章里的意思没有曲解的话,把所有 gauge parameter 设为 0, 用增加的一项来弥补。但是目前萦绕在上空的还是有两个诡异的可调参数没有露出真容:

$$\Delta_{\sigma^*}^{(3)} = \frac{d_{\text{SO}} \nu}{r^3} \left(\frac{m_2}{m_1} S_1 + \frac{m_1}{m_2} S_2 \right)$$

以及

$$\frac{d_{\mathrm{SS}}\nu}{r^4}\Big(\frac{m_2}{m_1}\boldsymbol{S}_1 + \frac{m_1}{m_2}\boldsymbol{S}_2\Big)\cdot \Big(\boldsymbol{S}_1 + \boldsymbol{S}_2\Big)$$

这两个修正项中的 d_{ss}, d_{so} 一直没有找到。在下文里我找到了:

$$d_{SS} = 2.75, d_{SO} = -69.5$$

那么这样的话我们就得到了 S^*

$$oldsymbol{S}^* = oldsymbol{\sigma}^* + oldsymbol{\Delta}_{\sigma^*}^{(1)} + oldsymbol{\Delta}_{\sigma^*}^{(2)} + oldsymbol{\Delta}_{\sigma^*}^{(3)}$$

根据参考文献 34,在这篇文献中既出现了 S 又出现了 S^* 而且在包含自旋的哈密顿量中出现的明确是 S,我猜测实际上的关系是:

$$oldsymbol{S}^* = rac{M}{\mu} oldsymbol{S}$$

由于原文中考虑的是试验例子,本身就可以理解为 $m \ll M$ 那么:

$$oldsymbol{S}^* = rac{M}{\mu} oldsymbol{S} = rac{M}{rac{mM}{m+M}} oldsymbol{S} pprox rac{M}{m} oldsymbol{S}$$

这么看来我猜测的关系应当是正确的。综上所述我把这一部分的关系全部列出来:

$$\begin{split} & \boldsymbol{\Delta}_{\sigma^*}^{(1)} = \boldsymbol{\sigma}^* \left[\frac{7}{6} \eta \frac{M}{r} + \frac{\eta}{3} (Q - 1) - \frac{5}{2} \eta \frac{\Delta_r}{\Sigma} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^2 \right] + \boldsymbol{\sigma} \left[- \frac{2}{3} \eta \frac{M}{r} + \frac{1}{4} \eta (Q - 1) - 3 \eta \frac{\Delta_r}{\Sigma} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^2 \right] \\ & \boldsymbol{\Delta}_{\sigma^*}^{(2)} = \\ & \boldsymbol{\sigma}^* \left[\frac{1}{36} (353\eta - 27\eta^2) \left(\frac{M}{r} \right)^2 + 5 \eta^2 \frac{\Delta_r^2}{\Sigma^2} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^4 - \frac{1}{72} (23\eta - 3\eta^2) (Q - 1)^2 + \frac{1}{36} (-103\eta + 60\eta^2) \frac{M}{r} (Q - 1) \right. \\ & + \frac{1}{12} (16 - 21\eta^2) \frac{\Delta_r}{\Sigma} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^2 (Q - 1) + \frac{1}{12} \left(47\eta - 54\eta^2 \right) \frac{M}{r} \frac{\Delta_r}{\Sigma} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^2 \right] + \\ & \boldsymbol{\sigma} \left[\frac{1}{9} \left(-56\eta - 21\eta^2 \right) \left(\frac{M}{r} \right)^2 + \frac{45}{8} \eta^2 \frac{\Delta_r^2}{\Sigma^2} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^4 - \frac{5}{16} \eta (Q - 1)^2 + \frac{1}{36} \left(-109\eta + 51\eta^2 \right) \frac{M}{r} (Q - 1) \right. \\ & + \frac{1}{8} \left(2\eta - 13\eta^2 \right) \frac{\Delta_r}{\Sigma} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^2 (Q - 1) + \frac{1}{24} \left(-16\eta - 147\eta^2 \right) \frac{M}{r} \frac{\Delta_r}{\Sigma} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^2 \right] \\ & \boldsymbol{\Delta}_{\sigma^*}^{(3)} = \frac{d_{so}\nu}{r^3} \left(\frac{m_2}{m_1} \boldsymbol{S}_1 + \frac{m_1}{m_2} \boldsymbol{S}_2 \right) \qquad d_{ss} = 2.75, d_{so} = -69.5 \\ & \boldsymbol{\sigma}^* = \frac{m_2}{m_1} \boldsymbol{S}_1 + \frac{m_1}{m_2} \boldsymbol{S}_2 \qquad \boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{S}_1 + \boldsymbol{S}_2 \\ & \boldsymbol{S}^* = \boldsymbol{\sigma}^* + \boldsymbol{\Delta}_{\sigma^*}^{(1)} + \boldsymbol{\Delta}_{\sigma^*}^{(2)} + \boldsymbol{\Delta}_{\sigma^*}^{(3)} \\ & \boldsymbol{S}^* = \frac{M}{\mu} \boldsymbol{S} = \frac{M}{m+M} \boldsymbol{S} \approx \frac{M}{m} \boldsymbol{S} \\ & \boldsymbol{S} = \frac{\mu}{M} \boldsymbol{S}^* \end{aligned}$$

$$\begin{split} H_{\mathrm{SO}} = & \frac{e^{2\nu - \tilde{\mu}} \left(e^{\tilde{\mu} + \nu} - \tilde{B} \right) (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r) \left(\boldsymbol{S} \cdot \hat{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{Kerr}} \right)}{\tilde{B}^{2} \sqrt{Q} \xi^{2}} + \frac{e^{\nu - 2\tilde{\mu}}}{\tilde{B}^{2} (\sqrt{Q} + 1) \sqrt{Q} \xi^{2}} \left\{ (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{\xi}) \tilde{\boldsymbol{J}} \left[\mu_{r} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v}r) (\sqrt{Q} + 1) - \mu_{\cos \theta} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{n}) \xi^{2} \right. \right. \\ & \left. - \sqrt{Q} \left(\nu_{r} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v}r) + (\mu_{\cos \theta} - \nu_{\cos \theta}) (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{n}) \xi^{2} \right) \right] \tilde{B}^{2} + e^{\tilde{\mu} + \nu} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r) (2\sqrt{Q} + 1) \left[\tilde{J} \nu_{r} (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{v}) - \nu_{\cos \theta} (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{n}) \xi^{2} \right] \tilde{B} \\ & \left. - \tilde{J} \tilde{B}_{r} e^{\tilde{\mu} + \nu} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r) (\sqrt{Q} + 1) (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{v}) \right\} \\ H_{\mathrm{SS}} = & \omega \left(\boldsymbol{S} \cdot \hat{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{Kerr}} \right) + \frac{e^{-3\tilde{\mu} - \nu} \tilde{J} \omega_{r}}{2\tilde{B} (\sqrt{Q} + 1) \sqrt{Q} \xi^{2}} \left\{ -e^{\tilde{\mu} + \nu} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v}r) (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r) (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{\xi}) \tilde{B} + e^{2(\tilde{\mu} + \nu)} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r)^{2} (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{v}) \right. \\ & \left. + e^{2\tilde{\mu}} (1 + \sqrt{Q}) \sqrt{Q} (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{v}) \xi^{2} \tilde{B}^{2} + \tilde{J} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{n}) [(\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v}r) (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{n}) - \tilde{J} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{n}) (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{v})] \xi^{2} \tilde{B}^{2} \right\} \\ & \left. + \frac{e^{-3\tilde{\mu} - \nu} \omega_{\cos \theta}}{2\tilde{B} (\sqrt{Q} + 1) \sqrt{Q}} \left\{ -e^{2(\tilde{\mu} + \nu)} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r)^{2} (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{n}) + e^{\tilde{\mu} + \nu} \tilde{J} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{n}) (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r) (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{\xi}) \tilde{B} \right. \\ & \left. + \left[(\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{n}) (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v}r)^{2} - \tilde{J} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{n}) (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{v}) (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v}r) - e^{2\tilde{\mu}} (1 + \sqrt{Q}) \sqrt{Q} (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{n}) \xi^{2} \right] \tilde{B}^{2} \right\} \end{split}$$

那么现在的话,思路就很清晰了,通过上面的所有关系就可以把 S 给整出来,一旦把 S 整出来就就可以代入 H_{SO} , H_{SS} 之中了。那么这个问题在理论上基本是解决了。下面主要思考 Q_4 具体的表达式应该如何取。我又看了一下文献 12,发现之前对于文献 12 的理解有些差异。 Q_4 本身的形式应该写为:

$$Q_4 = \mu^2 2(4 - 3\nu)\nu \frac{(\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{p})^4}{r^2 + a^2 \cos^2 \theta}$$

代入 H_{NS} 的表达式,用我的形式就应该写为:

$$\frac{H_{\text{NS}}}{\mu} = \beta^{i} p_{i} + \alpha \sqrt{1 + \gamma^{ij} p_{i} p_{j} + \frac{2(4 - 3\nu)\nu}{r^{2} + a^{2} \cos^{2} \theta} (n^{i} p_{i})^{4}}$$

其实我可以去考虑为了之后代码的通用性让 r 也去演化,我应该可以做到让所有的参数都在演化,但是由于我的限制条件的存在让它们保持不变,这个目标我要作为下一阶段的阶段目标来实现。我的目标是在一周内能够完成**考虑完整哈密顿量的全参数演化圆轨道代码编写**。现在的目标是检查一遍我的参数是否正确,以及我的理解是否正确,同时有没有遗漏什么关键信息。最主要的问题在于我不确定每篇文章用的物理量定义是否相同。我处理的是约化的位矢和动量但是文献 34,35 中好像并不是这么处理的。

在文献 35 中的 r 其实就是我的文章中的 R, 那么其实他的文章里的

$$\frac{M}{r} \Longrightarrow \frac{1}{r} = u$$

现在可以确定文献 34 里的 r 也是我的文章里的 R。但是我之前用的度规呢?这个问题我没有考虑到,既然我现在发现了这两篇文章里出现的 r 都是我的文章里的 R 那度规那些分量是怎么回事呢?我先从度规的分量开始检查,度规的分量本身是不包含 r 的,但是那些 potential 是包含 r 的。

首先明确一点,两个地方的 u 是一样的,r 确实是不一样的,我可以以 u 作为基准来判断是不是出问题了。那么

$$\bar{\Delta}_u(u)$$
 $\Delta_u(u)$ 相同

而这就导致了文献 34 和我的这篇文章里用的 Δ_t 不同。我的写的是

$$\underbrace{\Delta_t = \frac{1}{u^2} \Delta_u(u)}_{\text{我的}} \qquad \underbrace{\Delta_t = r^2 \Delta_u(u)}_{\text{文献 34}}$$

这里的话文献 34 用我的语言翻译过来应该是:

$$\Delta_t(u) = R^2 \Delta_u(u)$$

我确定了之前碰到的情况是有问题的,除了我用的这篇文献之外,其他文献中的r 都是代指我的文献中的R,而其他文献中会用 \hat{p} 指代我的p,我看了文献25 之后更加坚定了这个想法,明天要把这个错误带来的问题给修正并且开始码代码,因为已经明确了除了这篇文章之外其他的都是R!

$\textbf{2.17} \quad \textbf{July 15}^{th}$

今天早上就准备留在宾馆办公了,给自己分配一下任务,九点钟到九点四十听韩老师的讲座,然后今天剩余的时间分成两部分,第一部分用来修改之前的推导过程和之前的计算代码,第二部分就是加上剩余的几个部分的。

首先由于度规本身的形式不牵扯到 r,R 的问题,因此我只需要修改 potential 就可以做到修改度规的目的,其次我给出的微分方程恰好是用了各项展开的形式,因此也不会受到太大的影响,只需要修改少数参数即可。

$$\Sigma = R^2 + a^2 \cos^2 \theta$$
$$\varpi^2 = R^2 + a^2$$

由于两种文献中对于u的定义本质上是相同的:

$$u_1 \equiv \frac{1}{r} = \frac{M}{R} \equiv u_2$$

因此仅仅涉及到 u 的 Δ_u , $\bar{\Delta}_u$ 其实仍然是一样的。但是这样的话,按照文献 34 中的定义就会发现 Δ_t 是发生了本质上的变化的,文献 34 给出的

$$\Delta_t = R^2 \Delta_u(u)$$

因为我的所有度规都是按照文献 34 来的, 我理应取文献 34 的形式。因此:

$$\Lambda_t = \varpi^4 - a^2 \Delta_t \sin^2 \theta$$
 $\Delta_r(u) = \Delta_t D^{-1}(u)$

也需要作出相应的修正。以及

$$ilde{\omega}_{ ext{fd}} = 2aMR + \omega_{1 ext{fd}}
u rac{aM^3}{R} + \omega_{2 ext{fd}}
u rac{Ma^3}{R}$$

如果要改写成我熟悉的形式就应该是:

$$\Sigma = R^{2} + a^{2} \cos^{2} \theta = M^{2} r^{2} + a^{2} \cos^{2} \theta$$

$$\varpi^{2} = R^{2} + a^{2} = M^{2} r^{2} + a^{2}$$

$$\Delta_{t} = R^{2} \Delta_{u}(u) = M^{2} r^{2} \Delta_{u}(u)$$

$$\tilde{\omega}_{\text{fd}} = 2aM^{2} r + \omega_{1\text{fd}} \nu \frac{aM^{2}}{r} + \omega_{2\text{fd}} \nu \frac{a^{3}}{r}$$

我反思了一下我的代码,其实我给的初值里 $r = 8. \times M$ 本质上已经是其他文献中的 R 了,所以我的度规以及那些势函数其实是不需要改变的。我需要考虑的有以下几点检查其他部分的 u,r 问题,以及思考最后求导的时候观察一下两个式子:

$$\frac{dr}{d\hat{t}} = \frac{dr}{dt/M} = \frac{dR}{dt} \Longrightarrow$$
 这个式子不受到影响

$$\frac{dp}{d\hat{t}} = -\frac{\partial H}{\partial r} \Longrightarrow \frac{dp}{dt/M} = -\frac{\partial H}{\partial R/M} \Longrightarrow \frac{dp}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial R}$$

所以我的一系列的求导不需要改变,因为本来就是针对 R 求导。除了有一处我是利用了对 u 本身求导更加方便需要在原来的式子上乘上一个 M 以外,其他程序都不需要修改。主要还是误打误撞吧,之前没有留意,以为自己是对 \hat{r} 求导的,其实我程序里所有的 r 都是 R=Mr。那么我下面就要开始要按照文献 34,35 往程序中添加由于自旋带来的项的影响了。为了方便,我再一次把所有即将用到的项都放到这里来,并且做出一些修正,由于昨天对于 r,R 的认识还不到位。

注意: 这里所有的 r 都是我代码中的 R 并非我参考的文献中的 r, 这么做是为了和其他文献能够对应起来不产生混淆。

$$\begin{split} &\omega = \frac{\hat{\omega}_{\mathrm{Id}}}{\Lambda_{t}} & \\ &e^{2\nu} = \frac{\Delta_{t} \Sigma}{\Lambda_{t}} \\ &B_{r} = \frac{\sqrt{\Delta_{t}} \Delta_{t}' - 2\Delta_{t}}{2\sqrt{\Delta_{r}} \Delta_{t} R} \\ &\omega_{r} = \frac{-\Lambda_{t}' \hat{\omega}_{\mathrm{Id}} + \Lambda_{t} \hat{\omega}_{\mathrm{Id}}'}{\Lambda_{t}^{2}} & \\ &\omega_{r} = \frac{\hat{r}}{\Sigma} + \frac{\varpi^{2} (\varpi^{2} \Delta_{t}' - 4r\Delta_{t})}{2\Lambda_{t} \Delta_{t}} \\ &\nu_{r} = \frac{r}{\Sigma} + \frac{1}{\sqrt{\Delta_{r}}} & \\ &\mu_{r} = \frac{r}{\Sigma} - \frac{1}{\sqrt{\Delta_{r}}} & \\ &B_{\cos \theta} = 0 & \\ &\omega_{\cos \theta} = -\frac{2a^{2} \cos \theta \Delta_{t} \hat{\omega}_{\mathrm{Id}}}{\Lambda_{t}^{2}} & \\ &\nu_{\cos \theta} = \frac{a^{2} \cos \theta (\varpi^{2} - \Delta_{t})}{\Lambda_{t}^{2}} & \\ &\mu_{\cos \theta} = \frac{a^{2} \cos \theta (\varpi^{2} - \Delta_{t})}{\Lambda_{t}^{2}} & \\ &\hat{B}_{r} = B_{R} = \sqrt{\Delta_{r}} & \\ &\hat{B}_{r} = B_{R} R = \frac{\sqrt{\Delta_{r}} \Delta_{t}' - 2\Delta_{t}}{2\sqrt{\Delta_{r}} \Delta_{t}} & \\ &\hat{B}_{r} = B_{r} R = \frac{\sqrt{\Delta_{r}} \Delta_{t}' - 2\Delta_{t}}{2\sqrt{\Delta_{r}} \Delta_{t}} & \\ &e^{2\hat{\mu}} = e^{2\mu} R^{2} = \Sigma & \\ &\hat{J} = JR = \sqrt{\Delta_{r}} & \\ &Q_{:} = 1 + \frac{\Delta_{r} (\hat{p} \cdot n)^{2}}{\Sigma} + \frac{(\hat{p} \cdot \xi_{r})^{2} \Sigma}{\Lambda_{t} \sin^{2} \theta} + \frac{(\hat{p} \cdot vr)^{2}}{\Sigma \sin^{2} \theta} & \\ &\xi^{2} = \sin^{2} \theta & \\ &Q_{4} = \frac{2(4 - 3\nu)\nu M^{2}}{r^{2} + a^{2} \cos^{2} \theta} \left(p_{r}^{4}\right) & \\ &\hat{p}_{i} \equiv \frac{p_{i}}{\mu} & \hat{n} \equiv \frac{x}{r} & \\ &Just \ p_{i} \ \text{what I used} & \\ &\xi = \hat{S}_{\text{Kerr}} \times n & v = n \times \xi & \\ &\xi = \left\{0, 0, \pm 1\right\} \times \left\{\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta\right\} = \left\{\mp \sin \theta \sin \varphi, \pm \sin \theta \cos \varphi, 0\right\} \\ &v = n \times (\hat{S}_{\text{Kerr}} \times n) = (n \cdot n) \hat{S}_{\text{Kerr}} - (n \cdot \hat{S}_{\text{Kerr}}) n = \hat{S}_{\text{Kerr}} - n \cos \theta \\ &= \left\{-\sin \theta \cos \theta \cos \varphi, -\sin \theta \cos \theta \sin \varphi, \pm 1 - \cos^{2} \theta\right\} \\ &\xi^{2} = \sin^{2} \theta & \\ &\cos \theta = \hat{S}_{\text{Kerr}} \cdot n & \end{aligned}$$

$$\begin{split} & \boldsymbol{\Delta}_{\sigma^*}^{(1)} = \boldsymbol{\sigma}^* \left[\frac{7}{6} \eta \frac{M}{r} + \frac{\eta}{3} (Q-1) - \frac{5}{2} \eta \frac{\Delta_r}{\Sigma} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^2 \right] + \boldsymbol{\sigma} \left[-\frac{2}{3} \eta \frac{M}{r} + \frac{1}{4} \eta (Q-1) - 3 \eta \frac{\Delta_r}{\Sigma} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^2 \right] \\ & \boldsymbol{\Delta}_{\sigma^*}^{(2)} = \\ & \boldsymbol{\sigma}^* \left[\frac{1}{36} (353\eta - 27\eta^2) \left(\frac{M}{r} \right)^2 + 5 \eta^2 \frac{\Delta_r^2}{\Sigma^2} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^4 - \frac{1}{72} (23\eta + 3\eta^2) (Q-1)^2 + \frac{1}{36} (-103\eta + 60\eta^2) \frac{M}{r} (Q-1) \right. \\ & + \frac{1}{12} (16\eta - 21\eta^2) \frac{\Delta_r}{\Sigma} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^2 (Q-1) + \frac{1}{12} \left(47\eta - 54\eta^2 \right) \frac{M}{r} \frac{\Delta_r}{\Sigma} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^2 \right] + \\ & \boldsymbol{\sigma} \left[\frac{1}{9} \left(-56\eta - 21\eta^2 \right) \left(\frac{M}{r} \right)^2 + \frac{45}{8} \eta^2 \frac{\Delta_r^2}{\Sigma^2} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^4 - \frac{5}{16} \eta (Q-1)^2 + \frac{1}{36} \left(-109\eta + 51\eta^2 \right) \frac{M}{r} (Q-1) \right. \\ & + \frac{1}{8} \left(2\eta - 13\eta^2 \right) \frac{\Delta_r}{\Sigma} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^2 (Q-1) + \frac{1}{24} \left(-16\eta - 147\eta^2 \right) \frac{M}{r} \frac{\Delta_r}{\Sigma} (\boldsymbol{n} \cdot \hat{\boldsymbol{p}})^2 \right] \\ & \boldsymbol{\Delta}_{\sigma^*}^{(3)} = \frac{d_{so} \nu}{r^3} \left(\frac{m_2}{m_1} S_1 + \frac{m_1}{m_2} S_2 \right) \qquad d_{ss} = 2.75, d_{so} = -69.5 \qquad \qquad \text{这个公式是从原始文献里拿来的,因此 } r = \frac{R}{M} \\ & \boldsymbol{\sigma}^* = \frac{m_2}{m_1} S_1 + \frac{m_1}{m_2} S_2 \qquad \boldsymbol{\sigma} = S_1 + S_2 \\ & \boldsymbol{S}^* = \boldsymbol{\sigma}^* + \boldsymbol{\Delta}_{\sigma^*}^{(1)} + \boldsymbol{\Delta}_{\sigma^*}^{(2)} + \boldsymbol{\Delta}_{\sigma^*}^{(3)} \\ & \boldsymbol{S}^* = \frac{M}{m} \boldsymbol{S} = \frac{M}{m} \boldsymbol{S} \approx \frac{M}{m} \boldsymbol{S} \\ & \boldsymbol{S} = \frac{\mu}{M} \boldsymbol{S}^* \end{aligned}$$

$$\begin{split} H_{\mathrm{SO}} = & \frac{e^{2\nu - \tilde{\mu}} \left(e^{\tilde{\mu} + \nu} - \tilde{B} \right) (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r) \left(\boldsymbol{S} \cdot \hat{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{Kerr}} \right)}{\tilde{B}^{2} \sqrt{Q} \xi^{2}} + \frac{e^{\nu - 2\tilde{\mu}}}{\tilde{B}^{2} (\sqrt{Q} + 1) \sqrt{Q} \xi^{2}} \left\{ (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{\xi}) \tilde{\boldsymbol{J}} \left[\mu_{r} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v}r) (\sqrt{Q} + 1) - \mu_{\cos \theta} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{n}) \xi^{2} \right. \right. \\ & \left. - \sqrt{Q} \left(\nu_{r} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v}r) + (\mu_{\cos \theta} - \nu_{\cos \theta}) (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{n}) \xi^{2} \right) \right] \tilde{B}^{2} + e^{\tilde{\mu} + \nu} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r) (2\sqrt{Q} + 1) \left[\tilde{J} \nu_{r} (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{v}) - \nu_{\cos \theta} (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{n}) \xi^{2} \right] \tilde{B} \\ & \left. - \tilde{J} \tilde{B}_{r} e^{\tilde{\mu} + \nu} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r) (\sqrt{Q} + 1) (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{v}) \right\} \\ H_{\mathrm{SS}} = & \omega \left(\boldsymbol{S} \cdot \hat{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{Kerr}} \right) + \frac{e^{-3\tilde{\mu} - \nu} \tilde{J} \omega_{r}}{2\tilde{B} (\sqrt{Q} + 1) \sqrt{Q} \xi^{2}} \left\{ - e^{\tilde{\mu} + \nu} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v}r) (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r) (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{\xi}) \tilde{B} + e^{2(\tilde{\mu} + \nu)} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r)^{2} (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{v}) \right. \\ & \left. + e^{2\tilde{\mu}} (1 + \sqrt{Q}) \sqrt{Q} (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{v}) \xi^{2} \tilde{B}^{2} + \tilde{J} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{n}) [(\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v}r) (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{n}) - \tilde{J} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{n}) (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{v})] \xi^{2} \tilde{B}^{2} \right\} \\ & \left. + \frac{e^{-3\tilde{\mu} - \nu} \omega_{\cos \theta}}{2\tilde{B} (\sqrt{Q} + 1) \sqrt{Q}} \left\{ - e^{2(\tilde{\mu} + \nu)} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r)^{2} (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{n}) + e^{\tilde{\mu} + \nu} \tilde{J} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{n}) (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r) (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{\xi}) \tilde{B} \right. \\ & \left. + \left[(\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{n}) (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v}r)^{2} - \tilde{J} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{n}) (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{v}) (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v}r) - e^{2\tilde{\mu}} (1 + \sqrt{Q}) \sqrt{Q} (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{n}) \xi^{2} \right] \tilde{B}^{2} \right\} \end{split}$$

为了方便代码编写,我首先脑子保持清晰,我先把几个矢量给定义清楚了:

$$\hat{p_i} = p_i \Longrightarrow$$
 就是我用的 p $\hat{m{n}} \Longrightarrow m{\pi}$ 向矢量 $m{\xi} = \hat{m{S}}_{ ext{Kerr}} imes m{n} \qquad |m{\xi}| = \sin heta$ $m{v} = m{n} imes m{\xi}$

现在我已经根据我的理解将所有的量都敲进了代码里,但是其实有几个原因导致代码方便了很多,第一是通

过引入了另一项的自旋修正项 $\Delta_{\sigma^*}^3$ 使得 $\Delta_{\sigma^*}^1$, 中的所有的规范参数均为 0,大大简化了计算。其次是由于我们假设自旋的方向仅仅是限制在 +z/-z 方向也就是说自旋矢量仅仅为:

$$\boldsymbol{S} = \left\{0, 0, S_z\right\}$$

大大简化了计算。另一方面,由于 $\boldsymbol{\xi}$ 本身是和 \boldsymbol{S} 垂直的,那么它们的点乘就是 0,因此最终关于 $\boldsymbol{\xi}\cdot\boldsymbol{S}$ 的项全部为 0,也简化了计算。

既然已经将所有的项全都考虑进去了,下一步应该考虑如下问题:

- 1. 如何计算出角动量—— p_r 计算是否变困难了?
- 2. 微分方程是否变复杂了?
- 3. 考虑让 r 也进行演化

首先通过我粗略的计算,求解角动量的难度应该没有太大改变,我迫切需要确认的是 Q_4 ,自旋项的参数中的 r_{\circ}

在思考的过程中,我发现我之前弄错了一个地方,我居然认为: $(r\sin\theta\cos\phi, r\sin\theta\sin\phi, r\cos\theta)$ 是球坐标,这显然是不对的! 这就是直角坐标! 如果用球坐标写的话就是:

$$(r,0,0) \Longrightarrow \boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{n} = p_r$$

由于这个点乘就是个数,在坐标系的变换下结果是不变的,我完全可以按需而求,处理自旋的时候我就用直角 坐标系令自旋在 z 方向,但是处理动量的时候我就用球坐标。我之前对于这些矢量的分析有错误,应该是这样的:

$$egin{align} \hat{m{n}} &= rac{|m{x}|}{r} = \hat{m{e}}_r \ m{\xi} &= \hat{m{e}}_z imes \hat{m{n}} = \sin heta \hat{m{e}}_\phi \ m{v} &= \hat{m{n}} imes m{\xi} = \hat{m{e}}_r imes \sin heta \hat{m{e}}_\phi = -\sin heta \hat{m{e}}_ heta \end{aligned}$$

按照这个逻辑就有:

$$egin{align} oldsymbol{p} \cdot (\hat{oldsymbol{e}}_r, r\hat{oldsymbol{e}}_{ heta}, r\sin heta \hat{oldsymbol{e}}_{\phi}) &= (p_r, p_{ heta}, p_{\phi}) \ oldsymbol{p} \cdot \hat{oldsymbol{n}} &= p_r \ oldsymbol{p} \cdot oldsymbol{\xi} r = p_{\phi} \ oldsymbol{p} \cdot oldsymbol{v} r = -\sin heta p_{ heta} \ oldsymbol{p} \cdot oldsymbol{v} r = \sin heta p_{ heta} \ oldsymbol{e} \cdot oldsymbol{v} r = -\sin heta p_{ heta} \ oldsymbol{e} \cdot oldsymbol{v} r = -\sin heta p_{ heta} \ oldsymbol{e} \cdot oldsymbol{v} r = -\sin heta p_{ heta} \ oldsymbol{e} \cdot oldsymbol{v} r = -\sin heta p_{ heta} \ oldsymbol{e} \cdot oldsymbol{v} r = -\sin heta p_{ heta} \ oldsymbol{e} \cdot oldsymbol{v} r = -\sin heta p_{ heta} \ oldsymbol{e} \cdot oldsymbol{e} \cdot$$

下面我根据这个关系去改正代码。虽然这样是可行的,但是代码显然还不够通用,没有泛化到任意自旋方向的情况。

现在我主要碰到的是这样几个问题:

- 1. 文献之间的 Δ_t 的选择是不是真的有差异?
- 2. 对于 Q_4 的选取我做的是否合理?
- 3. 对于第三个自旋项我取的是否合理?

我不管到底谁是谁,但是我可以通过量纲分析的方法来判断我自己的式子是否自洽,我现在无论是 a 还是 r 都是带有 M 的,可以通过观察约化哈密顿量的式子来得知这个式子应该是没有量纲的,也可以观察根号内部来判断 Q_4 应当无量纲!而且原文的最后一项自旋自旋作用给出的是错误的,我的推导是正确的。

2.18 July 16^{th}

今天的任务分为以下几块,第一是检查一下理论部分有没有什么漏洞,第二是检查一下代码是否有抄错,或者公式有没有抄错,第三部分就是开始理论推导那些导数,考虑如何使用差分去计算。

首先我发现了我的公式里有一个地方抄错了,第二是明确了文中给出的第(6) 式是错误的,因为这一项是直接加到哈密顿量上的,因此应该是一个无量纲数,但是文中给出的形式显然不对,分母处应当是 R 而非 r。

现在已经将公式和代码都检查了一遍了,下面就将进行理论的导数计算,并且考虑差分方法的运用。第一步我仍然需要求出轨道角动量 p_{ϕ} ,因此我仍然采用之前的方法,需要利用 $p_r = 0$ 这一个重要的条件。在此之前我需要罗列出完整的哈密顿量:

$$\frac{H_{\text{eff}}}{\mu} = \beta^{\phi} \mathcal{L} + \alpha \sqrt{1 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^2 + \mathcal{Q}_4} + \frac{H_{\text{SO}}}{\mu} + \frac{H_{\text{SS}}}{\mu} + \frac{d_{\text{SS}} \nu}{R^4} \left(\frac{m_2}{m_1} \mathbf{S}_1 + \frac{m_1}{m_2} \mathbf{S}_2 \right) \cdot (\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2) - \frac{1}{2MR^3} (1 - 3\cos^2\theta) (S*)^2$$

这里我用的不是约化的位矢,而是 R=Mr,而且根号下也省略了两项,由于圆轨道省略 p_r ,由于计算的位置 一定是 $\Theta_{\max/\min}$ 因此省略 p_{θ} 。

$$\frac{\partial}{\partial R} \left(\frac{H_{\text{eff}}}{\mu} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial R} \left(\frac{H_{\text{eff}}}{\mu} \right) = \frac{\partial \beta^{\phi}}{\partial R} \mathcal{L} + \frac{\partial \alpha}{\partial R} \sqrt{1 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^2 + \mathcal{Q}_4} + \frac{\alpha \left(\frac{\partial \gamma^{\phi\phi}}{\partial R} \mathcal{L}^2 + \frac{\partial \mathcal{Q}_4}{\partial R} \right)}{2\sqrt{1 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^2 + \mathcal{Q}_4}} + \frac{\partial}{\partial R} \left(\frac{H_{\text{SO}}}{\mu} + \frac{H_{\text{SS}}}{\mu} \right) - \frac{4d_{\text{SS}} \nu}{R^5} \left(\frac{m_2}{m_1} \mathbf{S}_1 + \frac{m_1}{m_2} \mathbf{S}_2 \right) (\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2) + \frac{3}{2MR^4} (1 - 3\cos^2\theta) (S*)^2 - \frac{2S^*}{MR^3} (1 - 3\cos^2\theta) \frac{\partial S^*}{\partial R} = 0$$

这里面其实新加进来的几项并没有造成太大干扰,而且由于圆轨道 $Q_4 \propto (p_r)^4 = 0$,也可以不考虑最后的结果就是:

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial R} \left(\frac{H_{\text{eff}}}{\mu} \right) = \frac{\partial \beta^{\phi}}{\partial R} \mathcal{L} + \frac{\partial \alpha}{\partial R} \sqrt{1 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^{2}} + \frac{\alpha \frac{\partial \gamma^{\phi\phi}}{\partial R} \mathcal{L}^{2}}{2\sqrt{1 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^{2}}} + \frac{\partial}{\partial R} \left(\frac{H_{\text{SO}}}{\mu} + \frac{H_{\text{SS}}}{\mu} \right) - \frac{4d_{\text{SS}} \nu}{R^{5}} \left(\frac{m_{2}}{m_{1}} \mathbf{S}_{1} + \frac{m_{1}}{m_{2}} \mathbf{S}_{2} \right) (\mathbf{S}_{1} + \mathbf{S}_{2}) + \frac{3}{2MR^{4}} (1 - 3\cos^{2}\theta)(S^{*})^{2} - \frac{2S^{*}}{MR^{3}} (1 - 3\cos^{2}\theta) \frac{\partial S^{*}}{\partial R} = 0$$

这里的话由于涉及到 H_{so} , H_{ss} , S^* 的导数实在是太过于繁杂,我准备采用数值差分去计算。我先定义一些量放到 **Mathetmatica** 里去计算一下最后的角动量表达式:

$$\frac{\partial \beta^{\phi}}{\partial R} = w \qquad \frac{\partial \alpha}{\partial R} = b \qquad \gamma^{\phi\phi} = c \qquad \frac{\partial \gamma^{\phi\phi}}{\partial R} = d \qquad \frac{\partial}{\partial R} \left(\frac{H_{\text{SO}}}{\mu} + \frac{H_{\text{SS}}}{\mu} \right) = e$$

$$\frac{4d_{\text{SS}}\nu}{R^5} \left(\frac{m_2}{m_1} \mathbf{S}_1 + \frac{m_1}{m_2} \mathbf{S}_2 \right) (\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2) = f \qquad \frac{3}{2MR^4} (1 - 3\cos^2\theta) (S^*)^2 = h \qquad \frac{2S^*}{MR^3} (1 - 3\cos^2\theta) \frac{\partial S^*}{\partial R} = j$$
 我将方程简化为了

$$w\mathcal{L} + b\sqrt{1 + c\mathcal{L}^2} + \frac{\alpha d\mathcal{L}^2}{2\sqrt{1 + c\mathcal{L}^2}} + \mathcal{Z} = 0$$
 $\mathcal{Z} = e - f + h - j$

没想到用 **Mathematica** 计算的结果还是那么复杂,有些匪夷所思,仅仅是加了一项常数,解就复杂了很多。 那么我现在有三种选择:

1. 用 Mathematica 给出的解析结果代入计算得到精确解

- 2. 用数值的方法去求解角动量的值
- 3. 不管这些多余的项而是仍然用原本的角动量

这里面我肯定是首选第一种方式,如果 MMA 给出的结果是在可以接受的长度的话,我就精确地去求解。如果实在不行,我可以做个实验,尝试去数值地解一下角动量,如果数值的结果和本身精确的表达式的结果的误差很小的话,那我完全可以用数值的结果代替精确的结果。但是这个需要做个实验验证一下。但是这也有问题,因为这里有 4 个解,除了两个负数解我不要之外,我没有办法保证数值的解法一定能够让角动量收敛到那个正确的解上,这也是需要考虑的问题。

当然,解这个方程本身是我已经得到了 $\mathcal Z$ 的值的前提下,但是事实上我还有三个比较棘手的数值差分没有做。我完全可以把 $H_{\rm so},H_{\rm ss}$ 捆绑在一起去求,而对于 S^* 则需要另外处理了。我查了一下数值微分的方式,有两种方式,一种是:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} \qquad R = -\frac{-f^{(3)}(c)}{6}h^2$$
$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{-f(x+2h) + 8f(x+h) - 8f(x-h) + f(x-2h)}{12h} + \frac{h^4}{30}f^{(5)}(c)$$

误差显然是第二个更小,但是这个 h 应该如何选取呢?我可以尝试取 h = 0.0001。我下面就开始编写数值微分的方程。我突然意识到一个很严重的问题,就是在我本来认为是常数的项中实际上是包含了我要求的角动量的,那这件事情就变得复杂起来了。

由于耦合现象的存在,我已经不可能用之前的方法去求解了。我只可能直接用原来的到的角动量的值或 者说用原来的到的角动量的值作为零级近似,直接利用雅可比迭代法去求解复杂化后的角动量,但是这样我 没有办法保证一定会收敛,而且可能计算的代价太大。我先尝试用雅可比迭代法去求解,如果实在是无法实 现,或者说计算结果完全一样,差别不大,那我完全可以不浪费计算资源,而直接采用原来的角动量的值。由 于这个方程本身的形式已经给了我非常大的便利:

$$\mathcal{L} = rac{1}{\partial_R eta^\phi} \mathcal{G}(\mathcal{L})$$

直接用 \mathcal{L}_0 作为初值代入,应该可以保证收敛。

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{w} \left(b\sqrt{1 + c\mathcal{L}^2} + \frac{\alpha d\mathcal{L}^2}{2\sqrt{1 + c\mathcal{L}^2}} + e - f + h - j\right)$$

事实上经过实验,这个是无法收敛的,一定会发散,所以我采用如下手段:

$$\mathcal{L} = \sqrt{-\frac{w\mathcal{L} + b\sqrt{1 + c\mathcal{L}^2 + \mathcal{Z}}}{\alpha d}}$$

2.19 July 17^{th}

首先安排一下今天的工作任务,由于昨天已经完成了角动量的计算,那么今天的任务应该没有那么困难了,在得到角动量之后我就可以通过哈密顿正则方程去编写演化的程序了,今天早上应该要完成理论推导工作,下午和晚上完成程序编写,结果分析的工作。首先考虑完整的哈密顿量:

$$\frac{H_{eff}}{\mu} = \beta^{\phi} \mathcal{L} + \alpha \sqrt{1 + \gamma^{\theta\theta} p_{\theta}^2 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^2 + \mathcal{Q}_4} + \frac{H_{SO}}{\mu} + \frac{H_{SS}}{\mu} + \frac{d_{SS} \nu}{R^4} \left(\frac{m_2}{m_1} S_1 + \frac{m_1}{m_2} S_2\right) \cdot (S_1 + S_2) - \frac{1}{2MR^3} (1 - 3\cos^2\theta)(S^*)^2$$

在考虑演化方程的时候,这次我打算r也参与演化,也就是让这个式子对着 p_r 尝试去求导一次:

$$\begin{split} \dot{R} &= \frac{M^2 \nu}{\mu(\mu \hat{H}_{\rm real} + M)} \left[\frac{\alpha \partial_{p_R} \mathcal{Q}_4}{2\sqrt{1 + \gamma^{\theta\theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^2 + \mathcal{Q}_4}} + \frac{\partial}{\partial p_R} \left(\frac{H_{\rm SO}}{\mu} + \frac{H_{\rm SS}}{\mu} \right) - \frac{(1 - 3\cos^2\theta) S^*}{MR^3} \frac{\partial}{\partial p_R} S^* \right] \\ \dot{\theta} &= \frac{M^2 \nu}{\mu(\mu \hat{H}_{\rm real} + M)} \left[\frac{\alpha \gamma^{\theta\theta} p_\theta}{\sqrt{1 + \gamma^{\theta\theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^2 + \mathcal{Q}_4}} + \frac{\partial}{\partial p_\theta} \left(\frac{H_{\rm SO}}{\mu} + \frac{H_{\rm SS}}{\mu} \right) - \frac{(1 - 3\cos^2\theta) S^*}{MR^3} \frac{\partial}{\partial p_\theta} S^* \right] \\ \dot{\phi} &= \frac{M^2 \nu}{\mu(\mu \hat{H}_{\rm real} + M)} \left[\beta^\phi + \frac{\alpha \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}}{\sqrt{1 + \gamma^{\theta\theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^2 + \mathcal{Q}_4}} + \frac{\partial}{\partial p_\phi} \left(\frac{H_{\rm SO}}{\mu} + \frac{H_{\rm SS}}{\mu} \right) - \frac{(1 - 3\cos^2\theta) S^*}{MR^3} \frac{\partial}{\partial p_\phi} S^* \right] \\ \dot{p}_\theta &= -\frac{M^2 \nu}{\mu(\mu \hat{H}_{\rm real} + M)} \left[\partial_\theta \beta^\phi \mathcal{L} + \partial_\theta \alpha \sqrt{1 + \gamma^{\theta\theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^2 + \mathcal{Q}_4}} + \frac{\alpha (\partial_\theta \gamma^{\theta\theta} p_\theta^2 + \partial_\theta \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^2 + \partial_\theta \mathcal{Q}_4)}{\sqrt{\gamma^{\theta\theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^2 + \mathcal{Q}_4}} + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{H_{\rm SO}}{\mu} + \frac{H_{\rm SS}}{\mu} \right) + \frac{3\sin(2\theta)}{2MR^3} (S^*)^2 - \frac{(1 - 3\cos^2\theta) S^*}{MR^3} \frac{\partial}{\partial \theta} S^* \right] \end{split}$$

这里其实我有一些东西已经处理过了,可以直接拿来用。其中出现的后面几项的偏微分我都是通过差分来代替微分,唯一我没有处理过的东西就只剩下对 Q_4 的导数而已。而对它的导数也是非常简单

$$\partial_{p_R} \mathcal{Q}_4 \propto \frac{4p_R^3}{R^2 + a^2 \cos^2 \theta}$$
$$\partial_{\theta} \mathcal{Q}_4 \propto \frac{a^2 p_R^4 \sin(2\theta)}{(R^2 + a^2 \cos^2 \theta)^2}$$

那么至此为止,理论上的工作就已经做完了,下面就可以开始代码的编写了,这里一定要注意很多项其实是都在变化的,一定要小心谨慎处理。

为了写代码的时候更加方便,我在这里把完整的 Q_4 的偏微分给出来:

$$\partial_{p_R} Q_4 = 2(4 - 3\nu)\nu M^2 \frac{4p_R^3}{R^2 + a^2 \cos^2 \theta}$$
$$\partial_{\theta} Q_4 = 2(4 - 3\nu)\nu M^2 \frac{a^2 p_R^4 \sin(2\theta)}{(R^2 + a^2 \cos^2 \theta)^2}$$

先记录一下早上和老师的谈话过程, 我现在的任务如下:

- 1. 需要画一个类似于极坐标的图,来判断我搞的是不是正确。
- 2. 验证卡特常数
 - $\nu = 0, S^* = 0$ 用来判读我做的是否正确
 - $\nu \approx 0, S^* = 0$ 用来判断是否仍是常数?
 - $\nu \approx 0, S^* \neq 0$ 用来判断是否有有趣的事情发生!

现在继续我的工作,把考虑了所有效应之后的圆轨道整出来。在搞定了角动量 \mathcal{L} 之后,我需要找出守恒的能量,现在守恒的能量变得复杂了很多,由于 \mathcal{Q}_4 和 p_R 成正比,因此在我考虑的情况中 \mathcal{Q}_4 = 0,情况大为简化。现在的情况是代码已经写完了,但是微分方程演化起来误差有点大,比不考虑别的项的情况下,解得不是那么准确了,而且解得非常慢。代码的优化问题,我可以先放一放,周末里把这个问题给解决掉,同时我应该要开始检验 **Carter** 常数是否守恒。

$$\Theta = Q - \left[(\mu^2 - E^2)a^2 + \frac{\mathcal{L}^2}{\sin^2 \theta} \right] \qquad \Theta = p_\theta^2$$

$$\implies Q = p_{\theta}^2 + \left[(\mu^2 - E^2)a^2 + \frac{\mathcal{L}^2}{\sin^2 \theta} \right] \cos^2 \theta$$

这里的量纲让我对这些量有了新的理解,其实 p_R 已经是无量纲的数了,但是两个角动量其实还有 M 的量纲。我在另一篇文献里找到了能够让图变得更加 fancy 的方式,但是看起来这种方式仅仅是椭圆轨道才能够适用。

2.20 July 19^{th}

我给自己分配一下今天的任务,由于台里面实在是太热了,我在考虑下午到底要不要过来。首先我今天的任务希望可以分为三个部分,第一是检查优化代码,这里面第一步是拿只有 H_{NS} 项的代码进行测试,需要检查两个地方,一个是检查能量是否守恒,第二是检查 Carter 常数是否变化。由于我现在的代码仍然不完善,可以看到能量有很大的变化,甚至会出现不正常的一些数值,需要检查一下从理论上到代码实现上是否存在一些问题。这些解决之后我希望可以在今天多背一些单词,研究一下实习报告的要求以及最后完成一部分的选校工作。

经过我的测试, 我发现如果我将质量比 ν 设为 0, 那么我计算过程中的其中一项就为 0 了, 最终导致的结果就是轨道不演化了, 所以看起来好像 Carter 常数不变。那么这件事情就是没有说服力的了。如果我给出一个很小的质量比, 我现在给出的是 第一个图是我老老实实去计算能量和 Carter 常数, 但是由于是数值解法其实我的能量会有一定的波动, 但其实能量的波动是很小的我计算了一下能量最大值和真值 (平均值) 的相对误差是

$$d = 0.01\%$$

再加上我人为地固定能量计算得到的结果其实也是没有区别的。不过我之前计算得到的 Carter 常数是没有 考虑 μ 的,如果我加上 μ 这一项的话那基本就是 0。

$$M = 1, m = 10^{-15} \Longrightarrow \nu \approx 10^{-15}$$

由于用的定义不同,我需要检验之前的那种小质量比的情况:

$$M = 1, m = 10^{-4} \Longrightarrow \nu \approx 10^{-4}$$
 $M = 1, m = 10^{-1} \Longrightarrow \nu \approx 10^{-1}$

其实从这几个图也可以看出来,本质上极端的质量比是由于 $\mu \to 0$ 直接把整个数给基本抹为 0 了,但是如果不考虑 μ 的存在的话,它还是会有一定的波动的。图 2.3 的下面两幅图就是体现的这件事。

我把我的计算和张晨的初始的卡特常数进行了比较,发现是对的起来的,但是照理来说,卡特常数不应该会演化,但是我的确实在演化过程中发生了变化,我觉得我可能需要全盘检查一下的我的代码和理论是否出错。

我稍微做了一个检查,加入了一个判断来保证我的代码在 $\nu=0$ 的时候仍然可以运行,就是重新计算质量比为 0 的时候的

$$rac{\partial \hat{H}_{ ext{real}}}{\partial X} = M \qquad \quad X = rac{H_{ ext{eff}}}{\mu}$$

但是这一点其实并不会影响演化,我应该要检查一下演化的具体代码是否有问题。我怀疑很大概率上是对度规的导数出现了错误。我现在基本的判断是我在对度规求导的时候发生了一些错误。

$$\frac{\partial g^{\phi\phi}}{\partial \theta} = \frac{a^2 \sin(2\theta)}{\Lambda_t^2} \left[-\frac{\Sigma \Lambda_t}{a^2 \sin^4 \theta} + \frac{\Sigma \Delta_t - \Lambda_t}{\sin^2 \theta} - \frac{\tilde{\omega}_{\rm fd}^2 (\Sigma \Delta_t + \Lambda_t)}{\Sigma^2 \Delta_t} \right]$$

2.21 July 20^{th}

早上任务已经完成了一部分,在这里给出一些结果:现在已经把所有的数据整理完而且放到 **Github** 上了,下一步就是修改错误代码。已经把不考虑自旋修正的代码修改完毕了,目前加上自旋项的代码跑出来的结果有些很奇怪的特征,似乎在一个周期的一些位置会出现奇点,但是我不确定是不是奇点,能量突然变到负无穷,我需要检查一下能量项是否有问题。

诡异的事情发生了,每一项都没有出问题,加起来却出问题了。

2.22 July 21^{th}

今天的任务我希望完成最原始只含 **NS** 的代码的检查,以及再找一找 RK45 的算法,因为现在我跑出来的结果能量仍然有周期性的波动,这是很致命的,至少说明我的算法里存在系统误差,正常的情况下不应该存在这样周期性的波动,我应该要从理论和计算上都去检查一下是否存在问题。其次,我需要去考虑 RK45 的算法是否存在问题,因为目前的情况看,RK45 在更短的时间内跑出了更加糟糕的结果,这是我始料未及的。由于我实在是不知道哪一部分可能会出问题,我决定从头开始,一个部分一个部分地查看代码。

1. 物理量定义

我这里除了广义动量,其他全部不采用约化的表述。涉及到的物理量有质量,约化质量和质量比 ν 以及角动量,自旋角动量的单位为 m^2 ,值得注意的是我采用的 u 的定义是 $u = \frac{4}{5}$

2. 常数定义

这一部分主要涉及到一些不会改变的常数,主要是和文献对应要做好。经过检查,常数的定义部分应该不存在问题。

- 3. 利用初始条件定出角动量和能量 经过检查没有问题。
- 4. 度规定义

经过检查, 度规函数的定义是没有问题的。

- $5. p_{\theta}$ 定义 有错误!
- 6. $\dot{\theta}$ 定义
- 7. o 定义
- 8. 微分方程解法 这一部分我觉得有很大的错误嫌疑。这是我觉得非常奇怪的的地方,我已经检查了 **RK45** 很多遍了,应该是不可能存在错误的,但是事实是 **RK45** 远不如 **RK4** 跑的结果好

今天的任务我想分为两大基本板块和第三个附加板块。第一个板块是再次计算推导过程中是否出现理论性的公式错误,第二个板块是搞清楚存不存在算法本身的错误。第三个附加板块是检查修正最复杂的圆轨道情形。我检查了很多遍我的 RK45 算法,不应该也不太可能出现什么问题。这也大概能印证我的猜想,我认为是方程本身可能出现了问题。

为了方便, 我应该直接检查 RK4 的代码。

定义及物理量定义 不存在问题。

• 角动量计算

这里出现了诡异的问题,我不知道到底应该取哪一个角动量,具体的选取轨道会产生区别。通过观察能量的取值应该是取原来的那个 + 号的,取

q,b,c,d 没有问题。这个周期性很诡异。仍然有某种周期性,因此我更愿意相信是微分方程有偏差,所以我下午第一部分工作仍然是检查微分方程的正确性。我又做了一些测试,很明显可以看出的是步长的选取会导致很大的不同:我这里还没有放上步长 0.05 的那个图,那个误差非常吓人。因此我仍然怀疑是方程出现了问题,现在继续检查一遍方程是否存在问题。

2.23 July 23^{th}

今天依然是没什么进展的一天,我检查了很多遍 **RK45**,**RK78** 都没有发现什么错误,但是事实是解很差。也不是说轨道差,而是能量和卡特常数的结果很差,我怀疑难道真的是我的演化方程出错了? 我现在再检查一遍,如果实在没法发现错误,我需要推进进度了,周五的时候,我先写一个考虑椭率但是不考虑自旋作用的代码,周六周日能够完成这个代码和检查之前的

2.24 July 24^{th}

我打算再花一个小时检查一下我用的 78 到底有没有问题,并且多在 **Github** 上找一找代码,我希望至少能够在相同步长达到 **RK4** 的效果,不然是真的不理想。

我现在要开始做椭圆轨道了,我的考虑是由于求解椭圆轨道和圆轨道有一个很大区别点在于角动量的求解是不同的,因此我考虑第一步写完椭圆第二步将两个程序整合起来,通过一些条件判断来选择采用哪种计算方式。现在开始推公式,给定条件有:

$$(p, e, \iota)$$

先讨论一下椭圆本身: 椭圆的极坐标方程:

$$r(\theta) = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e\cos(\theta)}$$

这里的 a 是**半长轴**,e 是偏心率,r 是两天体间距离,可以改写如下

$$r(\theta) = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e\cos(\theta)} \Longrightarrow r(\theta) = \frac{p}{1 + e\cos(\theta)}$$

显然 p 也是描述椭圆的一个参数叫做半通径。

$$\left. \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Longrightarrow 2y \right|_{x=c} = a(1-e^2) \equiv p$$

我们首先不考虑自旋的效应:

$$H_{\rm NS} = \beta^{\phi} \mathcal{L} + \alpha \sqrt{1 + \gamma^{rr} p_r^2 + \gamma^{\theta\theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^2}$$

我们考虑存在轨道倾角 ι ,其实这并不会影响什么问题,因为椭圆本质上仍然是一个二维的几何曲线,即使放到三维空间仍然只需要用一个平面来描述为了求出角动量,我们考虑近心点和远心点:

$$E = \beta_{(1)}^{\phi} \mathcal{L} + \alpha_{(1)} \sqrt{1 + \gamma_{(1)}^{\phi \phi} \mathcal{L}^2} = \beta_{(2)}^{\phi} \mathcal{L} + \alpha_{(2)} \sqrt{1 + \gamma_{(2)}^{\phi \phi} \mathcal{L}^2}$$

可以解得:

$$\mathcal{L} = \frac{a_1^2 \left[a_2^2 \left(c_1 + c_2 \right) + \left(b_1 - b_2 \right)^2 \right] - 2\sqrt{a_1^2 a_2^2 \left(b_1 - b_2 \right)^2 \left(\left(b_1 - b_2 \right)^2 - \left(a_1^2 - a_2^2 \right) \left(c_1 - c_2 \right) \right)} + a_2^2 \left(b_1 - b_2 \right)^2 - a_1^4 c_1 - a_2^4 c_2}{-2a_2^2 c_2 \left(a_1^2 c_1 + \left(b_1 - b_2 \right)^2 \right) + \left(\left(b_1 - b_2 \right)^2 - a_1^2 c_1 \right)^2 + a_2^4 c_2^2}$$

$$\beta \to b, \alpha \to a, \gamma \to c$$

那么按目前我朴素的理解来说,角动量就已经求出来了。下一步就要考虑演化的问题了。从 Θ_m 开始演化,此时我不妨就设为远心点。我们知道对于椭圆而言有:

$$r_+ = \frac{p}{1-e} \qquad r_- = \frac{p}{1+e}$$

接下来考虑演化问题:在演化的过程中,现在 p_r 也开始变了,但是有一个好消息是我不再需要去通过求解 p_r 来得到角动量了,这也是一个简化的地方。

$$\begin{split} \dot{p_r} &= -\frac{\partial H}{\partial r} = \frac{\partial \beta^\phi}{\partial r} \mathcal{L} + \frac{\partial \alpha}{\partial r} \sqrt{1 + \gamma^{rr} p_r^2 + \gamma^{\theta\theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^2} + \alpha \frac{\frac{\partial \gamma^{rr}}{\partial r} p_r^2 + \frac{\partial \gamma^{\theta\theta}}{\partial r} p_\theta^2 + \frac{\partial \gamma^{\phi\phi}}{\partial r} \mathcal{L}^2}{2\sqrt{1 + \gamma^{rr} p_r^2 + \gamma^{\theta\theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^2}} \\ \dot{p_\theta} &= -\frac{\partial H}{\partial \theta} = \frac{\partial \beta^\phi}{\partial \theta} \mathcal{L} + \frac{\partial \alpha}{\partial \theta} \sqrt{1 + \gamma^{rr} p_r^2 + \gamma^{\theta\theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^2} + \alpha \frac{\frac{\partial \gamma^{rr}}{\partial \theta} p_r^2 + \frac{\partial \gamma^{\theta\theta}}{\partial \theta} p_\theta^2 + \frac{\partial \gamma^{\phi\phi}}{\partial \theta} \mathcal{L}^2}{2\sqrt{1 + \gamma^{rr} p_r^2 + \gamma^{\theta\theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^2}} \\ \dot{p_\phi} &= -\frac{\partial H}{\partial \phi} = \frac{\partial \beta^\phi}{\partial \phi} \mathcal{L} + \frac{\partial \alpha}{\partial \phi} \sqrt{1 + \gamma^{rr} p_r^2 + \gamma^{\theta\theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^2}} + \alpha \frac{\frac{\partial \gamma^{rr}}{\partial \phi} p_r^2 + \frac{\partial \gamma^{\theta\theta}}{\partial \phi} p_\theta^2 + \frac{\partial \gamma^{\phi\phi}}{\partial \phi} \mathcal{L}^2}{2\sqrt{1 + \gamma^{rr} p_r^2 + \gamma^{\theta\theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^2}} \\ \dot{r} &= \frac{\partial H}{\partial p_r} = \frac{\alpha \gamma^{rr} p_r}{\sqrt{1 + \gamma^{rr} p_r^2 + \gamma^{\theta\theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^2}} \\ \dot{\theta} &= \frac{\partial H}{\partial p_\theta} = \frac{\alpha \gamma^{\theta\theta} p_\theta}{\sqrt{1 + \gamma^{rr} p_r^2 + \gamma^{\theta\theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^2}} \\ \dot{\phi} &= \frac{\partial H}{\partial p_\phi} = \beta^\phi + \frac{\alpha \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}}{\sqrt{1 + \gamma^{rr} p_r^2 + \gamma^{\theta\theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^2}} \end{split}$$

我现在有点担心不知道该如何用椭圆公式,不过好像除了一开始为了定角动量要用一下,其他情况下不需要 用到这个公式。我发现了,这里需要处理的其实有三个角度之间的关系

$$\iota, \theta, \xi$$

其中 ξ 描述的是在椭圆面内的运动, θ 描述的是最真实的运动。我认为当 $\theta = \iota$ 时达到了远心点或者近心点。现在代码的大致框架已经出来了,剩下的就是求出这些参数了,需要求解的有十五个导数,并没有那么简单。回去再求解吧。突然意识到 $\dot{p_{\phi}} = 0$,一下子任务减轻了。

2.25 July 25^{th}

今天我的任务就是把公式推完然后把不考虑自旋效应的代码写出来,然后出个图。明天希望能够补一下带自旋的代码(先检查圆轨道的代码)。

现在开始推公式! 我要考虑的导数本质上还是度规对 r, θ 的导数。

$$\frac{\partial g^{tt}}{\partial r} = \frac{\partial}{\partial r} \left(-\frac{\Lambda_t}{\Delta_t \Sigma} \right) = -\frac{\Lambda_t'(\Delta_t \Sigma) - \Lambda_t(\Delta_t' \Sigma + \Sigma' \Delta_t)}{(\Delta_t \Sigma)^2}$$

我算了一个之后就发现这些东西我本来就算过,而且并不存在我之前没有算过的项。但是有一个很头疼的地方在于我很难把这些统筹起来,如果每一个函数里都要去求导一遍的话代价实在是太大了,因此我决定将所有的度规导数写成一个函数,用数组的方式返回出来,然后每次循环我只需要跑一次就可以完成所有的工作以逸待劳。

$$\frac{\partial g^{rr}}{\partial r} = \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\Delta_r}{\Sigma} \right) = \frac{\Delta_r' \Sigma - 2R\Delta_r}{\Sigma^2}$$
$$\frac{\partial g^{\theta\theta}}{\partial r} = \frac{-2R}{\Sigma^2}$$
$$\frac{\partial g^{rr}}{\partial \theta} = \frac{a^2 \sin(2\theta) \Delta_r}{\Sigma^2}$$

现在我先试着跑一跑吧,看能不能跑出东西来。跑是跑起来了,可是结果非常奇怪,而且是能量就已经不对了,我猜测是我角动量就求得不对,我再检查一下过程。

我发现我搞错了一个数:

$$\frac{d\Delta_r}{dr} = \frac{d\Delta_t}{dr} D^{(-1)}(u) + \Delta_t \frac{dD^{(-1)}(u)}{dr}$$

$$\frac{d\Delta_r}{dr} = \frac{d\Delta_t}{dr} D^{(-1)}(u) + \Delta_t \frac{dD^{(-1)}(u)}{du} \times \left(-\frac{M}{R^2}\right)$$

$$\frac{d}{du} \left[D^{(-1)}(u)\right] = \frac{12u\nu + 6u^2(26 - 3\nu)\nu}{1 + 6u^2\nu + 2u^3(26 - 3\nu)\nu}$$

2.26 July 26^{th}

今天的任务是希望能够检查到 bug, 跑出一些能看的结果来。第一步检查

1. 主程序

我基本能够保证在计算角动量和能量部分是正确的,因为计算出来的结果是对得上的。主程序中唯一可能出错的地方在于循环体。我又检查了几遍,主程序应当是正确的,更新也是正常进行,但是更新的值 是错误的,那么唯一的可能就在于更新的函数写错了。

2. 度规函数

这一部分在计算角动量和能量时已经使用,而且我检查过几遍,出错的概率很低。

3. 导数计算函数


这一部分是我觉得出错概率最高的,因为涉及到了大量的变量。

4. 演化函数

这一部分应当是正确的、出错的空间非常小。


我做了个尝试,尝试用 Euler 法去求解,发现仍然得到同样荒谬的结论,因此可以判断并不是 Runge Kutta 出错了,而是说我的微分方程,甚至是导数部分仍然有我没有发现的错误。我觉得没准可能是我觉得不会错的地方犯了大错,我认为不能觉得之前的东西就是正确的,还是要所有的项都全部计算一遍。

经过检查, 度规函数一定正确! 我现在是绕过了调用判断函数的, 因此一定是求导数或者微分方程处出错了。我最后发现是我的 **COMMON** 语句使用不当导致出现了错误, 现在经过我的测试, 我很明显地看到了一些端倪! 我们可以从这个图上很显著地看出正是由于能量守恒满足得并不好, 导致卡特常数也在一些阶段



出现了类似"奇点"一样的现象。同时注意到是周期性的行为,一定是演化轨迹的某些地方出现了一些问题, 我应该需要检查一下代码中的演化部分。

我想尝试一下同样的参数下用 **Euler** 法会不会出现同样的结果用来判断是不是 **RK4** 的问题。结果出来和我想得很不一样,我把欧拉法的步长缩小到十分之一结果出来是:这个很显然是方法本身带来的误差了,已




经到极限了。通过实验我发现卡特常数的不稳定性完全来自于能量的不稳定性。但是在曲线上出现的这些峰 是和步长有关系的,并非是只和轨道参数相关的。

我刚才以为这只不仅是和轨道有关的现象而且和步长有关,但是我又做了实验发现并不是。我调整了步长 50 倍,尖峰仍然在同样位置出现。为了证明这一点,我准备换一组参数,再次进行实验。取了 h=0.01M, h=0.1M 来进行比较,

不对,出问题了,之前出的图肯定有问题,我跑的代码不是新的代码,因此把图片删除,现在很明确,这

些尖峰和步长没有关系。那是否和轨道参数有关系呢?现在好像都是在250左右出问题。说明峰值出现的位



置是和轨道参数有关的,但是和步长无关,是某些量到了某个特定位置就会触发这个现象,一定是代码仍然存在问题。明天继续!

$\mathbf{2.27} \quad \mathbf{July} \,\, \mathbf{27}^{th}$

今天我希望能够完美实现椭圆轨道的代码,晚上我会花一点时间先研究一下实习报告的写法,然后再找两个学校的导师。早上的任务是继续检查代码,特别检查演化方程部分,下午回来可以做一下 PPT。我发现我现在的代码有一个问题是似乎 p < 6M 的情况都是不成立的,这大概率是我的代码出现了问题。我尝试了一下 p = 5.5M, e = 0.05 是可以的。

再次检查, Metric 一定正确!




图 2.4: Q, \mathcal{E} v.s. T

我决定把所有的导数项再次在这里一一列举出来:

$$\begin{split} &\frac{\partial g^{tt}}{\partial R} = -\frac{(\Lambda_t)'(\Delta_t \Sigma) - (\Delta_t \Sigma)'\Lambda_t}{(\Delta_t \Sigma)^2} = \frac{(\Delta_t \Sigma)'\Lambda_t - (\Lambda_t)'(\Delta_t \Sigma)}{(\Delta_t \Sigma)^2} = \frac{(\Delta_t' \Sigma + 2R\Delta_t)\Lambda_t - (\Lambda_t)'(\Delta_t \Sigma)}{(\Delta_t \Sigma)^2} \\ &\frac{\partial g^{rr}}{\partial R} = \frac{\Delta_r' \Sigma - 2R\Delta_r}{\Sigma^2} \\ &\frac{\partial g^{\theta\theta}}{\partial R} = \frac{-2R}{\Sigma^2} \\ &\frac{\partial g^{\phi\theta}}{\partial R} = \frac{2R\Lambda_t - \Sigma\Lambda_t'}{\Lambda_t^2 \sin^2 \theta} - \frac{8a^2M^2R(\Lambda_t\Delta_t \Sigma) - \tilde{\omega}^2(\Lambda_t'\Delta_t \Sigma + \Lambda_t\Delta_t' \Sigma + 2R\Lambda_t\Delta_t)}{(\Lambda_t\Delta_t \Sigma)^2} \\ &\frac{\partial g^{t\phi}}{\partial R} = -\frac{2aM(\Delta_t \Sigma) - 2aMR(\Delta_t' \Sigma + 2R\Delta_t)}{(\Delta_t \Sigma)^2} = 2aM\frac{(\Delta_t' \Sigma + 2R\Delta_t)R - \Delta_t \Sigma}{(\Delta_t \Sigma)^2} \\ &\frac{\partial g^{tt}}{\partial \theta} = \frac{a^2 \sin(2\theta)\Delta_t \Sigma - a^2 \sin(2\theta)\Lambda_t}{\Delta_t \Sigma^2} = \frac{a^2 \sin(2\theta)\varpi^2(\Delta_t - \varpi^2)}{\Delta_t \Sigma^2} \\ &\frac{\partial g^{\theta\theta}}{\partial \theta} = \frac{a^2 \sin(2\theta)\Delta_r}{\Sigma^2} \\ &\frac{\partial g^{\theta\theta}}{\partial \theta} = \frac{a^2 \sin(2\theta)\Lambda_t \sin^2(\theta) - \Sigma\left[\sin(2\theta)\Lambda_t - a^2 \sin(2\theta)\Delta_t \sin^2\theta\right]}{\sin^4 \theta \Lambda_t^2} - a^2 \sin(2\theta)\frac{\tilde{\omega}^2(\Lambda_t + \Delta_t \Sigma)}{\Delta_t \Sigma^2\Lambda_t^2} \\ &\frac{\partial g^{t\phi}}{\partial \theta} = -\frac{\tilde{\omega}a^2 \sin(2\theta)}{(\Delta_t \Sigma^2)} \end{split}$$

那么, 到现在为止所有的导数项都已经集结完毕。下一步的任务是把三个度规参数的导数给搞出来:

$$\frac{\partial \alpha}{\partial R} = \frac{\partial}{\partial R} \left(\frac{1}{\sqrt{-g^{tt}}} \right) = \frac{1}{2(-g^{tt})^{3/2}} \frac{\partial g^{tt}}{\partial R}$$

$$\frac{\partial \alpha}{\partial \theta} = \frac{\partial}{\partial R} \left(\frac{1}{\sqrt{-g^{tt}}} \right) = \frac{1}{2(-g^{tt})^{3/2}} \frac{\partial g^{tt}}{\partial \theta}$$

$$\frac{\partial \beta^{\phi}}{\partial R} = \frac{2aM\lambda_t - 2aMR\Lambda'_t}{\Lambda_t^2}$$

$$\frac{\partial \beta^{\phi}}{\partial \theta} = -\frac{2aMR\Lambda'_t}{\Lambda_t^2} = \frac{2a^3MR\sin(2\theta)\Delta_t}{\Lambda_t^2}$$

$$\frac{\partial \gamma^{rr}}{\partial R} = \frac{\partial g^{rr}}{\partial R}$$

$$\frac{\partial \gamma^{rr}}{\partial \theta} = \frac{\partial g^{rr}}{\partial \theta}$$

$$\frac{\partial \gamma^{\theta\theta}}{\partial R} = \frac{\partial g^{\theta\theta}}{\partial R}$$

$$\frac{\partial \gamma^{\theta\theta}}{\partial \theta} = \frac{\partial g^{\theta\theta}}{\partial \theta}$$

$$\frac{\partial \gamma^{\phi\theta}}{\partial R} = \frac{\partial g^{\phi\phi}}{\partial R} - \frac{2g^{tt}g^{t\phi}(g^{t\phi})' - (g^{t\phi})^2(g^{tt})'}{(g^{tt})^2}$$

$$\frac{\partial \gamma^{\phi\phi}}{\partial \theta} = \frac{\partial g^{\phi\phi}}{\partial \theta} - \frac{2g^{tt}g^{t\phi}(g^{t\phi})' - (g^{t\phi})^2(g^{tt})'}{(g^{tt})^2}$$

$$\frac{\partial \gamma^{\phi\phi}}{\partial \theta} = \frac{\partial g^{\phi\phi}}{\partial \theta} - \frac{2g^{tt}g^{t\phi}(g^{t\phi})' - (g^{t\phi})^2(g^{tt})'}{(g^{tt})^2}$$

声明: 对 R 的导数中的撇代表对 R 求导, 对 θ 的导数中表示对 θ 求导

最后发现了 bug 并将其修复了。今天的任务可以说是圆满完成。现在给明天布置一下任务吧,明天早上可以




图 2.5: 椭圆轨道以及"相空间"

用来花一点时间看一看 **Fortran** 的一些语法问题以及 *function,subroutine,common* 的一些问题。下午主要是用来推公式,把公式推完之后,如果顺利的话,晚上可以写代码,我希望这周可以把完整的代码搞出来。在这里展示一下结果:

我最近有一些想法:在我回家之前,我一定要和老师去谈一谈,一个是问一下为什么我们需要不同的模型,局限是因为模型本身做了近似吗?其次我之后能做些什么?可不可以继续做一些工作?我可不可能做一下中子星的 *EOB* 模型?国外有没有课题组可以推荐的?推荐信?

2.28 July 28^{th}

今天早上我打算看一下 Fortran 的一些基本语法问题,如果快的话,可以直接开始推公式了,具体的把 RK78 应用到代码里这件工作我准备放到周末做,不然很可能耗费大量时间。

- 在循环体语句中出现的那些标号实际上是 F77 的语法, 就相当于 End Do 我不用强行用这种老的语法。
- 我看到大多数代码中都是使用 subroutine, 我有在考虑是不是要将我的函数改写为 subroutine, 不过暂时还是没有必要, 而且有风险。
- 看了老师写的 COMMON 语句,我对这个语法有了新的了解,可以通过人为分区来减少代码的执行。

稍微修改了一下代码,接下来可以开始推公式了! 我现在是要把情况推广到任意自旋的情况! 对于自旋,我想不到一个好的办法去调,目前最好的想法是人为指定 a 的大小,然后随机产生 3 个 [-1,1] 之间的随机数然后归 a 化。我先暂时不考虑如何去实现这个想法的 **coding** 上的问题,先尝试把所有的矢量关系理清晰。

$$egin{aligned} m{n} &= \{\sin heta \cos arphi, \sin heta \sin arphi, \cos heta \} = \hat{m{e}}_r \ m{\xi} &= \hat{m{S}}_{ ext{Kerr}} imes m{n} \ \hat{m{S}}_{ ext{Kerr}} &= rac{m{S}_{ ext{Kerr}}}{|m{S}_{ ext{Kerr}}|} \end{aligned}$$

我这里完全不考虑任何特殊性,我就极其随机地给出自旋方向:

$$S_1 = \{S_{x1}, S_{y1}, S_{z1}\}$$




图 2.6: 坐标旋转

$$m{S}_2 = \{S_{x2}, S_{y2}, S_{z2}\}$$
 $m{S}_{ ext{Kerr}} = m{S}_1 + m{S}_2 = \{S_X, S_Y, S_Z\}$

那么单位化之后的黑洞自旋为:

$$\hat{m{S}}_{ ext{Kerr}} = \{\hat{S}_X, \hat{S}_Y, \hat{S}_Z\}$$

归一化系数:

$$\frac{1}{\sqrt{(S_{x1} + S_{x2})^2 + (S_{y1} + S_{y2})^2 + (S_{z1} + S_{z2})^2}}$$

$$\boldsymbol{\xi} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ S_X & S_Y & S_Z \\ \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \end{vmatrix} = \{ S_Y \cos \theta - S_Z \sin \theta \sin \varphi, S_Z \sin \theta \cos \varphi - S_X \cos \theta, S_X \sin \theta \sin \varphi - S_Y \sin \theta \cos \varphi \}$$

这个结果显然没有那么简单,其实我并不担心这个结果复杂,表达式复杂并没有关系,只是我在考虑如何去看 待文献 34 给出的 Q 的表达式呢?

现在我唯一想明白的事情是我最后的那些 $\{R, \theta, \phi\}$ 显然是借助于某个坐标的, ϕ 相对任意,但是一定要选好 z 轴,通过思考和验证这个 z 轴正是中心 **Kerr** 黑洞自旋的方向,但是问题来了,如果我任意给定两个三维的矢量,我怎么保证他们的和一定可以非常完美地只剩下 z 分量呢?这显然是做不到的事情,为了更加普适,我也不能为了方便就人为地令某一个黑洞的自旋方向是正好在 z 轴方向的,因为这样写出来的代码不普适。其实我要关心的只有 z 轴的变化。

事实上这个问题应当可以通过欧拉角的变换来解决,而且由于我并不关心 X',Y' 我只需要关心 Z' 轴,我只需要关心 ϕ , θ 。最后的 ψ 不需要考虑。因为在新的坐标系中的 R, θ , ϕ 仍然是为了方便而取的坐标。

$$\hat{m{S}}_{ ext{Kerr}} = \{\hat{S}_X, \hat{S}_Y, \hat{S}_Z\}$$

现在我画个图来表示一下




图 2.7: 欧拉角




图 2.8: 具体的角度

因此实际的转动是分为两步,第一步是旋转 $2\pi - \phi$,第二步是旋转 $+\theta$,因此我现在的任务是计算出这两个角度。因为我三个分量都是知道的,因此这是非常容易的事情:

$$S = \{S_X, S_Y, S_Z\} \Longrightarrow \tan \phi = \frac{S_Y}{S_X}$$
 $\cos \theta = \frac{S_Z}{|S|}$

因此就可以得到:

$$\phi = \arctan \frac{S_Y}{S_X}$$
 $\theta = \arccos \frac{S_Z}{|S|}$

因此就有旋转矩阵

$$\boldsymbol{R} = \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi & 0 \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(2\pi - \phi) & \sin(2\pi - \phi) & 0 \\ -\sin(2\pi - \phi) & \cos(2\pi - \phi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

假设我已经数值地求出了具体的值,那么就可以得到旋转矩阵

$$\boldsymbol{R} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\phi & \sin\phi & 0 \\ -\sin\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\phi & \sin\phi & 0 \\ -\cos\theta\sin\phi & \cos\theta\cos\phi & \sin\theta \\ \sin\theta\sin\phi & -\sin\theta\cos\phi & \cos\theta \end{bmatrix}$$

那么我只要利用这个矩阵就可以求出在新的坐标系里 S^* 的表达式:

$$\tilde{\boldsymbol{S}}^* = \boldsymbol{R} \boldsymbol{S}^* = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\cos \theta \sin \phi & \cos \theta \cos \phi & \sin \theta \\ \sin \theta \sin \phi & -\sin \theta \cos \phi & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_X^* \\ S_Y^* \\ S_Z^* \end{bmatrix}$$

下面我们仍然在新的坐标系里讨论问题,我之前做的这些的唯一目的就是将坐标系做一个旋转变换以使得等效的大黑洞的自旋就在新的坐标系里的 z 方向。解决了这个问题之后我就可以大量地使用之前的结论了。当然了为了防止这里的符号和之后真正大量使用的 θ , ϕ 冲突,我可以把这里的两个角换一下名字,叫做 ψ , ζ 。那么我现在要处理的问题就是一个自旋在 \hat{e}_z 方向,一个自旋方向任意,在这种条件下我们仍然有以下矢量关系:

$$\hat{m{S}}_{ ext{Kerr}} = rac{m{S}_{ ext{Kerr}}}{|m{S}|_{ ext{Kerr}}} \qquad m{\xi} = \hat{m{S}}_{ ext{Kerr}} imes m{n} = \sin heta \hat{m{e}}_{\phi} \qquad |m{\xi}| = \sin heta \qquad m{v} = m{n} imes m{\xi} = m{n} imes (\hat{m{e}}_z imes m{n}) = -\sin heta \hat{m{e}}_{ heta}$$

不过后面两个关系应该不需要直接给出, 我只需要知道:

$$\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{n} = p_r$$
 $\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi} R = p_\phi = \mathcal{L}$ $\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v} R = -\sin\theta p_\theta$

现在开始求解等效小天体的等效自旋。在这里我先把之前得到的自旋表达式拿过来:

这里应当是没有问题的,矢量本身是不会变的,就是那个矢量。但是**在同一个时空流形上选取同样的坐标域并不意味着要选同样的坐标系,我之前做了坐标变换,得到了旋转矩阵,那就可以用在这里,得到在新的坐标系下的** σ , σ * 的具体指标。那么理论上只要我知道了在最原始的坐标系下的自旋的方向和大小,我就可以计算出

这里所有的物理量了。下一步自然就是考虑哈密顿量:

$$\begin{split} H_{\mathrm{SO}} = & \frac{e^{2\nu - \tilde{\mu}} \left(e^{\tilde{\mu} + \nu} - \tilde{B} \right) (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r) \left(\boldsymbol{S} \cdot \hat{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{Kerr}} \right)}{\tilde{B}^2 \sqrt{Q} \xi^2} + \frac{e^{\nu - 2\tilde{\mu}}}{\tilde{B}^2 (\sqrt{Q} + 1) \sqrt{Q} \xi^2} \left\{ (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{\xi}) \tilde{\boldsymbol{J}} \left[\mu_r (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v}r) (\sqrt{Q} + 1) - \mu_{\cos\theta} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{n}) \xi^2 \right. \right. \\ & \left. - \sqrt{Q} \left(\nu_r (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v}r) + (\mu_{\cos\theta} - \nu_{\cos\theta}) \left(\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{n} \right) \xi^2 \right) \right] \tilde{B}^2 + e^{\tilde{\mu} + \nu} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r) (2\sqrt{Q} + 1) \left[\tilde{J} \nu_r (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{v}) - \nu_{\cos\theta} (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{n}) \xi^2 \right] \tilde{B} \\ & \left. - \tilde{J} \tilde{B}_r e^{\tilde{\mu} + \nu} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r) (\sqrt{Q} + 1) (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{v}) \right\} \\ H_{\mathrm{SS}} = & \omega \left(\boldsymbol{S} \cdot \hat{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{Kerr}} \right) + \frac{e^{-3\tilde{\mu} - \nu} \tilde{J} \omega_r}{2\tilde{B} (\sqrt{Q} + 1) \sqrt{Q} \xi^2} \left\{ -e^{\tilde{\mu} + \nu} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v}r) (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r) (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{\xi}) \tilde{B} + e^{2(\tilde{\mu} + \nu)} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r)^2 (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{v}) \right. \\ & \left. + e^{2\tilde{\mu}} (1 + \sqrt{Q}) \sqrt{Q} (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{v}) \xi^2 \tilde{B}^2 + \tilde{J} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{n}) [(\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v}r) (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{n}) - \tilde{J} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{n}) (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{v})] \xi^2 \tilde{B}^2 \right\} \\ & \left. + \frac{e^{-3\tilde{\mu} - \nu} \omega_{\cos\theta}}{2\tilde{B} (\sqrt{Q} + 1) \sqrt{Q}} \left\{ -e^{2(\tilde{\mu} + \nu)} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r)^2 (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{n}) + e^{\tilde{\mu} + \nu} \tilde{J} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{n}) (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{\xi}r) (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{\xi}) \tilde{B} \right. \\ & \left. + \left[(\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{n}) (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v}r)^2 - \tilde{J} (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{n}) (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{v}) (\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v}r) - e^{2\tilde{\mu}} (1 + \sqrt{Q}) \sqrt{Q} (\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{n}) \xi^2 \right] \tilde{B}^2 \right\} \end{split}$$

这其中一些小的参数,乱七八糟的参数都是仅仅和坐标相关的物理量,不需要太过关注,只是最后开始写代码的时候需要好好思考一下,如何写代码可以更加优美,以及不会出现冗余的代码。在这里我主要需要去关心的只有几个矢量的点乘,下面我一个一个去分析:

$$\boldsymbol{S} \cdot \hat{\boldsymbol{S}}_{\text{Kerr}} = \begin{bmatrix} S_X & S_Y & S_Z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = S_Z$$

$$\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{S} \cdot \sin \theta \hat{\boldsymbol{e}}_{\phi} = \sin \theta \begin{bmatrix} S_X & S_Y & S_Z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\sin \phi \\ \cos \phi \\ 0 \end{bmatrix} = (-\sin \phi S_X + \cos \phi S_Y) \sin \theta$$

$$\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{v} = -\sin \theta \boldsymbol{S} \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_{\theta} = -\sin \theta \begin{bmatrix} S_X & S_Y & S_Z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \phi \\ \cos \theta \sin \phi \\ -\sin \theta \end{bmatrix} = -(\cos \theta \cos \phi S_X + \cos \theta \sin \phi S_Y - \sin \theta S_Z) \sin \theta$$

$$\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{n} = \begin{bmatrix} S_X & S_Y & S_Z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \phi \\ \sin \theta \sin \phi \\ \cos \theta \end{bmatrix} = S_X \sin \theta \cos \phi + S_Y \sin \theta \sin \phi + S_Z \cos \theta$$

最后来分析一下 Q4

$$Q_4 = \frac{2(4-3\nu)\nu M^2}{R^2 + a^2 \cos^2 \theta} (p_r)^4$$

好了,到此为止,所有的项全部分析完毕。下一步就是考虑角动量的迭代计算以及最后的导数计算了。在此之前,我需要验证一遍我到目前为止的的计算是否正确,因为这是最后结果正确的大前提。检查了一遍,所有的结论应当都是正确的。现在开始理论上推导一下角动量。由于椭圆轨道求解角动量相比圆轨道其实是更加容易的,我们完全不需要去痛苦地求解 $\dot{p}_r=0$ 的方程来得到角动量。仍然是可以利用在近心点和远心点处的

$$\dot{p_r} = \dot{p_{ heta}} = 0$$

近心点,远心点

考虑完整的哈密顿量:

$$\frac{\mathcal{H}_{\text{eff}}}{\mu} = \beta^{\phi} \mathcal{L} + \alpha \sqrt{1 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^2 + \mathcal{Q}_4} + \frac{H_{\text{SO}}}{\mu} + \frac{H_{\text{SS}}}{\mu} + \frac{d_{\text{SS}} \nu}{R^4} \left(\frac{m_2}{m_1} \mathbf{S}_1 + \frac{m_1}{m_2} \mathbf{S}_2 \right) \cdot (\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2) - \frac{1}{2MR^3} (1 - 3\cos^2\theta) (S^*)^2$$

考虑在近心点和远心点处 $p_r = 0$ 那么自然就有 $Q_4 = 0$,这是一个利好消息。但是头疼的事情马上就来了,其他所有项都是需要实打实算出来的了。我仍然可以考虑去硬解它,因为至少后面两项是和角动量完全没关系的,仅仅是两项带自旋的项会起一定的干扰作用。不过如果仔细看一看带自旋的项:

$$\begin{split} H_{\mathrm{SO}} = & \frac{e^{2\nu - \tilde{\mu}} \left(e^{\tilde{\mu} + \nu} - \tilde{B} \right) \mathcal{L} \left(\mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{S}}_{\mathrm{Kerr}} \right)}{\tilde{B}^{2} \sqrt{1 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^{2}} \xi^{2}} + e^{\tilde{\mu} + \nu} \mathcal{L} (2\sqrt{1 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^{2}} + 1) \left[\tilde{J} \nu_{r} (\mathbf{S} \cdot \mathbf{v}) - \nu_{\cos\theta} (\mathbf{S} \cdot \mathbf{n}) \xi^{2} \right] \tilde{B} \\ & - \tilde{J} \tilde{B}_{r} e^{\tilde{\mu} + \nu} (\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\xi} r) (\sqrt{1 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^{2}} + 1) (\mathbf{S} \cdot \mathbf{v}) \right\} \\ H_{\mathrm{SS}} = & \omega \left(\mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{S}}_{\mathrm{Kerr}} \right) + \frac{e^{-3\tilde{\mu} - \nu} \tilde{J} \omega_{r}}{2\tilde{B} (\sqrt{1 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^{2}} + 1) \sqrt{1 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^{2}} \xi^{2}} \left\{ e^{2(\tilde{\mu} + \nu)} \mathcal{L}^{2} (\mathbf{S} \cdot \mathbf{v}) + e^{2\tilde{\mu}} (1 + \sqrt{Q}) \sqrt{Q} (\mathbf{S} \cdot \mathbf{v}) \xi^{2} \tilde{B}^{2} \right. \\ & \left. + \frac{e^{-3\tilde{\mu} - \nu} \omega_{\cos\theta}}{2\tilde{B} (\sqrt{1 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^{2}} + 1) \sqrt{1 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^{2}}} \left\{ -e^{2(\tilde{\mu} + \nu)} \mathcal{L}^{2} (\mathbf{S} \cdot \mathbf{n}) - \left[(e^{2\tilde{\mu}} (1 + \sqrt{1 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^{2}}) \sqrt{1 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^{2}} (\mathbf{S} \cdot \mathbf{n}) \xi^{2} \right] \tilde{B}^{2} \right\} \end{split}$$

这繁琐程度十分恐怖,看起来非常不可能去解析求解。还是用雅可比迭代的方法去求解看起来有点希望。我先把后面一大堆东西打包看成一个数 $\mathcal{Z}(\mathcal{L})$ 于是要解的方程就变成了:

$$\beta_1 \mathcal{L} + \alpha_1 \sqrt{1 + \gamma_1 \mathcal{L}^2} + \mathcal{Z}_1 = \beta_2 \mathcal{L} + \alpha_2 \sqrt{1 + \gamma_2 \mathcal{L}^2} + \mathcal{Z}_2$$

再次使用迭代法, 我要取一个带有根号的形式防止发散:

$$\mathcal{L} = \frac{\alpha_2 \sqrt{1 + \gamma_2 \mathcal{L}^2} - \alpha_1 \sqrt{1 + \gamma_1 \mathcal{L}^2} + \mathcal{Z}_2 - \mathcal{Z}_1}{\beta_1 - \beta_2} \Longrightarrow 选择 1$$

我现在还不确定这么做会不会发散,但是如果这条路行不通的话,那就只能够走之前的道路,利用 $\dot{p}_r = 0$ 去求解,因为这个条件不管是什么轨道都是成立的。

$$\frac{\partial \beta^{\phi}}{\partial R} = w \qquad \frac{\partial \alpha}{\partial R} = b \qquad \gamma^{\phi\phi} = c \qquad \frac{\partial \gamma^{\phi\phi}}{\partial R} = d \qquad \frac{\partial}{\partial R} \left(\frac{H_{\text{SO}}}{\mu} + \frac{H_{\text{SS}}}{\mu}\right) = e$$

$$\frac{4d_{\text{SS}}\nu}{R^5} \left(\frac{m_2}{m_1} \mathbf{S}_1 + \frac{m_1}{m_2} \mathbf{S}_2\right) (\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2) = f \qquad \frac{3}{2MR^4} (1 - 3\cos^2\theta)(S^*)^2 = h \qquad \frac{2S^*}{MR^3} (1 - 3\cos^2\theta) \frac{\partial S^*}{\partial R} = j$$

$$\mathcal{L} = \sqrt{-\frac{w\mathcal{L} + b\sqrt{1 + c\mathcal{L}^2 + \mathcal{Z}}}{\alpha d}}$$

2.29 July 29^{th}

我今天的任务是争取把含有所有哈密顿量的代码写完,然后把小的 bug 都找出来,第二个希望可以完成的任务是把不考虑自旋效应的部分用 **RK78** 改写。

• 求出旋转矩阵找到等效中心天体的自旋方向

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\cos \theta \sin \phi & \cos \theta \cos \phi & \sin \theta \\ \sin \theta \sin \phi & -\sin \theta \cos \phi & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\phi = \arctan \frac{S_Y}{S_X}$$
 $\theta = \arccos \frac{S_Z}{|S|}$ $\theta \to \psi, \phi \to \zeta$

这一部分代码编写完成,但是有一点担忧的是我调用的反三角函数是 ATAN,ACOS, 我好像没法调用 更高精度的函数,这里有可能导致精度不够。写了下代码,验证了一下,发现我之前的计算发生了错误, 正确的转动角度不应该是 $2\pi - \phi$,而应该是 $\frac{\pi}{2} + \phi$,需要对旋转矩阵做一个调整:

$$\boldsymbol{R} = \begin{bmatrix} \cos\psi & \sin\psi & 0 \\ -\sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\frac{\pi}{2} + \phi) & \sin(\frac{\pi}{2} + \phi) & 0 \\ -\sin(\frac{\pi}{2} + \phi) & \cos(\frac{\pi}{2} + \phi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ -\cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ -\cos \theta \cos \phi & -\cos \theta \sin \phi & \sin \theta \\ \sin \theta \cos \phi & \sin \theta \sin \phi & \cos \theta \end{bmatrix}$$

这一部分经过测试已经解决。

定义新的自旋以及哈密顿量
 我发现自旋项中频繁出现的两项是可以被化简的,

$$\frac{M}{R} \equiv u, \frac{\Delta_r}{\Sigma} = g^{rr}$$

自旋部分的代码已经写完了。下面考虑哈密顿量部分,其实仔细一看哈密顿量中很多定义的项也是完全可以用度规分量来表示的:

$$e^{2\nu} = \frac{\Delta_t \Sigma}{\Lambda_t} = -\frac{1}{g^{tt}}$$
 $e^{2\tilde{\mu}} = \frac{1}{g^{\theta\theta}}$

但是仍然有很多项是没有办法用度规表示的,因此我考虑将度规函数修改一下。我需要去返回很多参数,因此我决定重新定义一个函数专门来计算这些参数。然后将这个函数得到的结果作为自变量传入度规函数来计算度规,否则将会导致很多的重复计算,十分浪费计算资源。现在我已经重新定义了一个函数用来计算那些常用的参数,我把这个函数叫做 Parameter Calculator。由于不管是计算能量也好还是求导也好, H_{SS},H_{SO} 总是同时出现的,因此我选择将这两项写成一个函数可以大幅度地节省篇幅。

• 利用数值差分代替微分

事实上无论我选择用什么方式去迭代求出角动量,我都需要写一个数值微分的函数因为之后求微分方程总是需要求偏导数的。因为这个理由,我很有可能倾向于选择直接利用 $\dot{p}_R=0$ 的条件去计算迭代角动量。数值微分部分的代码已经写完了。

• 修改函数

由于我改变了度规函数的定义、因此我需要修改一下函数。

• 迭代求解角动量

- choice 1

$$\mathcal{L} = \frac{\alpha_2 \sqrt{1 + \gamma_2 \mathcal{L}^2} - \alpha_1 \sqrt{1 + \gamma_1 \mathcal{L}^2} + \mathcal{Z}_2 - \mathcal{Z}_1}{\beta_1 - \beta_2} \Longrightarrow 选择 1$$

这里为了写代码,把之前没有明显表示的 Z 给写出来:

$$\mathcal{Z}_{1} = \frac{1}{\mu} (H_{SS} + H_{SO}) + \frac{d_{SS}\nu}{R_{-}^{4}} \left(\frac{m_{2}}{m_{1}} \mathbf{S}_{1} + \frac{m_{1}}{m_{2}} \mathbf{S}_{2} \right) \cdot (\mathbf{S}_{1} + \mathbf{S}_{2}) - \frac{1}{2MR_{-}^{3}} (1 - 3\cos^{2}\theta) (S_{-}^{*})^{2}$$

$$\mathcal{Z}_{1} = \frac{1}{\mu} (\tilde{H}_{SS} + \tilde{H}_{SO}) + \frac{d_{SS}\nu}{R_{-}^{4}} \left(\frac{m_{2}}{m_{1}} \mathbf{S}_{1} + \frac{m_{1}}{m_{2}} \mathbf{S}_{2} \right) \cdot (\mathbf{S}_{1} + \mathbf{S}_{2}) - \frac{1}{2MR_{-}^{3}} (1 - 3\cos^{2}\theta) (S_{-}^{*})^{2}$$

$$\mathcal{Z}_2 = \frac{1}{\mu} (\tilde{H}_{\text{SS}} + \tilde{H}_{\text{SO}}) + \frac{d_{\text{SS}} \nu}{R_+^4} \left(\frac{m_2}{m_1} \boldsymbol{S}_1 + \frac{m_1}{m_2} \boldsymbol{S}_2 \right) \cdot (\boldsymbol{S}_1 + \boldsymbol{S}_2) - \frac{1}{2M R_+^3} (1 - 3\cos^2 \theta) (S_+^*)^2$$

- choice 2

$$\frac{\partial \beta^{\phi}}{\partial R} = w \qquad \frac{\partial \alpha}{\partial R} = b \qquad \gamma^{\phi\phi} = c \qquad \frac{\partial \gamma^{\phi\phi}}{\partial R} = d \qquad \frac{\partial}{\partial R} \left(\frac{H_{\text{SO}}}{\mu} + \frac{H_{\text{SS}}}{\mu} \right) = e$$

$$\frac{4d_{\text{SS}}\nu}{R^5} \left(\frac{m_2}{m_1} \mathbf{S}_1 + \frac{m_1}{m_2} \mathbf{S}_2 \right) (\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2) = f \qquad \frac{3}{2MR^4} (1 - 3\cos^2\theta) (S^*)^2 = h \qquad \frac{2S^*}{MR^3} (1 - 3\cos^2\theta) \frac{\partial S^*}{\partial R} = j$$

$$\mathcal{L} = \sqrt{-\frac{w\mathcal{L} + b\sqrt{1 + c\mathcal{L}^2 + \mathcal{Z}}}{\alpha d}} \Longrightarrow \mathring{\mathcal{L}} \not\cong 2$$

不过第二种选择是在圆轨道的情形下推导的,经过检查由于在近心点和远心点处的 $Q_4 = 0$,因此不会出现错误。

我首先选择是按照简单的方式进行迭代,这样子可以减少很多的计算成本。

到目前为止, 迭代的计算部分已经完成, 接下来需要修改一下代码的前半部分 (因为修改了度规函数的 定义)

• 微分方程修改

$$\begin{split} &\frac{\mathcal{H}_{\text{eff}}}{\mu} = \beta^{\phi} \mathcal{L} + \alpha \sqrt{1 + \gamma^{rr} p_R^2 + \gamma^{\theta\theta} p_{\theta}^2 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^2 + \mathcal{Q}_4} + \frac{H_{\text{SO}}}{\mu} + \frac{H_{\text{SS}}}{\mu} + \frac{d_{\text{SS}} \nu}{R^4} \left(\frac{m_2}{m_1} \mathbf{S}_1 + \frac{m_1}{m_2} \mathbf{S}_2 \right) \cdot (\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2) \\ &- \frac{1}{2MR^3} (1 - 3\cos^2\theta) (S^*)^2 \end{split}$$

由于并非圆轨道,必须要考虑到 Q_4 的影响,下面计算一下各个导数(这里为了方便,先不乘外面的系数):

$$\dot{P}_{R} = -\frac{\partial}{\partial R} \left(\frac{\mathcal{H}_{\text{eff}}}{\mu} \right) = -\left[\frac{\partial \beta^{\phi}}{\partial R} \mathcal{L} + \frac{\partial \alpha}{\partial R} \sqrt{1 + \gamma^{rr} p_{R}^{2} + \gamma^{\theta\theta} p_{\theta}^{2} + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^{2} + \mathcal{Q}_{4}} + \frac{\alpha}{2\sqrt{1 + \gamma^{rr} p_{R}^{2} + \gamma^{\theta\theta} p_{\theta}^{2} + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^{2} + \mathcal{Q}_{4}}} \right]$$

$$\left(\frac{\partial \gamma^{rr}}{\partial R} p_{R}^{2} + \frac{\partial \gamma^{\theta\theta}}{\partial R} p_{\theta}^{2} + \frac{\gamma^{\phi\phi}}{\partial R} \mathcal{L}^{2} + \frac{\partial \mathcal{Q}_{4}}{\partial R} \right) + \frac{1}{\mu} \frac{\partial}{\partial R} \left(H_{\text{SO}} + H_{\text{SS}} \right) - \frac{4d_{\text{SS}}\nu}{R^{5}} \left(\frac{m_{2}}{m_{1}} \mathbf{S}_{1} + \frac{m_{1}}{m_{2}} \mathbf{S}_{2} \right) \cdot \left(\mathbf{S}_{1} + \mathbf{S}_{2} \right) + \frac{3}{2MR^{4}} (1 - 3\cos^{2}\theta) (S^{*})^{2} - \frac{S^{*}}{MR^{3}} (1 - 3\cos^{2}\theta) \frac{\partial S^{*}}{\partial R} \right]$$

$$\begin{split} \dot{P}_{\theta} &= -\frac{\partial}{\partial \theta} \Big(\frac{\mathcal{H}_{\text{eff}}}{\mu} \Big) = - \left[\frac{\partial \beta^{\phi}}{\partial \theta} \mathcal{L} + \frac{\partial \alpha}{\partial \theta} \sqrt{1 + \gamma^{rr} p_R^2 + \gamma^{\theta \theta} p_{\theta}^2 + \gamma^{\phi \phi} \mathcal{L}^2 + \mathcal{Q}_4} + \frac{\alpha}{2\sqrt{1 + \gamma^{rr} p_R^2 + \gamma^{\theta \theta} p_{\theta}^2 + \gamma^{\phi \phi} \mathcal{L}^2 + \mathcal{Q}_4}} \right] \\ &\left(\frac{\partial \gamma^{rr}}{\partial \theta} p_R^2 + \frac{\partial \gamma^{\theta \theta}}{\partial \theta} p_{\theta}^2 + \frac{\gamma^{\phi \phi}}{\partial \theta} \mathcal{L}^2 + \frac{\partial \mathcal{Q}_4}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\mu} \frac{\partial}{\partial \theta} \Big(H_{\text{SO}} + H_{\text{SS}} \Big) - \frac{3 \sin(2\theta)}{2MR^3} (S^*)^2 - \frac{S^*}{MR^3} (1 - 3\cos^2\theta) \frac{\partial S^*}{\partial \theta} \Big] \end{split}$$

$$\begin{split} \dot{R} &= \frac{\partial}{\partial p_R} \Big(\frac{\mathcal{H}_{\text{eff}}}{\mu} \Big) = \frac{\alpha (2 \gamma^{rr} p_R + \frac{\mathcal{Q}_4}{\partial p_R})}{2 \sqrt{1 + \gamma^{rr} p_R^2 + \gamma^{\theta \theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi \phi} \mathcal{L}^2 + \mathcal{Q}_4}} + \frac{\partial}{\partial p_R} \Big(\frac{H_{\text{SS}} + H_{\text{SO}}}{\mu} \Big) - \frac{S^*}{M R^3} (1 - 3 \cos^2 \theta) \frac{\partial S^*}{\partial p_R} \\ \dot{\theta} &= \frac{\partial}{\partial p_\theta} \Big(\frac{\mathcal{H}_{\text{eff}}}{\mu} \Big) = \frac{\alpha \gamma^{\theta \theta} p_\theta}{\sqrt{1 + \gamma^{rr} p_R^2 + \gamma^{\theta \theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi \phi} \mathcal{L}^2 + \mathcal{Q}_4}} + \frac{\partial}{\partial p_\theta} \Big(\frac{H_{\text{SS}} + H_{\text{SO}}}{\mu} \Big) - \frac{S^*}{M R^3} (1 - 3 \cos^2 \theta) \frac{\partial S^*}{\partial p_\theta} \\ \dot{\phi} &= \frac{\partial}{\partial p_\phi} \Big(\frac{\mathcal{H}_{\text{eff}}}{\mu} \Big) = \beta^{\phi} + \frac{\alpha \gamma^{\phi \phi} \mathcal{L}}{\sqrt{1 + \gamma^{\phi \phi} \mathcal{L} + \gamma^{\theta \theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi \phi} \mathcal{L}^2 + \mathcal{Q}_4}} + \frac{\partial}{\partial \mathcal{L}} \Big(\frac{H_{\text{SS}} + H_{\text{SO}}}{\mu} \Big) - \frac{S^*}{M R^3} (1 - 3 \cos^2 \theta) \frac{\partial S^*}{\partial \mathcal{L}} \end{split}$$

再推导一下 Q4 的导数:

$$\mathcal{Q}_{4} = \frac{2(4-3\nu)\nu M^{2}}{R^{2} + a^{2}\cos^{2}\theta} p_{R}^{4}$$

$$\frac{\partial \mathcal{Q}_{4}}{\partial R} = -\frac{4(4-3\nu)\nu M^{2}R}{(R^{2} + a^{2}\cos^{2}\theta)^{2}} p_{R}^{4}$$

$$\frac{\partial \mathcal{Q}_{4}}{\partial \theta} = \frac{2(4-3\nu)\nu M^{2}a^{2}\sin(2\theta)}{(R^{2} + a^{2}\cos^{2}\theta)^{2}} p_{R}^{4}$$

$$\frac{\partial \mathcal{Q}_{4}}{\partial p_{R}} = \frac{8(4-3\nu)\nu M^{2}}{R^{2} + a^{2}\cos^{2}\theta} p_{R}^{3}$$

2.30 July 30^{th}

今天的首要任务是检查一下昨天推的公式和写的代码,一定要尽量保证没有错误,不然错误会像滚雪球一样越滚越多。第一步首先检查公式是否正确,一个是检验自己算的是否正确,一个是检验我誊写的公式是否和文献中的一致。

发现在求 $H_{ss/so}$ 的过程中有 $\nu_{cos\,\theta}$ 写错了,这里记录一下等搞定椭圆轨道的时候回去看圆轨道也应该要改正一下。其次声明一下,之前找 \mathcal{Q}_4 公式的时候虽然还没有根据**量纲**做判断的意识,但是非常幸运地得到了正确的答案。要记住的是由于在我最后的公式中 $[\mathcal{Q}]=1$ 。

现在校对完成第一步:誊抄错误已经发现并且改正。第二步检查计算过程也已经完成,下面开始继续编写程序。在写代码的过程中我意识到如果我选择多利用 subroutine 而非 function 应该可以做到大大简化代码的效果。早上已经将函数全部初步编写完成,下午进行修改,统筹完善工作,尽量减少冗余代码,并且争取可以写一个代码的 README。

下午的工作开始:

1. 检查主函数和各个函数中的逻辑硬伤和小错误

发现了很多细节上的问题,比如在利用 **COMMON** 语句的时候,只可以声明变量名,但是不能声明具体的数据结构,比如如果我要声明一个数组 S(3),我在定义的时候只可以用 **COMMON S** 而不可以写 **COMMON S(3)**。

我运行了迭代计算得到角动量部分的模块,发现按照方法一就会发散,但是目前我并不确定到底是不是我的程序本身的问题,我打算直接尝试利用方式 2 去计算迭代。但是由于之前圆轨道情形较为简单,我现在需要推导一下椭圆轨道下的迭代关系,但是我也未必需要用 $\dot{p}_R=0$,我可以尝试用 $\dot{p}_\theta=0$ 。

$$\dot{p}_{R} = -\left[\frac{\partial \beta^{\phi}}{\partial R} \mathcal{L} + \frac{\partial \alpha}{\partial R} \sqrt{1 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^{2}} + \frac{\alpha}{2\sqrt{1 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^{2}}} \frac{\partial \gamma^{\phi\phi}}{\partial R} \mathcal{L}^{2} + \frac{1}{\mu} \frac{\partial}{\partial R} (H_{SO} + H_{SS}) - \frac{4d_{SS} \nu}{R^{5}} \left(\frac{m_{2}}{m_{1}} \mathbf{S}_{1} + \frac{m_{1}}{m_{2}} \mathbf{S}_{1}\right) + \left(\mathbf{S}_{1} + \mathbf{S}_{2}\right) + \frac{3}{2MR^{4}} (1 - 3\cos^{2}\theta)(S^{*})^{2} - \frac{S^{*}}{MR^{3}} (1 - 3\cos^{2}\theta) \frac{\partial S^{*}}{\partial R}\right]$$

和圆轨道的情况基本上没有发生太大的变化,把后面一长串都令为2,那么可以得到:

$$\frac{\partial \beta^{\phi}}{\partial R} \mathcal{L} + \frac{\partial \alpha}{\partial R} \sqrt{1 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^2} + \frac{\alpha}{2\sqrt{1 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^2}} \frac{\partial \gamma^{\phi\phi}}{\partial R} \mathcal{L}^2 + \mathcal{Z} = 0$$

我发现很久之前给出的结果是错误的,那个迭代关系计算错误。我可以用 **Mathematica** 帮助我进行一下计算

$$w\mathcal{L} + b\sqrt{1 + c\mathcal{L}^2} + \frac{\alpha d}{2\sqrt{1 + c\mathcal{L}^2}}\tilde{\mathcal{L}}^2 + \mathcal{Z} = 0$$

从这个方程可以得到的迭代关系为:

$$\begin{split} \tilde{\mathcal{L}} &= \sqrt{-\frac{2 \Big[b(1+c\mathcal{L}^2) + (w\mathcal{L} + \mathcal{Z}\sqrt{1+c\mathcal{L}^2})\Big]}{\alpha d}} \\ \frac{\partial \beta^\phi}{\partial R} &= w \qquad \frac{\partial \alpha}{\partial R} = b \qquad \gamma^{\phi\phi} = c \qquad \frac{\partial \gamma^{\phi\phi}}{\partial R} = d \qquad \frac{\partial}{\partial R} \Big(\frac{H_{\text{SO}}}{\mu} + \frac{H_{\text{SS}}}{\mu}\Big) = o \\ -\frac{4d_{\text{SS}}\nu}{R^5} \Big(\frac{m_2}{m_1} \mathbf{S}_1 + \frac{m_1}{m_2} \mathbf{S}_2\Big) (\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2) = f \qquad \frac{3}{2MR^4} (1 - 3\cos^2\theta)(S^*)^2 = v \qquad \frac{2S^*}{MR^3} (1 - 3\cos^2\theta) \frac{\partial S^*}{\partial R} = j \end{split}$$

这种方式确实能够达到收敛,但是这次收敛到的角动量值比原先大很多。我需要检查一下所有用到的代码保证这一部分是准确无误的。我刚才发现之前的迭代公式有一个小错误,将其修正后的到的迭代结果比之前看起来合理了很多,迭代带来的修正大致为百分之一的水平。下面开始检查其余代码。我可以保证参数计算以及度规计算部分是正确的,因为在第一次计算得到尝试角动量的时候已经调用了这两个函数。

- 等效自旋 $\Delta_{\sigma^*}^{(1)}, \Delta_{\sigma^*}^{(2)}, \Delta_{\sigma^*}^{(3)} \Longrightarrow S^* \ \text{经过验证正确}.$
- 修正哈密顿量
 H_{SS/SO} 经过验证正确。
- 数值微分函数 数值微分部分经过检查正确。
- 2. 着重检查变量的传递关系
- 3. 优化数据结构

2.31 July 31^{th}

早上我先检验了一下之前不考虑自旋情况下的平面椭圆情况,跑出来效果非常好:跑了一下考虑了自旋哈密顿量的程序的结果,结果很糟糕,下面开始 debug。第一步是要检查一下变量的定义和传输问题,我对自己的计算还是有信心的,主要是考察一下变量的传输情况。

目前为止,仍然没有找到潜在的错误。给下午定一下任务,第一步是检查新增的几个函数中的变量定义问题,把更多精力放在这些原本的程序中没有的地方,变量一定要和原始论文对应,不能只和笔记对应。

工作开始,首先检查定义。为了避免多次查资料,这里把基矢变换关系给出:

$$\hat{e}_r = \hat{e}_1 \sin \theta \cos \phi + \hat{e}_2 \sin \theta \sin \phi + \hat{e}_3 \cos \theta$$

$$\hat{e}_{\theta} = \hat{e}_1 \cos \theta \cos \phi + \hat{e}_2 \cos \theta \sin \phi - \hat{e}_3 \sin \theta$$
$$\hat{e}_{\phi} = -\hat{e}_1 \sin \phi + \hat{e}_2 \cos \phi$$

检查了一遍 $H_{SS/SO}$ 确实发现在定义中有一个小错误,已经改正,基本可以保证这个函数没有问题了。下面 再次检查 S_S and 函数,发现无误。检查求导数的函数,经过实验发现,这个求导的方式本身是没有错误的,但是我在写函数的时候写错了一些东西,已经修正过来了。经过测试,问题并不在这里,演化的形式非常诡异 而且错误。因此我先子啊更多怀疑问题出在演化方程部分,很有可能是我的理论推导出现了错误,导致演化出 错。我检查了一下公式我发现我最后一项出错了。

$$\frac{1}{2MR^5}(R^2\delta^{ij} - 3R^iR^j)S_i^*S_j^*$$

之前由于是自旋方向仅仅正向或者反向,但是现在不同了,自旋在三个方向都有分量,因此我需要做一个计算:

$$\frac{1}{2MR^5} (R^2 \delta^{ij} - 3R^i R^j) S_i^* S_j^* = \frac{1}{2MR^5} \left[R^2 (S^*)^2 - 3(\mathbf{R} \cdot \mathbf{S}^*)^2 \right]$$

这就会对求导带来很多困难。我分别计算

demon =
$$\frac{1}{2MR^5} \left[R^2 (S^*)^2 - 3(\mathbf{R} \cdot \mathbf{S}^*)^2 \right] = \frac{(S^*)^2}{2MR^3} - \frac{3(R_x S_x^* + R_y S_y^* + R_z S_z^*)^2}{2MR^5}$$

那么问题又来了,我现在的表述是在直角坐标下的,但是我想要求导的是 R 是在球坐标下的,因此我需要将这个点积转换到用球坐标量表示。第一步:

$$\mathbf{R} = \{R\sin\theta\cos\phi, R\sin\theta\sin\phi, R\cos\phi\} \qquad \mathbf{S}^* = \{S^*\sin\tilde{\theta}\cos\tilde{\phi}, S^*\sin\tilde{\theta}\sin\tilde{\theta}, S\cos\tilde{\theta}\}$$

并且有以下关系:

$$S^* = |S^*|$$
 $\tilde{\theta} = \arccos \frac{S_z}{S^*}$
 $\tilde{\phi} = \arctan \frac{S_y}{S_x}$

于是

$$\mathbf{R} \cdot \mathbf{S}^* = S^* R \Big(\sin \theta \cos \phi \sin \tilde{\theta} \cos \tilde{\phi} + \sin \theta \sin \phi \sin \tilde{\theta} \sin \tilde{\phi} + \cos \theta \cos \tilde{\theta} \Big)$$

继续推导:

$$\frac{\partial \text{demon}}{\partial R} = -\frac{(S^*)^2}{2MR^4} + \frac{S^*}{MR^3} \frac{\partial S^*}{\partial R} + \frac{15(\mathbf{R} \cdot \mathbf{S}^*)^2}{2MR^6}$$

$$-\frac{3(\mathbf{R} \cdot \mathbf{S}^*)}{MR^5} \Big(\sin\theta \cos\phi \sin\tilde{\theta}\cos\tilde{\phi} + \sin\theta \sin\phi \sin\tilde{\theta}\sin\tilde{\phi} + \cos\theta \cos\tilde{\theta} \Big) (S^* + \frac{\partial S^*}{\partial R})$$


$$\frac{\partial \text{demon}}{\partial \theta} = \frac{S^*}{MR^3} \frac{\partial S^*}{\partial \theta} - \frac{3(\mathbf{R} \cdot \mathbf{S}^*)}{MR^4} \Big[\frac{\partial S^*}{\partial \theta} (\sin\theta \cos\phi \sin\tilde{\theta}\cos\tilde{\phi} + \sin\theta \sin\phi \sin\tilde{\theta}\sin\tilde{\phi} + \cos\phi\cos\tilde{\phi}) + S^* (\cos\theta \cos\phi \sin\tilde{\theta}\cos\tilde{\phi} + \cos\theta \sin\phi \sin\tilde{\theta}\sin\tilde{\phi} - \sin\theta\cos\tilde{\theta}) \Big]$$

$$\frac{\partial \text{demon}}{\partial \phi} = \frac{S^*}{MR^3} \frac{\partial S^*}{\partial \phi} - \frac{3(\mathbf{R} \cdot \mathbf{S}^*)}{MR^4} \Big[\frac{\partial S^*}{\partial \phi} (-\cos\theta \sin\phi \sin\tilde{\theta}\cos\tilde{\phi} - \sin\theta \cos\phi \sin\tilde{\theta}\sin\tilde{\phi} - \sin\theta\cos\tilde{\theta}) + S^* (\cos\theta \cos\phi \sin\tilde{\theta}\cos\tilde{\phi} + \cos\theta \sin\phi \sin\tilde{\theta}\sin\tilde{\phi} - \sin\theta\cos\tilde{\phi}) \Big]$$

这么下去太复杂了没办法——解决,最好的办法还是强行数值解,我重新定义一个函数用来计算自旋和自旋耦合带来的能量:

spin to itself =
$$\frac{1}{2MR^5} \left[R^2 (S^*)^2 - 3(\mathbf{R} \cdot \mathbf{S}^*)^2 \right]$$

我重新审视一下我的代码的全过程:



前面几部分我经过了验证是不会出错的,现在最有可能出错的地方就是在最后一步以及倒数第三步。现在考虑完整的哈密顿量:

$$\frac{\mathcal{H}_{\text{eff}}}{\mu} = \beta^{\phi} \mathcal{L} + \alpha \sqrt{1 + \gamma^{rr} p_R^2 + \gamma^{\theta\theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^2 + \mathcal{Q}_4} + \frac{H_{\text{SO}}}{\mu} + \frac{H_{\text{SS}}}{\mu} + \frac{d_{\text{SS}} \nu}{R^4} \boldsymbol{\sigma}^* \cdot \boldsymbol{S}_{\text{Kerr}} + s.t.i.$$

其中 s.t.i. 表示自旋自旋耦合项,这一项的所有导数我全部用数值微分来实现。那么可以得到演化方程其实并没有那么复杂:

$$\begin{split} \dot{P}_{R} &= -\frac{\partial}{\partial R} \left(\frac{\mathcal{H}_{\text{eff}}}{\mu} \right) = -\left[\frac{\partial \beta^{\phi}}{\partial R} \mathcal{L} + \frac{\partial \alpha}{\partial R} \sqrt{1 + \gamma^{rr} p_{R}^{2} + \gamma^{\theta\theta} p_{\theta}^{2} + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^{2} + \mathcal{Q}_{4}} + \frac{\alpha}{2\sqrt{1 + \gamma^{rr} p_{R}^{2} + \gamma^{\theta\theta} p_{\theta}^{2} + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^{2} + \mathcal{Q}_{4}}} \right. \\ &\left. \left(\frac{\partial \gamma^{rr}}{\partial R} p_{R}^{2} + \frac{\partial \gamma^{\theta\theta}}{\partial R} p_{\theta}^{2} + \frac{\gamma^{\phi\phi}}{\partial R} \mathcal{L}^{2} + \frac{\partial \mathcal{Q}_{4}}{\partial R} \right) + \frac{1}{\mu} \frac{\partial}{\partial R} \left(H_{\text{SO}} + H_{\text{SS}} \right) - \frac{4d_{\text{SS}} \nu}{R^{5}} \boldsymbol{\sigma}^{*} \cdot \boldsymbol{S}_{\text{Kerr}} + \frac{\partial (s.t.i.)}{\partial R} \right] \\ &\dot{P}_{\theta} = -\frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\mathcal{H}_{\text{eff}}}{\mu} \right) = -\left[\frac{\partial \beta^{\phi}}{\partial \theta} \mathcal{L} + \frac{\partial \alpha}{\partial \theta} \sqrt{1 + \gamma^{rr} p_{R}^{2} + \gamma^{\theta\theta} p_{\theta}^{2} + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^{2} + \mathcal{Q}_{4}} + \frac{\alpha}{2\sqrt{1 + \gamma^{rr} p_{R}^{2} + \gamma^{\theta\theta} p_{\theta}^{2} + \gamma^{\phi\phi} \mathcal{L}^{2} + \mathcal{Q}_{4}}} \right. \end{split}$$

$$\left(\frac{\partial \gamma^{rr}}{\partial \theta} p_R^2 + \frac{\partial \gamma^{\theta \theta}}{\partial \theta} p_{\theta}^2 + \frac{\gamma^{\phi \phi}}{\partial \theta} \mathcal{L}^2 + \frac{\partial \mathcal{Q}_4}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{\mu} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(H_{\text{SO}} + H_{\text{SS}}\right) + \frac{\partial (s.t.i.)}{\partial \theta}\right]$$

$$\begin{split} \dot{R} &= \frac{\partial}{\partial p_R} \Big(\frac{\mathcal{H}_{\text{eff}}}{\mu} \Big) = \frac{\alpha (2 \gamma^{rr} p_R + \frac{\mathcal{Q}_4}{\partial p_R})}{2 \sqrt{1 + \gamma^{rr} p_R^2 + \gamma^{\theta \theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi \phi} \mathcal{L}^2 + \mathcal{Q}_4}} + \frac{\partial}{\partial p_R} \Big(\frac{H_{\text{SS}} + H_{\text{SO}}}{\mu} \Big) + \frac{\partial (s.t.i.)}{\partial p_R} \\ \dot{\theta} &= \frac{\partial}{\partial p_\theta} \Big(\frac{\mathcal{H}_{\text{eff}}}{\mu} \Big) = \frac{\alpha \gamma^{\theta \theta} p_\theta}{\sqrt{1 + \gamma^{rr} p_R^2 + \gamma^{\theta \theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi \phi} \mathcal{L}^2 + \mathcal{Q}_4}} + \frac{\partial}{\partial p_\theta} \Big(\frac{H_{\text{SS}} + H_{\text{SO}}}{\mu} \Big) + \frac{\partial (s.t.i.)}{\partial p_\theta} \\ \dot{\phi} &= \frac{\partial}{\partial p_\phi} \Big(\frac{\mathcal{H}_{\text{eff}}}{\mu} \Big) = \beta^\phi + \frac{\alpha \gamma^{\phi \phi} \mathcal{L}}{\sqrt{1 + \gamma^{rr} p_R^2 + \gamma^{\theta \theta} p_\theta^2 + \gamma^{\phi \phi} \mathcal{L}^2 + \mathcal{Q}_4}} + \frac{\partial}{\partial \mathcal{L}} \Big(\frac{H_{\text{SS}} + H_{\text{SO}}}{\mu} \Big) + \frac{\partial (s.t.i.)}{\partial \mathcal{L}} \end{split}$$

2.32 Aug 1^{st}

今天的任务首先是利用结果反推代码的问题,如果我把所有的自旋相关项都取为 0,结果还是不对,那一定是我的代码有问题。因此我现在人为地在定义的函数最后都取值为 0

$$H_{SO/SS} = 0$$
 $s.t.i = 0$ $S^* = 0$

其他参数

$$p = 5M$$
 $e = 0.1$

在我没有去掉 Q_4 的情况下结果仍然不够理想,卡特常数仍然不守恒,因此我现在尝试把 $Q_4 \equiv 0$ 结果仍然不对,而且我觉得问题是出在迭代这里了,我把所有乱七八糟的项都取为 0,结果仍然需要迭代,那显然是迭代步骤存在问题。我检查了一下迭代部分的计算似乎出现了问题:

$$w\mathcal{L} + b\sqrt{1 + c\mathcal{L}^2} + \frac{\alpha d}{2\sqrt{1 + c\mathcal{L}^2}}\mathcal{L}^2 + \mathcal{Z} = 0$$

果然发现了之前迭代的公式的错误:

$$\tilde{\mathcal{L}} = \sqrt{-\frac{2\sqrt{1 + c\mathcal{L}^2} \left[w\mathcal{L} + \mathcal{Z} + b\sqrt{1 + c\mathcal{L}^2} \right]}{\alpha d}}$$

修改过来之后仍然不尽如人意,为了确认是否真的是迭代的问题,我直接把迭代步骤去掉了,并且把其他新引入的项全部取为 0, 观察到底是哪里出了问题。**有意思的事情发生了,我去掉了迭代步骤卡特常数守恒非常好!** 因此我现在要测试如下情况:

- 迭代, 所有项置为 0
- 不迭代, 所有项置为 0

由于程序跑得实在是太慢了,我准备用这个时间再检查一下迭代步骤,果然发现了一个错误,我更换了 a 的值,这就很要命了。现在已经修正过来了,等下可以检验一下结果。我思考了一下椭圆轨道在近心点和远心点处

$$\dot{p}_R \neq 0$$

因此我没有必要非用这个条件, 我可以考虑使用在近心点和远心点处

$$\dot{\theta} = 0 \Longrightarrow \frac{\partial}{\partial p_{\theta}} \left(\frac{\mathcal{H}_{\text{eff}}}{\mu} \right) = \frac{\alpha \gamma^{\theta \theta} p_{\theta}}{\sqrt{1 + \gamma^{rr} p_{R}^{2} + \gamma^{\theta \theta} p_{\theta}^{2} + \gamma^{\phi \phi} \mathcal{L}^{2} + \mathcal{Q}_{4}}} + \frac{\partial}{\partial p_{\theta}} \left(\frac{H_{\text{SS}} + H_{\text{SO}}}{\mu} \right) + \frac{\partial (s.t.i.)}{\partial p_{\theta}}$$

这个条件也用不了,也许只能选择用最原始的求解角动量的公式,近心点和远心点处能量相同:

$$\beta_1 \mathcal{L} + \alpha_1 \sqrt{1 + \gamma_1 \mathcal{L}^2} + \mathcal{Z}_1 = \beta_2 \mathcal{L} + \alpha_2 \sqrt{1 + \gamma_2 \mathcal{L}^2} + \mathcal{Z}_2$$




图 2.9: $H_{NS} \Longrightarrow H_{SS}$

可以得到:

$$\tilde{\mathcal{L}} = \sqrt{\frac{\left[(\beta_2 - \beta_1)\mathcal{L} + \alpha_2\sqrt{1 + \gamma_2\mathcal{L}^2} + \mathcal{Z}_2 - \mathcal{Z}_1 \right]^2 - \alpha_1^2}{\alpha_1^2 \gamma_1}}$$

我现在运行了代码,发现轨道发生了崩溃,但是我并不确定这是由什么原因导致的,而且同时很明显可以看出轨道并不是按照我设想的运行的,因为我的设定是 p=5M, e=0.1 但是最终轨道的 R_{min}, R_{max} 并不合理,我怀疑是由于轨道本身并不稳定导致的这一结果,偏心率太小。我尝试了同样的参数配比运行了代码得到了非常好的结果如下:这里展示是自旋仍然在 z 方向, $T \in [0,5000h], T \in [0,30000h]$ 的情况,可以看出在这种情




图 2.10: H_{NS} v.s. H_{S}

况下考虑自旋和不考虑自旋对轨道的差异非常小。下面考虑稍微改变一下自旋方向:现在的结果是在试验例子的情况下卡特常数符合得非常好,但是当我把质量比推到 $\nu=0.25$ 时卡特常数就呈现出了一种周期性。测

试下来的结果是在非试验粒子的情况下, 轨迹能量守恒仍然可以非常好得符合, 但是卡特常数真的不再是一个常数了。晚上我应该首先要去检查一下代码里的问题, 确保并不是我的代码写错了才导致这个结果。我换了




图 2.11: $\nu = 0.25$.v.s. $\nu = 0$

一组轨道参数得到如下结果:




图 2.12: $\nu = 0.25$.v.s. $\nu = 0$

根据这两幅图,我基本可以非常确定的是我的代码中仍然存在一种系统误差,而且是在第一版不考虑自旋的代码中就已经存在的了,因此由于我没有校验第一部分的代码导致这个问题也被带到了第二部分中,我

晚上的任务就是寻找这个错误!

2.33 Aug 2^{st}

我首先测试了一下如果我将步长取为 h = 0.01M 那么我将看到能量守恒符合得非常好,而卡特常数仍然和之前 h = 0.05M 时呈现出相同的状态,那么一定是存在某种系统误差。

现在我开始一点一点地抠这个代码,我相信一定可以找到对应的错误。经过我的再三实验,我非常确定角动量的计算是非常完美的,我从 \dot{R} , $\dot{\theta}$ 以及从近心点和远心点的哈密顿量这两个角度都进行了分析,结果是角动量的解是正确的,而且精度十分高。那么可能出问题的地方有两个,一个是理论上我遗漏了什么,一个是代码的变量传值或者命名出现了问题,要么就是粗心写错了什么东西。我首先考虑理论上的计算。

$$\hat{H}_{ ext{real}} = rac{M}{\mu} \sqrt{1 + 2
u \Big(rac{H_{ ext{eff}}}{\mu} - 1\Big)}$$

那么根据链式法则就有:

$$rac{\partial \hat{H}_{ ext{real}}}{\partial rac{H_{ ext{eff}}}{\mu}} = rac{1}{\sqrt{1 + 2
u \Big(rac{H_{ ext{eff}}}{\mu} - 1\Big)}}$$

我可以确定的是主函数部分没有问题,和我预期的一样,最有可能出错的地方还是应该是在自定义函数部分。 我通过和张晨的结果进行比较可以发现我的代码在质量比为 0 的时候可以达到能量和卡特常数都守恒的好结果,并且和张晨的数值是完全一样的,这可以说明那些不受 ν 影响的物理量的计算是一定正确的。

2.34 Aug 3^{st}

基本可以判断我的结果是正确的,现在的主要精力分为两部分,第一部分是继续修改代码把不考虑自旋的代码中的 RK4 方法,第一部分的第二块是把带自旋的代码进行一个优化重组然后将 RK4 方法调整为 RK78。第二部分就是集中精力把卡特常数给解决掉,想办法得到 deformed Carter Constant。先进行第一部分,继续修改 RK78 代码,这里首先需要思考到底如何处理数值微分的问题,这一部分的代码实在是太长了,但是又非常难以缩减,我打算像处理之前的简单情况一样首先修改度规函数。

2.35Aug4st

今天的任务比较简单,大概用上午和下午的时间优化修改带自旋的椭圆轨道的代码,晚上可以做一些实验测试一下卡特常数的变化,一个是从量级上去思考,一个是从给出的结果来思考。我现在可以判断的是图像会与以下参数相关:

$$\iota, p, e, \nu$$

$$\mathcal{Q} = (p_{\theta})^2 + \cos^2 \theta \left[(1 - \mathcal{E}^2) a^2 + \frac{\mathcal{L}^2}{\sin^2 \theta} \right]$$

$$\tilde{\mathcal{Q}} = \tilde{\mathcal{Q}}(p_{\theta}, \iota, p, e, \nu)$$

我通过删除分支结构以及将 4 精度浮点数改为双精度浮点数,运算速度提升了将近 100 倍,但是以 0.05M 为步长计算 20000M 仍然需要运行 20 秒 (RK4) 左右。我猜测可以通过将那些参数作为公共变量来实现速度的

大幅提升。我目前是利用函数计算,并且将这些参数打包放进一个数组里再传值出来,这个步骤本身是十分适合代码的阅读的,但是如果进行大量的循环,然后写值进数组再从数组中读值无疑是一件非常耗费时间的事情。

2.36 Aug 5^{st}

今天的目标是将代码中的错误先消除掉然后思考如果继续提速。

2.37 Aug 7^{st}

最终将代码修改完成。并且将代码上传至 Github。

Chapter 3

黑洞物理学习

从拉普拉斯得到的朴素的结论出发:

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}} \Rightarrow \frac{2GM}{Rc^2} \ge 1$$

我们不妨假设这个星球是球对称而且密度均匀的。那么就有:

$$M = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho \Rightarrow \frac{8\pi}{3} \frac{G\rho R^2}{c^2} \ge 1$$

要满足这个条件可以存在"两种"黑洞,其中一种是正常的半径惊人的密度,一种是惊人的半径正常的密度,当然我朴素的感觉是也可以两者兼顾。其中第一种是由致密天体的合并导致的,典型质量是 10 个太阳质量。为了建立数觉,一个 $R\sim 10^5 {\rm cm}$ 的黑洞的密度要求 $\rho \geq 1.7\times 10^{17} {\rm g/cm}^3$ 。而后一种通常被称为超大质量黑洞,它们可以在星系的中心处被发现,典型质量为 $2.5\times 10^6 M_\odot$

3.1 The Schwarzschiled black hole

$$ds^{2} = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right)dt^{2} + \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1}dr^{2} + r^{2}d\Omega^{2}$$

我们可以发现在 r=0,2GM 处看似存在两个发散点,但是实际上 2GM 并不是一个时空奇点,而是一个坐标奇点,我们完全可以通过坐标系的变换和选择消除它。然而通过计算 r=0 处的曲率标量,我们会发现它确实在那里 $blow\ up\ T$ 。但是事实上即使是曲率表现良好也并不能够说明就是真正的 well-behaved。

3.1.1 Spacetime extensions

我们考虑一个正定度规:

$$ds^2 = \frac{dx^2}{x^4} + dy^2$$

并且规定 $x \in (0, +\infty), y \in (-\infty, +\infty)$ 很明显存在一个坐标奇点 x = 0,但是我们只需要令 $\tilde{x} = \frac{1}{x^2}$ 就可以得到:

$$ds^2 = d\tilde{x}^2 + dy^2$$

这显然就是一个平直时空的欧式度规。虽然 $\tilde{x}\in(0,+\infty)$,但是这个时候 $\tilde{x}=0$ 已经不是一个坐标奇点了,因此可以把这个点延拓进我们讨论的时空流形。但是这时 $\tilde{x}=0$ 并不对应于 x=0,而是对应于 $x=\infty$,事实上就是把原流形延拓到了 $-\infty$ 。事实上并不是 x=0 出问题,而是 $x=+\infty$ 的时候测地不完备,我们的坐标变换本质上是把有限长度拉伸为无限长,有点乌龟坐标的意思。第二个例子我在这里省略不谈,讲第三个精彩的例子:

$$ds^{2} = -z^{2}dt^{2} + dz^{2} \qquad z \in (0, \infty), t \in (-\infty, +\infty)$$

看起来在 z = 0 的时候时时分量消失了,这个时空好像变得奇怪了,但是实际上由于所有的二维的度规都是共性平直的,因此我们可以引入一个坐标变换:

$$ds^{2} = z^{2} \left(-dt^{2} + \frac{1}{z^{2}} dz^{2} \right)$$

$$\zeta = \ln z \Rightarrow ds^{2} = e^{2\zeta} (-dt^{2} + d\zeta^{2})$$

$$\zeta \in (-\infty, +\infty)$$

原本 z=0 的点现在是 $\zeta=-\infty$ 的点,这本质上是看的视角发生了变化,而不是时空本身的问题。下一步引入坐标变换:

$$u = t - \zeta, v = t + \zeta$$
 $u, v \in (-\infty, +\infty)$

可以证明的是, $\frac{\partial}{\partial u}$, $\frac{\partial}{\partial v}$ 是 null vector filed.

$$ds^2 = -e^{(v-u)}dudv$$

再做一个变换:

$$U = -e^{-u} \qquad V = e^v$$

于是说

$$ds^2 = -dUdV$$

这本质上是一个闵氏时空的四分之一。

$$T = \frac{1}{2}(U+V) \qquad Z = -\frac{1}{2}(U-V)$$

$$ds^2 = -dT^2 + dZ^2$$

$$T = z \sinh t, Z = \cosh t$$

Chapter 4

实习后

Part II

毕设推进