



§ 2 换元积分法和分部积分法



在一般情况下:

设 $G'(u) = g(u)$, 则 $\int g(u)du = G(u) + C$.

如果 $u = \varphi(x)$ (可微)

$$\therefore dG[\varphi(x)] = g[\varphi(x)]\varphi'(x)dx$$

$$\therefore \int g[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = G[\varphi(x)] + C$$

$$= \left[\int g(u)du \right]_{u=\varphi(x)} \quad \text{由此可得换元法定理}$$



定理2.1

(1) 设 $g(u)$ 具有原函数 $G(u)$, $u = \varphi(x)$ 可导,
记 $f(x) = g[\varphi(x)]\varphi'(x)$, 则有换元公式

$$\begin{aligned}\int f(x)dx &= \int g[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = \left[\int g(u)du \right]_{u=\varphi(x)} \\ &= G(u) \Big|_{u=\varphi(x)} + C = G[\varphi(x)] + C.\end{aligned}$$

第一类换元公式 (凑微分法)

说明 使用此公式的关键在于将

$$\int f(x)dx \text{ 化为 } \int g[\varphi(x)]\varphi'(x)dx.$$



(2) 设 $x = \psi(t)$ 是单调的、可导的函数，
并且 $\psi'(t) \neq 0$ ，又设 $f[\psi(t)]\psi'(t)$ 具有原函数，
则有换元公式

$$\int f(x)dx = \left[\int f[\psi(t)]\psi'(t)dt \right]_{t=\psi^{-1}(x)}$$

第二类换元公式

注 第一类换元公式和第二类换元公式本质上
相同，只是公式使用的方向不一样。



例1 求 $\int \sin 2x dx$.

解 (一)
$$\begin{aligned}\int \sin 2x dx &= \frac{1}{2} \int \sin 2x d(2x) \\ &= \underline{-\frac{1}{2} \cos 2x + C};\end{aligned}$$

(二)
$$\begin{aligned}\int \sin 2x dx &= 2 \int \sin x \cos x dx \\ &= 2 \int \sin x d(\sin x) = \underline{(\sin x)^2 + C};\end{aligned}$$

(三)
$$\begin{aligned}\int \sin 2x dx &= 2 \int \sin x \cos x dx \\ &= -2 \int \cos x d(\cos x) = \underline{-(\cos x)^2 + C}.\end{aligned}$$



例2 求 $\int \frac{1}{3+2x} dx$.

解
$$\int \frac{1}{3+2x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{3+2x} \cdot d(3+2x)$$
$$= \frac{1}{2} \ln |3+2x| + C.$$

一般地
$$\int f(ax+b) dx = \frac{1}{a} \left[\int f(u) du \right]_{u=ax+b}$$



例3 求 $\int \frac{x}{(1+x)^3} dx$.

解

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{(1+x)^3} dx &= \int \frac{x+1-1}{(1+x)^3} dx \\&= \int \left[\frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{(1+x)^3} \right] dx \\&= \int \left[\frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{(1+x)^3} \right] d(1+x) \\&= -\frac{1}{1+x} + \frac{1}{2(1+x)^2} + C.\end{aligned}$$



例4 求 $\int \frac{1}{1+e^x} dx$.

解

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{1+e^x} dx &= \int \frac{1+e^x - e^x}{1+e^x} dx \\&= \int \left(1 - \frac{e^x}{1+e^x} \right) dx = \int dx - \int \frac{e^x}{1+e^x} dx \\&= \int dx - \int \frac{1}{1+e^x} d(1+e^x) \\&= x - \ln(1+e^x) + C.\end{aligned}$$



例5 求 $\int \frac{1}{\sqrt{2x+3} + \sqrt{2x-1}} dx.$

解 原式 = $\int \frac{\sqrt{2x+3} - \sqrt{2x-1}}{(\sqrt{2x+3} + \sqrt{2x-1})(\sqrt{2x+3} - \sqrt{2x-1})} dx$

$$= \frac{1}{4} \int \sqrt{2x+3} dx - \frac{1}{4} \int \sqrt{2x-1} dx$$

$$= \frac{1}{8} \int \sqrt{2x+3} d(2x+3) - \frac{1}{8} \int \sqrt{2x-1} d(2x-1)$$

$$= \frac{1}{12} (\sqrt{2x+3})^3 - \frac{1}{12} (\sqrt{2x-1})^3 + C.$$



例6 求 $\int \frac{1}{a^2 + x^2} dx$.

解
$$\int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a^2} \int \frac{1}{1 + \frac{x^2}{a^2}} dx$$
$$= \frac{1}{a} \int \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2} d\left(\frac{x}{a}\right) = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C.$$

$$\int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C.$$



例7 求 $\int \frac{1}{x^2 - 8x + 25} dx$.

$$\begin{aligned} \text{解 } \int \frac{1}{x^2 - 8x + 25} dx &= \int \frac{1}{(x-4)^2 + 9} dx \\ &= \int \frac{1}{(x-4)^2 + 3^2} d(x-4) \\ &= \frac{1}{3} \arctan \frac{x-4}{3} + C. \end{aligned}$$

$$\int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$



例8 求 $\int \frac{1}{1 + \cos x} dx = \int \frac{1}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx = \tan \frac{x}{2} + C$

解 $\int \frac{1}{1 + \cos x} dx = \int \frac{1 - \cos x}{(1 + \cos x)(1 - \cos x)} dx$

$$= \int \frac{1 - \cos x}{1 - \cos^2 x} dx = \int \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x} dx$$

$$= \int \frac{1}{\sin^2 x} dx - \int \frac{1}{\sin^2 x} d(\sin x)$$

$$= -\cot x + \frac{1}{\sin x} + C.$$



例9 求 $\int \sin^2 x \cdot \cos^5 x dx$.

$$\begin{aligned} \text{解 } \int \sin^2 x \cdot \cos^5 x dx &= \int \sin^2 x \cdot \cos^4 x d(\sin x) \\ &= \int \sin^2 x \cdot (1 - \sin^2 x)^2 d(\sin x) \\ &= \int (\sin^2 x - 2\sin^4 x + \sin^6 x) d(\sin x) \\ &= \frac{1}{3} \sin^3 x - \frac{2}{5} \sin^5 x + \frac{1}{7} \sin^7 x + C. \end{aligned}$$

说明 当被积函数是三角函数相乘时，拆开奇次项去凑微分.



例10 求 $\int \sin^2 x \cdot \cos^4 x dx$.

解

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x \cdot \cos^4 x dx &= \int \frac{1 - \cos(2x)}{2} \cdot \left(\frac{1 + \cos(2x)}{2} \right)^2 dx \\&= \int \frac{1 + \cos(2x) - \cos^2(2x) - \cos^3(2x)}{8} dx \\&= \int \frac{1}{8} dx + \frac{1}{16} \int \cos(2x) d(2x) - \frac{1}{16} \int (1 - \cos(4x)) dx \\&\quad - \frac{1}{16} \int (1 - \sin^2(2x)) d(\sin(2x)) \\&= \frac{x}{16} + \frac{\sin(4x)}{64} + \frac{\sin^3(2x)}{48} + C.\end{aligned}$$



说明 求形为 $\int \sin^m x \cdot \cos^n x dx$ (m, n 为非负整数) 的积分时,

(1) 若 m 为奇数, 则

$$\begin{aligned} \int \sin^m x \cdot \cos^n x dx &= \int \sin^{m-1} x \cdot \cos^n x \cdot \sin x dx \\ &= -\int (1 - \cos^2 x)^{\frac{m-1}{2}} \cdot \cos^n x d(\cos x); \end{aligned}$$

令 $u = \cos x$, 原积分转化为求关于 u 的多项式的积分问题.

(2) 若 n 为奇数, 则

$$\begin{aligned} \int \sin^m x \cdot \cos^n x dx &= \int \sin^m x \cdot \cos^{n-1} x \cdot \cos x dx \\ &= \int \sin^m x \cdot (1 - \sin^2 x)^{\frac{n-1}{2}} d(\sin x); \end{aligned}$$

令 $u = \sin x$, 原积分转化为求关于 u 的多项式的积分问题.



(3)若 m, n 为偶数,则

$$\begin{aligned}\int \sin^m x \cdot \cos^n x dx &= \int (\sin^2 x)^{\frac{m}{2}} \cdot (\cos^2 x)^{\frac{n}{2}} dx \\ &= \int \left(\frac{1 - \cos(2x)}{2} \right)^{\frac{m}{2}} \cdot \left(\frac{1 + \cos(2x)}{2} \right)^{\frac{n}{2}} dx \\ &= \int P_{\frac{m+n}{2}}(\cos(2x)) dx,\end{aligned}$$

其中 $P_{\frac{m+n}{2}}(\cos(2x))$ 是关于 $\cos(2x)$ 的 $\frac{m+n}{2}$ 阶多项式.

令 $u = \frac{2}{2}x$,原积分转化为求 $\int \cos^k u du$ 的积分计算问题.

思考如何求形为 $\int \tan^m x \cdot \sec^n x dx$ (m, n 为非负整数)的积分?



例11 求 $\int \cos 3x \cos 2x dx$.

解 $\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A - B) + \cos(A + B)],$

$$\cos 3x \cos 2x = \frac{1}{2}(\cos x + \cos 5x),$$

$$\begin{aligned}\int \cos 3x \cos 2x dx &= \frac{1}{2} \int (\cos x + \cos 5x) dx \\ &= \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{10} \sin 5x + C.\end{aligned}$$



例12 求 $\int \csc x dx$.

解 方法(1) $\int \csc x dx = \int \frac{1}{\sin x} dx = \int \frac{\sin x}{\sin^2 x} dx$

$$= -\int \frac{1}{1 - \cos^2 x} d(\cos x) \quad u = \cos x$$

$$= -\int \frac{1}{1 - u^2} du = -\frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{1 - u} + \frac{1}{1 + u} \right) du$$

$$= \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{u - 1} - \frac{1}{1 + u} \right) du = \frac{1}{2} (\ln |u - 1| - \ln |1 + u|) + C$$

$$= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 - u}{1 + u} \right| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} \right| + C.$$



$$\begin{aligned}\text{方法(2)} \quad \int \csc x dx &= \int \frac{1}{\sin x} dx = \int \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} dx \\ &= \int \frac{1}{\tan \frac{x}{2} \left(\cos \frac{x}{2} \right)^2} d\left(\frac{x}{2}\right) = \int \frac{1}{\tan \frac{x}{2}} d\left(\tan \frac{x}{2}\right) \\ &= \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C = \ln \left| \csc x - \cot x \right| + C.\end{aligned}$$

$$\int \csc x dx = \ln \left| \csc x - \cot x \right| + C.$$



$$\begin{aligned}\int \sec x dx &= \int \frac{1}{\cos x} dx \\&= \int \frac{1}{\sin(x + \frac{\pi}{2})} d(x + \frac{\pi}{2}) \\&= \ln \left| \csc(x + \frac{\pi}{2}) - \cot(x + \frac{\pi}{2}) \right| + C \\&= \ln \left| \sec x + \tan x \right| + C\end{aligned}$$

$$\int \sec x dx = \ln \left| \sec x + \tan x \right| + C.$$



例13 求 $\int \frac{1}{x(1+2\ln x)} dx$.

解

$$\begin{aligned} & \int \frac{1}{x(1+2\ln x)} dx \\ &= \int \frac{1}{1+2\ln x} d(\ln x) \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+2\ln x} d(1+2\ln x) \\ &= \frac{1}{2} \ln |1+2\ln x| + C. \end{aligned}$$



例14 求 $\int (1 - \frac{1}{x^2}) e^{x + \frac{1}{x}} dx$.

解 $\therefore \int (1 - \frac{1}{x^2}) e^{x + \frac{1}{x}} dx$
 $= \int e^{x + \frac{1}{x}} d(x + \frac{1}{x})$
 $= e^{x + \frac{1}{x}} + C.$

$$\therefore \left(x + \frac{1}{x} \right)' = 1 - \frac{1}{x^2},$$



例15 求 $\int \frac{1}{\sqrt{4-x^2} \arcsin \frac{x}{2}} dx$.

解
$$\int \frac{1}{\sqrt{4-x^2} \arcsin \frac{x}{2}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{2}\right)^2} \arcsin \frac{x}{2}} d\left(\frac{x}{2}\right)$$
$$= \int \frac{1}{\arcsin \frac{x}{2}} d\left(\arcsin \frac{x}{2}\right) = \ln \left| \arcsin \frac{x}{2} \right| + C.$$

$$\left(\arcsin \frac{x}{2} \right)' = \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{2}\right)^2}} \cdot \frac{1}{2}$$



(2) 设 $x = \psi(t)$ 是单调的、可导的函数，
并且 $\psi'(t) \neq 0$ ，又设 $f[\psi(t)]\psi'(t)$ 具有原函数，
则有换元公式

$$\int f(x)dx = \left[\int f[\psi(t)]\psi'(t)dt \right]_{t=\psi^{-1}(x)}$$

第二类换元公式

注 第一类换元公式和第二类换元公式本质上
相同，只是公式使用的方向不一样。




例16 求 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx \quad (a > 0).$

解 令 $x = a \tan t \Rightarrow dx = a \sec^2 t dt \quad t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \int \frac{1}{a \sec t} \cdot a \sec^2 t dt$$

$$= \int \sec t dt = \ln |\sec t + \tan t| + C$$

$$= \ln \left(\frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{a} \right) + C.$$





例17 求 $\int x^3 \sqrt{4-x^2} dx$.

解 令 $x = 2 \sin t$ $dx = 2 \cos t dt$ $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$


$$\int x^3 \sqrt{4-x^2} dx = \int (2 \sin t)^3 \sqrt{4-4 \sin^2 t} \cdot 2 \cos t dt$$

$$= 32 \int \sin^3 t \cos^2 t dt$$

$$= -32 \int (\cos^2 t - \cos^4 t) d \cos t$$

$$= -32 \left(\frac{1}{3} \cos^3 t - \frac{1}{5} \cos^5 t \right) + C$$

$$= -\frac{4}{3} \left(\sqrt{4-x^2} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\sqrt{4-x^2} \right)^5 + C.$$





例18 求 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx \quad (a > 0).$

解 1. $x > a$


$$\text{令 } x = a \sec t \quad dx = a \sec t \tan t dt \quad t \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \int \frac{a \sec t \cdot \tan t}{a \tan t} dt$$

$$= \int \sec t dt = \ln |\sec t + \tan t| + C_1$$

$$= \ln \left(\frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a} \right) + C_1$$

$$= \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2}) + C.$$





2. $x < -a$

令 $x = -u$ 那么 $u > a$

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx &= -\int \frac{1}{\sqrt{u^2 - a^2}} du \\ &= -\ln(u + \sqrt{u^2 - a^2}) + C_2 = -\ln(-x + \sqrt{x^2 - a^2}) + C_2 \\ &= \ln\left(\frac{-x - \sqrt{x^2 - a^2}}{a^2}\right) + C_2 = \ln(-x - \sqrt{x^2 - a^2}) + C.\end{aligned}$$

$$\text{故原式} = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C.$$



基本积分表

$$(16) \quad \int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C;$$

$$(17) \quad \int \cot x dx = \ln|\sin x| + C;$$

$$(18) \quad \int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C;$$

$$(19) \quad \int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + C;$$

$$(20) \quad \int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C;$$



$$(21) \quad \int \frac{1}{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x - a}{x + a} \right| + C;$$

$$(22) \quad \int \frac{1}{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a + x}{a - x} \right| + C;$$

$$(23) \quad \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C;$$

$$(24) \quad \int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C.$$



方法(1) 三角代换

三角代换的目的是化掉根式.

一般规律如下：当被积函数中含有

(1) $\sqrt{a^2 - x^2}$ 可令 $x = a \sin t$;

(2) $\sqrt{a^2 + x^2}$ 可令 $x = a \tan t$;

(3) $\sqrt{x^2 - a^2}$ 可令 $x = a \sec t$.



化掉根式是否一定采用三角代换，需根据被积函数的情况来定.

例19 求 $\int \frac{x^5}{\sqrt{1+x^2}} dx$

解 令 $t = \sqrt{1+x^2} \Rightarrow x^2 = t^2 - 1, \quad xdx = tdt,$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^5}{\sqrt{1+x^2}} dx &= \int \frac{(t^2-1)^2}{t} tdt = \int (t^4 - 2t^2 + 1) dt \\ &= \frac{1}{5}t^5 - \frac{2}{3}t^3 + t + C = \frac{1}{15}(8 - 4x^2 + 3x^4)\sqrt{1+x^2} + C. \end{aligned}$$



例20 求 $\int \frac{1}{\sqrt{1+e^x}} dx$.

解 令 $t = \sqrt{1+e^x} \Rightarrow e^x = t^2 - 1,$

$$x = \ln(t^2 - 1), \quad dx = \frac{2t}{t^2 - 1} dt,$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+e^x}} dx = \int \frac{2}{t^2 - 1} dt = \int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1} \right) dt$$

$$= \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C = 2 \ln(\sqrt{1+e^x} - 1) - x + C.$$



方法(2) 当分母的阶较高时, 可采用倒代换 $x = \frac{1}{t}$.

例21 求 $\int \frac{1}{x(x^7 + 2)} dx$

解 令 $x = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2} dt$,

$$\int \frac{1}{x(x^7 + 2)} dx = \int \frac{t}{\left(\frac{1}{t}\right)^7 + 2} \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt = -\int \frac{t^6}{1 + 2t^7} dt$$

$$= -\frac{1}{14} \ln |1 + 2t^7| + C = -\frac{1}{14} \ln |2 + x^7| + \frac{1}{2} \ln |x| + C.$$



例22 求 $\int \frac{1}{x^4 \sqrt{x^2 + 1}} dx$. (分母的阶较高)

解 令 $x = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2} dt$,

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^4 \sqrt{x^2 + 1}} dx &= \int \frac{1}{\left(\frac{1}{t}\right)^4 \sqrt{\left(\frac{1}{t}\right)^2 + 1}} \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt \\ &= -\int \frac{t^3}{\sqrt{1+t^2}} dt = -\frac{1}{2} \int \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}} dt^2 \end{aligned}$$



$$= \frac{1}{2} \int \frac{1 - (t^2 + 1)}{\sqrt{1 + t^2}} d(t^2 + 1)$$

$$= \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{\sqrt{u}} - \sqrt{u} \right) du \quad u = t^2 + 1$$

$$= \sqrt{u} - \frac{1}{3} (\sqrt{u})^3 + C$$

$$= \frac{\sqrt{1 + x^2}}{x} - \frac{1}{3} \left(\frac{\sqrt{1 + x^2}}{x} \right)^3 + C.$$



方法(3) 当被积函数含有两种或两种以上的根式 $\sqrt[k]{x}, \dots, \sqrt[l]{x}$ 时, 可采用令 $x = t^n$ (其中 n 为各根指数的**最小公倍数**)

例23 求 $\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt[3]{x})} dx$.

解 令 $x = t^6 \Rightarrow dx = 6t^5 dt$,

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt[3]{x})} dx = \int \frac{6t^5}{t^3(1+t^2)} dt = \int \frac{6t^2}{1+t^2} dt$$



$$\begin{aligned} &= 6 \int \frac{t^2 + 1 - 1}{1 + t^2} dt \\ &= 6 \int \left(1 - \frac{1}{1 + t^2} \right) dt \\ &= 6[t - \arctan t] + C \\ &= 6[\sqrt[6]{x} - \arctan \sqrt[6]{x}] + C. \end{aligned}$$



问题 $\int x e^x dx = ?$

解决思路 利用两个函数乘积的求导法则.

设函数 $u = u(x)$ 和 $v = v(x)$ 可导,

$$(uv)' = u'v + uv',$$

$$uv' = (uv)' - u'v,$$

$$\int uv' dx = uv - \int u'v dx, \quad \int u dv = uv - \int v du.$$

分部积分公式



定理2.2 设函数 $u(x)$ 和 $v(x)$ 可导,若 $u'(x)v(x)$ 存在原函数,则 $u(x)v'(x)$ 存在原函数,并有

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx$$

或
$$\int u(x)dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x)du(x)$$

选 u 和 v 的总原则:

1. v 易求;
2. $\int v du$ 比 $\int u dv$ 易求.



例24 求积分 $\int x \cos x dx$.

解 (一) 令 $u = \cos x$, $x dx = d\left(\frac{x^2}{2}\right) = dv$

$$\int x \cos x dx = \frac{x^2}{2} \cos x + \int \frac{x^2}{2} \sin x dx$$

显然, u, v' 选择不当, 积分更难进行.

(二) 令 $u = x$, $\cos x dx = d(\sin x) = dv$

$$\begin{aligned} \int x \cos x dx &= x \sin x - \int \sin x dx \\ &= x \sin x + \cos x + C. \end{aligned}$$



例25 求积分 $\int x^2 e^x dx$.

解 $u = x^2, \quad e^x dx = de^x = dv,$

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x dx$$

↓ (再次使用分部积分法) $u = x, \quad e^x dx = dv$

$$= x^2 e^x - 2(xe^x - e^x) + C.$$

总结 若被积函数是幂函数和正(余)弦函数或幂函数和指数函数的乘积, 就考虑设幂函数为 u , 使其降幂一次(假定幂指数是正整数)



例26 求积分 $\int x \arctan x dx$.

解 令 $u = \arctan x$, $x dx = d \frac{x^2}{2} = dv$

$$\begin{aligned}\int x \arctan x dx &= \frac{x^2}{2} \arctan x - \int \frac{x^2}{2} d(\arctan x) \\&= \frac{x^2}{2} \arctan x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2} dx \\&= \frac{x^2}{2} \arctan x - \int \frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx \\&= \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} (x - \arctan x) + C.\end{aligned}$$



例27 求积分 $\int x^3 \ln x dx$.

解 $u = \ln x, \quad x^3 dx = d \frac{x^4}{4} = dv,$

$$\begin{aligned}\int x^3 \ln x dx &= \frac{1}{4} x^4 \ln x - \frac{1}{4} \int x^3 dx \\ &= \frac{1}{4} x^4 \ln x - \frac{1}{16} x^4 + C.\end{aligned}$$

总结 若被积函数是**幂函数**和**对数函数**或**幂函数**和**反三角函数**的乘积，就考虑设对数函数或反三角函数为 u .



函数 u , v 的选取一般优先级:

反(三角函数)、对(数函数)、幂(函数)、
三(角函数)、指(数函数),

即排列次序在前面的函数优先取为 $u(x)$.



例28 已知 $f(x)$ 的一个原函数是 e^{-x^2} , 求 $\int xf'(x)dx$.

解 $\int xf'(x)dx = \int xdf(x) = xf(x) - \int f(x)dx,$

$$\text{而 } \int f(x)dx = e^{-x^2} + C,$$

两边同时对 x 求导, $\therefore \left(\int f(x)dx\right)' = f(x),$

$$f(x) = -2xe^{-x^2},$$

$$\begin{aligned}\therefore \int xf'(x)dx &= xf(x) - \int f(x)dx \\ &= -2x^2e^{-x^2} - e^{-x^2} + C.\end{aligned}$$



例29 求积分 $\int \frac{x \arctan x}{\sqrt{1+x^2}} dx$.

解 $\because \left(\sqrt{1+x^2} \right)' = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}},$

$$\begin{aligned} \therefore \int \frac{x \arctan x}{\sqrt{1+x^2}} dx &= \int \arctan x d\sqrt{1+x^2} \\ &= \sqrt{1+x^2} \arctan x - \int \sqrt{1+x^2} d(\arctan x) \\ &= \sqrt{1+x^2} \arctan x - \int \sqrt{1+x^2} \cdot \frac{1}{1+x^2} dx \end{aligned}$$



$$= \sqrt{1+x^2} \arctan x - \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}} dx = \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) + C$$

$$\therefore \int \frac{x \arctan x}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

$$= \sqrt{1+x^2} \arctan x - \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C.$$



例30 求积分 $\int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx$

解

$$\begin{aligned} & \int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx \\ &= x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \int x (\ln(x + \sqrt{1+x^2}))' dx \\ &= x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx \\ &= x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2} + C \end{aligned}$$



例31 求积分 $\int \sin(\ln x) dx$.

造循环

解 $\int \sin(\ln x) dx$

$$= x \sin(\ln x) - \int x \cos(\ln x) \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$= x \sin(\ln x) - \int \cos(\ln x) dx$$

$$= x \sin(\ln x) - x \cos(\ln x) - \int \sin(\ln x) dx$$

$$= x[\sin(\ln x) - \cos(\ln x)] - \int \sin(\ln x) dx$$

$$\therefore \int \sin(\ln x) dx = \frac{x}{2} [\sin(\ln x) - \cos(\ln x)] + C.$$



例32 求积分 $\int e^x \sin x dx$.

解 $\int e^x \sin x dx$

$$= e^x \sin x - \int e^x \cos x dx$$

$$= e^x \sin x - (e^x \cos x + \int e^x \sin x dx)$$

$$= e^x (\sin x - \cos x) - \int e^x \sin x dx$$

$$\therefore \int e^x \sin x dx = \frac{e^x}{2} (\sin x - \cos x) + C.$$



思考 在接连几次应用分部积分公式时，应注意什么？

注意前后几次所选的 u 应为同类型函数.

例 $\int e^x \cos x dx$

第一次时若选 $u_1 = \cos x$

$$\int e^x \cos x dx = e^x \cos x + \int e^x \sin x dx$$

第二次时仍应选 $u_2 = \sin x$



例33 求积分 $\int e^{\sqrt{x}} dx$.

解 令 $u = \sqrt{x}$, 则 $\int e^{\sqrt{x}} dx = 2 \int u e^u du$

$$\begin{aligned} &= 2 \int u de^u \\ &= 2ue^u - 2 \int e^u du \\ &= 2ue^u - 2e^u + C \\ &= 2ue^u - 2e^u + C \\ &= 2\sqrt{x}e^{\sqrt{x}} - 2e^{\sqrt{x}} + C \end{aligned}$$



例34 求积分 $I_n = \int \frac{1}{(1+x^2)^n} dx$.

解

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{x}{(1+x^2)^n} - \int x d\left(\frac{1}{(1+x^2)^n}\right) \\ &= \frac{x}{(1+x^2)^n} + 2n \int \frac{x^2}{(1+x^2)^{n+1}} dx \\ &= \frac{x}{(1+x^2)^n} + 2n \int \frac{1+x^2-1}{(1+x^2)^{n+1}} dx \\ &= \frac{x}{(1+x^2)^n} + 2nI_n - 2nI_{n+1} \\ \therefore I_{n+1} &= \frac{x}{2n(1+x^2)^n} + \frac{2n-1}{2n} I_n \quad \text{递推公式} \end{aligned}$$

由 $I_1 = \arctan x + C$, 可求出 I_n 的表达式.



例35 计算 $\int \cos^n x dx$, $\int \sin^n x dx$, 其中 $n \in N^*$.

解 $\int \cos^n x dx = \int \cos^{n-1} x d(\sin x)$

$$\therefore \int \cos^n x dx = \sin x \cos^{n-1} x + (n-1) \int \cos^{n-2} x \sin^2 x dx$$

$$= \sin x \cos^{n-1} x + (n-1) \int \cos^{n-2} x (1 - \cos^2 x) dx$$

$$= \sin x \cos^{n-1} x + (n-1) \int \cos^{n-2} x dx - (n-1) \int \cos^n x dx$$

$$\therefore \int \cos^n x dx = \frac{1}{n} \sin x \cos^{n-1} x + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x dx$$

递推法



类似可求得:

$$\int \sin^n x dx = -\frac{1}{n} \cos x \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x dx.$$

思考 建立求解 $I_n = \int \frac{dx}{\sin^n x}$ 的递推公式

提示:
$$I_n = \int \frac{dx}{\sin^n x} = -\int \frac{d \cot x}{\sin^{n-2} x}$$



思考 建立求解 $I_n = \int \frac{dx}{\sin^n x}$ 的递推公式

提示:
$$I_n = \int \frac{dx}{\sin^n x} = -\int \frac{d \cot x}{\sin^{n-2} x}$$



作业:

习题6.2

1(单数), 2(单数), 3,
4(1,3,6,10,11,13,16,18), 5