

北京航空航天大学

2015—2016 学年 第二学期期中

《 工科数学分析 (2) 》

班号_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
成 绩								
阅卷人								
校对入								

2016 年 05 月 8 日

一、 选择题（每题 4 分，满 20 分）

1. 下列论断正确的是

(D)

- A. 函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数都存在, 则 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微.
B. 函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, 则其在此点两个偏导数都存在且连续.
C. 函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续, 则其在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数都存在.
D. 函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, 则其在点 (x_0, y_0) 处连续, 且两个偏导数都存在.

2. 已知二元函数 $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$, 下面命题正确的是 (C)

① $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = 1, \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = -1$; ② $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 1$;

③ $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = 0$; ④ $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$ 不存在.

- A. ①③ B. ②③ C. ①④ D. ②④

3. 已知集合 $E = \{(x, y) \mid y > x^2\}$, 下面命题正确的是 (D)

- ① 集合 E 是闭集; ② 集合 E 是区域; ③ 集合 E 是有界集;
④ E 的导集 $E' = \{(x, y) \mid y \geq x^2\}$; ⑤ E 的边界 $\partial E = \{(x, y) \mid y = x^2\}$.

- A. ①②③ B. ②③④ C. ①④ D. ②④⑤

4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} (x-1)^n$ 的收敛域为 (B)

- A. $(-e, e)$; B. $(1 - \frac{1}{e}, 1 + \frac{1}{e})$; C. $[1 - \frac{1}{e}, 1 + \frac{1}{e})$; D. $(1 - e, 1 + e]$.

5. 函数 $\ln(1+x+y)$ 的二阶 Maclaurin 公式为 (C)

- A. $(x+y) + \frac{(x+y)^2}{2} + o(x+y)$; B. $(x+y) + o(x+y)$;
C. $(x+y) - \frac{(x+y)^2}{2} + o(x^2 + y^2)$; D. $1 + (x+y) + \frac{(x+y)^2}{2} + o(x^2 + y^2)$.

二、(每题 6 分, 满分 30 分)

1. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n(n+1)}{2^n}$ 的和.

解 设 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n(n+1)}{2^n} x^n$, 则知 $s(x)$ 在 $(-2, 2)$ 上绝对收敛, 利用逐项求积得

$$\int_0^x s(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2^n} x^{n+1} = x^2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2^n} x^{n-1} = x^2 s_1(x), -2 < x < 2.$$

由 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2^n} x^{n-1} = s_1(x), -1 < x < 1$. 再次逐项求积得

$$\int_0^x s_1(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{x}{2} \right)^n = \frac{-\frac{x}{2}}{1 - (-\frac{x}{2})} = -\frac{x}{2+x}, -2 < x < 2.$$

$$\text{所以 } s_1(x) = \left(-\frac{x}{2+x} \right)' = -\frac{2}{(2+x)^2}, -2 < x < 2.$$

$$\text{所以 } s(x) = \left(x^2 s_1(x) \right)' = \left(-\frac{2x^2}{(2+x)^2} \right)' = -\frac{2x}{(2+x)^3}, -2 < x < 2.$$

2. 设 $z = F(x+z, x+y)$, 求方程所确定的隐函数的偏导数 z_x, z_{xy} .

解 因为 $z_x = F_1(1+z_x) + F_2$, 所以 $z_x = \frac{F_1 + F_2}{1 - F_1}$

$$\text{所以 } z_{xy} = \frac{(F_{11}z_y + F_{12} + F_{21}z_y + F_{22})(1 - F_1) + (F_1 + F_2)(F_{11}z_y + F_{12})}{(1 - F_1)^2} \quad \text{整理得}$$

$$z_{xy} = \frac{(F_{11}z_y + F_{21} + F_2F_{11} - F_1F_{21})z_y + (F_{12} + F_{22} + F_2F_{12} - F_1F_{21})}{(1 - F_1)^2}$$

3. 求函数 $u = \frac{1}{2}x^2y^2z^2$ 在点 $M(1, 1, 1)$, 沿方向 $\vec{l} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 的方向导数与梯度。

解 $grad(u) = (u_x, u_y, u_z) = (xy^2z^2, x^2yz^2, x^2y^2z)$,

所以函数 $u = \frac{1}{2}x^2y^2z^2$ 在点 $M(1, 1, 1)$ 的梯度为 $(1, 1, 1)$ 。

所以函数 $u = \frac{1}{2}x^2y^2z^2$ 在点 $M(1,1,1)$ 沿方向 $\vec{l} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 的方向导数为

$$\frac{\partial u}{\partial l}|_{(1,1,1)} = (1,1,1) \cdot (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma) = \cos\alpha + \cos\beta + \cos\gamma$$

4. 求椭球面 $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 9$ 与平面 $3x^2 + y^2 - z^2 = 0$ 的交线在点 $(1, -1, 2)$ 点处的切线与法平面方程。

解：记 $F(x, y, z) = 2x^2 + 3y^2 + z^2 - 9$, $G(x, y, z) = 3x^2 + y^2 - z^2$ -----1 分

曲线在点 $P_0(1, -1, 2)$ 的切向量为

$$\begin{aligned} \vec{\tau} &= \left(\begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} F_z & F_x \\ G_z & G_x \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{vmatrix} \right)_{P_0} = \left(\begin{vmatrix} 6y & 2z \\ 2y & -2z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2z & 4x \\ -2z & 6x \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 4x & 6y \\ 6x & 2y \end{vmatrix} \right)_{P_0} \\ &= (-16yz, 20xz, -28xy)_{P_0} = (32, 40, 28) \end{aligned} \text{-----3 分}$$

所以曲线在 $P_0(1, -1, 2)$ 的切线方程为: $\frac{x-1}{8} = \frac{y+1}{10} = \frac{z-2}{7}$ -----1 分

曲线在 $P_0(1, -1, 2)$ 处的法平面方程为: $8(x-1) + 10(y+1) + 7(z-2) = 0$,

$$\text{即 } 8x + 10y + 7z - 12 = 0. \text{-----1 分}$$

另解：将 y, z 看做 x 的隐函数，则在 $P_0(1, -1, 2)$ 点处的切向量为 $\vec{\tau} = \left(1, \frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx} \right)_{P_0}$ ，其中

$\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$ 利用隐函数组求导的方法计算即可（方程组两边关于 x 求导）

-----（切向量 4 分，方程各 1 分，共 6 分）.

5. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，且

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in (0, 2\pi]; \\ 2\pi, & x = 0. \end{cases}$$

写出它的 Fourier 级数.

解：将函数延拓成的 $(-\infty, +\infty)$ 上周期为 2π 的函数，延拓后函数的不连续点为

$2n\pi, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, Fourier 系数为

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx = 2\pi \text{-----1 分}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \cos nx dx = \frac{1}{n^2\pi} \cos nx \Big|_0^{2\pi} = 0 \text{-----2 分}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \sin nx dx = -\frac{1}{n\pi} x \cos nx \Big|_0^{2\pi} + \frac{1}{n\pi} \int_0^{2\pi} \cos nx dx = -\frac{2}{n}, \quad n=1, 2, \dots$$

----2 分

由收敛定理, $f(x)$ 的 Fourier 级数

$$\pi - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} \sin nx = \begin{cases} f(x), & x \in (0, 2\pi) \\ \pi, & x = 0, 2\pi \end{cases} \quad \text{-----1 分}$$

三、(本题 10 分)

$$\text{讨论函数 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases} \quad \text{在点 } (0, 0) \text{ 的连续性、可微性}$$

以及偏导函数的连续性.

解:

1) 设 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则 $f(x, y) = f(r, \theta) = r(\cos^3 \theta - \sin^3 \theta)$

这时 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 等价于对任何 θ 都有 $r \rightarrow 0$.

$$\text{显然 } \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} f(r, \theta) = 0 = f(0, 0) \quad \text{-----2 分}$$

从而函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点连续.

2) 由偏导数的定义

$$f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1,$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{-\Delta y}{\Delta y} = -1.$$

即函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点两个偏导数存在, 且分别为 1 和 -1. -----2 分 (每个偏导 1 分)

3) 记 $z = f(x, y)$, 则 $\Delta z - dz = f(\Delta x, \Delta y) - f(0, 0) - f_x(0, 0) \cdot \Delta x - f_y(0, 0) \cdot \Delta y$

$$\frac{\Delta z - dz}{\rho} = \frac{\frac{\Delta x^3 - \Delta y^3}{\Delta x^2 + \Delta y^2} - \Delta x + \Delta y}{\rho} = \frac{\Delta x \cdot \Delta y (\Delta x - \Delta y)}{(\Delta x^2 + \Delta y^2) \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}}$$

设 $\Delta y = k\Delta x$, 则 $\frac{\Delta x \cdot \Delta y (\Delta x - \Delta y)}{(\Delta x^2 + \Delta y^2) \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \frac{k(1-k)}{(k^2+1)^{\frac{3}{2}}}$ 随 k 不同而不同, 故极限不存在。

所以函数 $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处不可微。-----4 分

$$4) f_x(x, y) = \frac{x^4 + 3x^2y^2 + 2xy^3}{(x^2 + y^2)^2}, f_y(x, y) = -\frac{y^4 + 3x^2y^2 + 2x^3y}{(x^2 + y^2)^2}$$

设 $y=kx$, 则

$$f_x(x, y) = \frac{1+3k^2+2k^3}{(1+k^2)^2}, f_y(x, y) = -\frac{k^4+3k^2+2k}{(1+k^2)^2}$$

易知 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在 $(0,0)$ 点都不连续 -----2 分

四、(本题 10 分)

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin^2 5n}{n^p + \alpha} \arctan 5n$, 其中 $\alpha > 0, p > 0$, 试证明

(1) 当 $p > 1$ 时, 级数绝对收敛; (2) 当 $0 < p \leq 1$ 时, 级数条件收敛;

解: 1) 当 $p > 1$ 时, 因为 $\left| (-1)^n \frac{\sin^2 5n}{n^p + \alpha} \arctan 5n \right| \leq \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{n^p + \alpha} \leq \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{n^p}$,

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{n^p}$ 收敛, 由比较级数判别法, 故原级数绝对收敛。-----2 分

2) 当 $0 < p \leq 1$ 时,

$$\left| (-1)^n \frac{\sin^2 5n}{n^p + \alpha} \arctan 5n \right| = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{n^p + \alpha} \arctan 5n - \frac{\cos 10n}{n^p + \alpha} \arctan 5n \right]$$

根据 Dirichlet 判别法和 Abel 判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 10n}{n^p + \alpha} \arctan 5n$ 是收敛的。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^p + \alpha} \arctan 5n}{\frac{1}{n^p}} = \frac{\pi}{2}, \quad \text{由比较判别法的极限形式, 知}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p + \alpha} \arctan 5n \text{ 是发散的, 故原级数不绝对收敛。} \quad \text{-----4 分}$$

又

$$(-1)^n \frac{\sin^2 5n}{n^p + \alpha} \arctan 5n = \frac{1}{2} \left[(-1)^n \frac{1}{n^p + \alpha} \arctan 5n - (-1)^n \frac{\cos 10n}{n^p + \alpha} \arctan 5n \right]$$

$$\text{同前知 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos 10n}{n^p + \alpha} \arctan 5n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(10 + \pi)n}{n^p + \alpha} \arctan 5n \text{ 收敛。}$$

$$\text{根据 Leibniz 判别法, } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^p + \alpha} \text{ 收敛,}$$

$$\text{由 Abel 判别法 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^p + \alpha} \arctan 5n \text{ 收敛}$$

故原级数条件收敛。 -----4 分

五、(本题 10 分)

设 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续 ($n = 1, 2, \dots$), $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 (a, b) 内一致收敛. 求证 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续.

证明: 因 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 (a, b) 内一致收敛, 所以 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 对 $\forall p > 0$ 都

$$\text{有 } |u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \dots + u_{n+p}(x)| < \varepsilon \quad \text{-----2 分}$$

因为 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 所以让上式两边 $x \rightarrow a$ 得

$$|u_{n+1}(a) + u_{n+2}(a) + \dots + u_{n+p}(a)| \leq \varepsilon \quad \text{-----1 分}$$

从而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(a)$ 收敛, 同理 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(b)$ 收敛。-----2 分

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛, 记和函数为 $S(x)$, 即 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 。-----1 分

由前面的证明和柯西收敛原理知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于和函数 $S(x)$ 。-----2 分

因为 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 所以和函数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 从而一致连续。

-----2 分

六、(本题 10 分)

证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} [nxe^{-nx} - (n-1)xe^{-(n-1)x}]$ 在区间 $[0, 1]$ 上不一致收敛, 但其和函数在 $[0, 1]$ 上连续。

证明: 设 $u_n(x) = nxe^{-nx} - (n-1)xe^{-(n-1)x}$, 则

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x) = \sum_{k=1}^n [kxe^{-kx} - (k-1)xe^{-(k-1)x}] = nxe^{-nx}。$$

$$\text{当 } x \in (0, 1] \text{ 时, } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} nxe^{-nx} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx}{e^{nx}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{tx}{e^{tx}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^{tx}} = 0$$

$$\text{当 } x=0 \text{ 时, 因为 } S_n(x) \equiv 0, \text{ 所以 } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = 0$$

故当 $x \in [0, 1]$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = 0 \stackrel{\Delta}{=} S(x)$, 即原函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 的和函数为

$S(x) \equiv 0$, 它显然是 $[0, 1]$ 上的连续函数。

$$\text{但 } S_n(x) = nxe^{-nx} \text{ 对任给的 } n, \text{ 都可以取 } x_n = \frac{1}{n}, \text{ 则 } S_n(x_n) = n \frac{1}{n} e^{-n \cdot \frac{1}{n}} = e^{-1},$$

$\beta_n = \sup |S_n(x_n) - S(x)| \geq \sup S_n(x_n) = e^{-1}$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n \geq e^{-1} > 0$, 故原级数在 $[0, 1]$ 上不一致收敛。

七、(本题 10 分)

(1) 试求函数 $f(x, y, z) = x^a y^b z^c$ 在 $x + y + z = 1$ 下的最大值, 其中 a, b, c 为任意正实数;

(2) 从 (1) 的结果证明对六个正数有不等式

$$\left(\frac{u}{a}\right)^a \left(\frac{v}{b}\right)^b \left(\frac{w}{c}\right)^c \leq \left(\frac{u+v+w}{a+b+c}\right)^{a+b+c}.$$

解: 构造 Lagrange 函数 $L(x, y, z, \lambda) = a \ln x + b \ln y + c \ln z + \lambda(x + y + z - 1)$ ---2 分

$$\text{解方程组} \quad \begin{cases} L_x(x, y, z, \lambda) = \frac{a}{x} + \lambda = 0 \\ L_y(x, y, z, \lambda) = \frac{b}{y} + \lambda = 0 \\ L_z(x, y, z, \lambda) = \frac{c}{z} + \lambda = 0 \\ L_\lambda(x, y, z, \lambda) = x + y + z - 1 = 0 \end{cases}, \quad \text{-----2 分}$$

得唯一驻点 $x_0 = \frac{a}{a+b+c}, y_0 = \frac{b}{a+b+c}, z_0 = \frac{c}{a+b+c}$. ----1 分

原函数 $f(x, y, z) = x^a y^b z^c$ 在 (x_0, y_0, z_0) 的值为 $\left(\frac{a}{a+b+c}\right)^a \left(\frac{b}{a+b+c}\right)^b \left(\frac{c}{a+b+c}\right)^c$ 。现

在考虑其在定义域 $x + y + z = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 上的取值情况, 易知其在三个边界:

$\{x + y = 1, z = 0\}, \{x + z = 1, y = 0\}, \{z + y = 1, x = 0\}$ 上取值恒为零, 故知函数

$f(x, y, z) = x^a y^b z^c$ 在 $x + y + z = 1$ 下的最大值就是

$$f(x_0, y_0, z_0) = \left(\frac{a}{a+b+c}\right)^a \left(\frac{b}{a+b+c}\right)^b \left(\frac{c}{a+b+c}\right)^c \quad \text{-----2 分}$$

取 $x = u, y = v, z = w$, 则 $u^a v^b w^c$ 在 $u + v + w = 1$ 下的最大值就是上值, 即

$$u^a v^b w^c \leq \left(\frac{a}{a+b+c}\right)^a \left(\frac{b}{a+b+c}\right)^b \left(\frac{c}{a+b+c}\right)^c$$

两边同除以 $a^a b^b c^c$ 得

$$\begin{aligned} \left(\frac{u}{a}\right)^a \left(\frac{v}{b}\right)^b \left(\frac{w}{c}\right)^c &\leq \left(\frac{1}{a+b+c}\right)^a \left(\frac{1}{a+b+c}\right)^b \left(\frac{1}{a+b+c}\right)^c \\ &= \left(\frac{1}{a+b+c}\right)^{a+b+c} = \left(\frac{u+v+w}{a+b+c}\right)^{a+b+c} \end{aligned} \quad \text{-----2 分}$$

在 $u = x_0, v = y_0, w = z_0$ 时等号成立。-----1 分