

北京航空航天大学

2019 - 2020 学年 第一学期期末考卷

《工科数学分析 (I) 》

(A 卷)

班号 _____ 学号 _____ 姓名 _____

主讲教师 _____ 考场 _____ 成绩 _____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
成 绩								
阅卷人								
校对入								

2020 年 1 月 6 日

一、 选择题（每题 4 分，满 24 分）

1. 设 $f''(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $f(0)=1$, $f(2)=3$, $f'(2)=5$, 则 $\int_0^1 xf''(2x)dx = (\text{A})$.

- A. 2; B. 6; C. 5; D. 1.

2. 设 $f(x) = \int_{-\frac{\pi}{2}}^x \sqrt{\cos t} dt$, 则曲线 $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上的弧长为 (D).

- A. 1 B. $\ln 2$ C. $\ln 3$ D. 4.

3. 下列广义积分中, 收敛的是 (C).

- A. $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x+1}}$ B. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{1+x^2}$ C. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{1+x}}$ D. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^3}}$.

4. 曲线 $y = \frac{a}{2}(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}})$ ($a > 0$) 在 $x=0$ 处的曲率 $k = (\text{C})$

- A. $\sqrt{2}a$ B. $2a$ C. $\frac{1}{a}$ D. 0

5. 设函数 $f(u) = \int_0^u \cos(u-t)^2 dt$, 令 $F(x) = \int_0^x f(u) du$, 则 $F''(x) = (\text{B})$.

- A. $\int_0^x \cos(u-t) dt$ B. $\cos x^2$ C. $-\cos x^2$ D. 1.

6. 下列叙述中正确的是 (A)

A. 若 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上单调递增的函数, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积

B. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必存在原函数

C. 若广义积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

D. 若对任意 $A > 0$, 积分 $\int_0^A f(x) dx$ 有界, 且有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$,

则广义积分 $\int_0^{+\infty} f(x) g(x) dx$ 收敛.

二、 计算题（每题 6 分，满分 18 分）

1. $\int x \arctan x \, dx$.

解： $\int x \arctan x \, dx = \frac{1}{2} x^2 \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} dx$ -----3 分

$$= \frac{1}{2} x^2 \arctan x - \frac{1}{2} \int \left(\frac{x^2+1}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2} \right) dx$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \arctan x - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \arctan x + C$$
 -----6 分

2. $\int_0^2 \frac{1}{1+e^x} dx$.

解：法一：

$$\int_0^2 \frac{1}{1+e^x} dx = \int_0^2 \frac{(1+e^x - e^x)}{1+e^x} dx = \int_0^2 \left(1 - \frac{e^x}{1+e^x} \right) dx$$
 -----3 分

$$= [x - \ln(1+e^x)] \Big|_0^2 = 2 + \ln \frac{2}{1+e^2}.$$
 -----6 分

法二： $\int_0^2 \frac{1}{1+e^x} dx = \int_0^2 \frac{e^{-x}}{e^{-x}+1} dx = - \int_0^2 \frac{1}{e^{-x}+1} d(e^{-x}+1)$ -----3 分

$$= -\ln(e^{-x}+1) \Big|_0^2 = \ln 2 - \ln(1+e^{-2})$$
 -----6 分

法三：令 $e^x=t$, $\int_0^2 \frac{1}{1+e^x} dx = \int_1^{e^2} \frac{1}{1+t} \frac{1}{t} dt$ -----3 分

$$= \int_1^{e^2} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{1+t} \right) dt = [\ln t - \ln(1+t)] \Big|_1^{e^2} = 2 + \ln \left(\frac{2}{1+e^2} \right)$$
 -----6 分

注：答案写成 $2 - \ln(1+e^2) + \ln 2$. 等不同形式

3. $\int_{-1}^1 (\sin x^{2019} + x^{2020}) \cos(x^{2021}) dx$

解：由 $\sin x^{2019} \cos(x^{2021})$ 是奇函数及对称性知 $\int_{-1}^1 (\sin x^{2019}) \cos(x^{2021}) dx = 0$ -----2 分

所以

$$\int_{-1}^1 (\sin x^{2019} + x^{2020}) \cos(x^{2021}) dx = \int_{-1}^1 x^{2020} \cos(x^{2021}) dx = \frac{1}{2021} \int_{-1}^1 \cos(x^{2021}) dx^{2021}$$
 -----4 分

$$= \frac{1}{2021} (\sin(x^{2021})) \Big|_{-1}^1 = \frac{2 \sin 1}{2021}$$
 -----6 分

三、 计算证明题（每小题 6 分，满分 18 分）

1. 指出瑕积分 $\int_0^1 \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}}$ 中的瑕点并计算积分值.

解： $x=1$ 是瑕点 -----2 分

令 $\sqrt{1-x}=t$ 原式 $= \int_1^0 \frac{-2t}{(1+t^2)t} dt$

$= 2 \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt = 2(\arctan t) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2}$ -----6 分

2. 求方程 $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^2$ 的通解.

解：此为一阶线性微分方程 其中 $P(x) = -\frac{2}{x+1}, Q(x) = (x+1)^2$ -----2 分

带入公式

$y(x) = e^{-\int P(x)dx} [\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C]. \quad y(x) = (x+1)^2(x+C).$ ----6 分

3. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1+x^2}} dx$

解法 1: $0 \leq \frac{x^n}{\sqrt{1+x^2}} \leq x^n \Rightarrow 0 \leq \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1+x^2}} dx \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$, 夹逼定理得极限为 0

解法 2: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1+x^2}} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\xi^2}} \int_0^1 x^n dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\xi^2}} \cdot \frac{1}{1+n} = 0$

四、(本题 8 分) 求微分方程 $y'' - y' - 2y = (1-2x)e^x$ 的通解.

解：该方程对应的特征方程 $p^2 - p - 2 = 0$ 的解为 $p_1 = -1, p_2 = 2$,

所以齐次方程的通解为

$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x}$ -----3 分

因为 $\lambda=1$ 不是特征方程的根，所以设非齐次微分方程的特解为

$y^* = (Ax + B)e^x$ -----4 分

将 $(y^*)' = Ae^x + (Ax + B)e^x, (y^*)'' = 2Ae^x + (Ax + B)e^x$

代入非齐次方程，整理后得： $-2Ax + (A - B) = 1 - 2x$

解得： $A=1, B=0$ -----7 分

所以所求方程通解为 $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x} + xe^x$ -----8 分

五、(本题 12 分) 求圆 $(x-b)^2 + y^2 \leq a^2 (0 < a < b)$, 绕 y 轴旋转一周，所得旋转体的体

积和表面积.

解: 以 y 作为积分变量, $-a \leq y \leq a$, 记 $x_1(y) = b + \sqrt{a^2 - y^2}$, $x_2(y) = b - \sqrt{a^2 - y^2}$,

旋转体体积为:

$$V = \pi \int_{-a}^a (b + \sqrt{a^2 - y^2})^2 dy - \pi \int_{-a}^a (b - \sqrt{a^2 - y^2})^2 dy \quad \text{-----2 分}$$

$$= 4\pi b \int_{-a}^a \sqrt{a^2 - y^2} dy = 8\pi b \int_0^a \sqrt{a^2 - y^2} dy = 2\pi^2 a^2 b. \quad \text{-----6 分}$$

旋转体表面积为:

$$S = 2\pi \int_{-a}^a x_1(y) \sqrt{1 + (x_1')^2} dy + 2\pi \int_{-a}^a x_2(y) \sqrt{1 + (x_2')^2} dy \quad \text{-----8 分}$$

$$= 2\pi \int_{-a}^a (b + \sqrt{a^2 - y^2}) \sqrt{1 + \left(\frac{-y}{\sqrt{a^2 - y^2}}\right)^2} dy + 2\pi \int_{-a}^a (b - \sqrt{a^2 - y^2}) \sqrt{1 + \left(\frac{y}{\sqrt{a^2 - y^2}}\right)^2} dy$$

$$= 8\pi ab \int_0^a \frac{dy}{\sqrt{a^2 - y^2}} = 8\pi ab \arcsin \frac{y}{a} \Big|_0^a = 4\pi^2 ab \quad \text{-----12 分}$$

六、(本题 10 分) 设广义积分为

$$\int_1^{+\infty} \frac{e^{\sin x} \cos x}{x^p} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x dx \quad (p > 0)$$

指出并证明无穷广义积分绝对收敛和条件收敛时所对应的参数 p 的取值范围.

解:

$$(1) \text{ 当 } p > 1 \text{ 时, 由于 } \left| \frac{e^{\sin x} \cos x}{x^p} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right| \leq \frac{e}{x^p},$$

由比较判别法可知, 此时广义积分绝对收敛.

-----3 分

(2) 当 $0 \leq p \leq 1$ 时,

对任意 $A > 1$, $\left| \int_1^A e^{\sin x} \cos x dx \right| = |e^{\sin x}|_1^A = |e^{\sin A} - e^{\sin 1}| < 2e$, 有界

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{1}{x^p}$ 单调递减且极限为 0

由 Dirichlet 判别法可知 $\int_1^{+\infty} \frac{e^{\sin x} \cos x}{x^p} dx$ 收敛,

-----5 分

$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调有界,

由 Abel 判别法可知, 此时广义积分收敛.

-----6 分

$$(3) \left| \frac{e^{\sin x} \cos x}{x^p} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right| > \frac{1}{e} \frac{\cos^2 x}{x^p} = \frac{1}{2ex^p} + \frac{\cos 2x}{2ex^p}$$

-----8 分

当 $0 \leq p \leq 1$ 时, $\int_1^{+\infty} \frac{1}{2x^p} dx$ 发散, 由 Dirichlet 判别法可知 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x^p} dx$ 收敛,

所以当 $0 < p \leq 1$ 时, $\int_1^{+\infty} \frac{(1+\frac{1}{x})^x \cos x}{x^p} dx$ 发散.

即 $0 < p \leq 1$ 时, $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x(9 + \arctan x)}{x^p} dx$ 条件收敛.

-----10 分

七、(本题 10 分, 每题 5 分)

(1) 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数, 证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

证明 根据有限闭区间上连续函数的性质, 若 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则必一致连续. 根据一致连续函数的性质, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 对 $[a, b]$ 中任意两点 x', x'' , 只要 $|x' - x''| < \delta$, 就有

$$|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

----- 2 分

因此只要 $[a, b]$ 上的分割 T 满足 $\|T\| < \delta$, 则 $f(x)$ 在任一小区间 Δ_i 上的振幅满足

$$\omega_i = M_i - m_i = \sup_{x', x'' \in \Delta_i} |f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{b-a},$$

所以有 $\sum_T \omega_i \Delta x_i \leq \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_T \Delta x_i = \varepsilon$.

所以 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

-----5 分

(2) 求极限 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (1 + \frac{k}{n}) \sin \frac{k\pi}{n^2}$

解: 对于一切 $k < n, n > 3$,

$$0 \leq \frac{k\pi}{n^2} - \sin \frac{k\pi}{n^2} \leq \tan \frac{k\pi}{n^2} - \sin \frac{k\pi}{n^2} \leq \tan \frac{k\pi}{n^2} (1 - \cos \frac{k\pi}{n^2}) \leq \frac{2k\pi}{n^2} (1 - \cos \frac{\pi}{n}), \quad \text{----2 分}$$

所以

$$0 \leq \sum_{k=1}^{n-1} (1 + \frac{k}{n}) (\frac{k\pi}{n^2} - \sin \frac{k\pi}{n^2}) \leq \sum_{k=1}^{n-1} (1 + \frac{k}{n}) \frac{2k\pi}{n^2} (1 - \cos \frac{\pi}{n}) \leq 2\pi (1 - \cos \frac{\pi}{n}) \rightarrow 0.$$

则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (1 + \frac{k}{n}) \sin \frac{k\pi}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (1 + \frac{k}{n}) \frac{k\pi}{n^2} = \int_0^1 (1+x) \pi x dx = \frac{5\pi}{6}$ -----5 分