

Selvforståelseskursus del 3

Generelt er autister ikke gode til at mærke deres krop. At man ikke mærker/lægger mærke til at noget generer betyder ikke at det ikke stresser eller gør ens liv dårligere end det kunne være, jf. bilaget fra sidst.

Det kan derfor være en god ide at udvikle vaner og regelmæssige tjek, så det ikke er helt så nødvendigt at tjekke sig selv og sit velbefindende *hele* tiden.

Periodiske tjek kan se på om man har tøj i sin garderobe der strammer eller kradser eller om ens sko er gode. Det kan virke uoverskueligt at skaffe sig noget nyt, og hvad nu hvis det ikke er slidt og ... og ... og ... , men en kort indsats kan fjerne meget stress her. Med genbrugsbutikker er det også i orden at give godt tøj videre, selv om det kunne bruges længe endnu.

(Når man nu er i gang, kan man overveje at gøre som Steve Jobs og andre overachievers, der har fjernet kognitiv belastning ved kun at have én slags trøjer, én slags bukser og én slags sokker. Det betyder at der er en ting mindre at tage stilling til hver morgen, og man har så mere båndbredde til de sjove ting, der betyder noget for en. At andre har en anden mening om hvordan man bør gå klædt er deres problem. Klæder man sig alt for afvigende kan man dog få så negative reaktioner at gevinsten forsvinder og det i sig selv genererer stress...

Omvendt kan nørdet tøj virke som et idiot-filter, da folk man alligevel ikke kan kommunikere med, går i en stor bue uden om en. Kunsten er at finde behageligt tøj der ikke afføder negative reaktioner, men stadig sender positive/neutrale signaler til sympatiske personer og afskrækker mindre sympatiske personer.)

Denne del af selvforståelseskurset handler om ting man kan gøre for at få det bedre og mindske unødigt stress.

Det gælder om at skifte fokus fra *Hvad har jeg lyst til?* og mere over mod *Hvad har jeg brug for?*.

I starten kan det føles begrænsende og som noget andre ikke skal bestemme, så det er vigtigt at få det vendt rigtigt inde i hovedet:

Man skal ikke gøre det fordi andre siger det, man skal gøre det fordi *man selv* får det bedre.

Det vil ikke føles sådan i starten, men det kommer.

Man skal ikke tro på det, men teste hypotesen en måned.

Prøv at følge rådene til punkt og prikke i en måned, og se om du ikke rent faktisk har fået det bedre.

- Hvis du har fået det bedre er alt godt, og der er ikke nogen grund til at stoppe igen.
- Hvis det er det samme og de nye vaner ikke begrænser dig, når du først har vænnet dig til dem, siger videnskaben at du vil leve længere og bedre, selv om du ikke kan mærke det. Så kan man lige så godt fortsætte.
- Hvis du har fået det værre er der ingen grund til at fortsætte, men det kan være en god ide at tale med nogen om hvorfor noget der er sundt, får dig til at få det dårligere...

De 5 dopaminfremmere (eller de 5 cortisoldræbere)

Dopamin er et stof der er godt at have i hjernen, da det hjælper med velvære og andre gode ting. Cortisol er et stresshormon, som er godt i små mængder en gang imellem, men som er skadeligt hvis man har det i store mængder eller gennem længere tid.

1) Kost

Vores blodsuktermængde afhængigt af hvor meget og hvor tit vi spiser. Både for højt og for lavt blodsukker giver en reaktion fra amygdala, som frigiver adrenalin i begge tilfælde.

Det er derfor næsten lige så vigtigt for folk med ADHD og autisme at have stabilt blodsukker som det er for diabetikere, da man som autist ikke er god til at lægge mærke til sine kropslige reaktioner og derfor kan blive ekstra stresset uden grund, hvis man blot har glemt at spise eller har spist for meget uden at lægge mærke til det. Koncentrationen er også meget afhængigt af blodsukkeret, og stabilt blodsukker betyder derfor også noget i forhold til ADHD.

Man bør stræbe efter at få 75 % af sin energi til hovedmåltiderne morgenmad, frokost og aftensmad, og 25 % til mellemmåltiderne om formiddagen, eftermiddagen og om aftenen.

Med et energiforbrug pr. dag på ca. 10 MJ for mænd og 8 MJ for kvinder skal man altså have 2500 kJ (2000 kJ) til hovedmåltiderne og 830 kJ (660 kJ) til mellemmåltiderne. Et mellemmåltid kan derfor være en lille skål havregryn og et stykke frugt.

Man skal helst undgå sukker, da det brænder af for hurtigt. Det kan føles lidt kedeligt, men efterhånden som blodsukkeret bliver stabilt, skulle trangen til *Søde sager NU!* blive mindre. Der kommer masser af forslag hvis man googler "mellemmåltid".

Når man lige har spist noget, kan det føles som om det er alt for lidt (*Det smagte af en til!*), men tager man det roligt, går trangen til mere som regel over i løbet af 5-10 minutter.

Skal man have omkring 8 timers søvn er der 16 vågne timer og det betyder at der skal gå ca. 2,5-3 timer mellem hvert måltid. Det kan kræve lidt planlægning at have et mellemmåltid med, hvis man ikke er hjemme.

Det sidste mellemmåltid skal helst indtages et par timer før man skal sove, hvilket typisk vil sige kl. 20. Det er derfor godt at stræbe efter at spise aftensmad tidligt, dvs. omkring kl. 18.

Man bør s'fæli også drikke noget til hvert (mellem-)måltid, så man ikke bliver tørstig i løbet af dagen. Dehydrering mindsker ens kognitive evner og er nem at overse.

2) Motion

Det har en positiv effekt hvis man gør det, i modsætning til punktet om kost, hvor det er aktivt skidt hvis man ikke får det gjort.

Får man dyrket motion sover man bedre og man forbrænder cortisol. Høj puls hjælper derfor direkte med at fjerne stress.

Målet er 20 minutter om dagen med høj puls, men *alt* er bedre end ingenting.

Det tager 1-2 måneder at skabe en ny vane, så første mål er at få skabt tid til motion og vænne sig til tanken. Derefter fylder man indhold på.

Om det passer bedst om morgenen før job/skole, eller om eftermiddagen efter job/skole må man finde ud af. Det er ikke godt at dyrke hård motion om aftenen, for så kan det være svært at sove. Der skal gå et par timer mellem motionen, og at man går i seng. Der skal nok sættes mere end 20 minutter af, da man også skal have tid til at komme i gang/frem og tilbage og måske at komme i bad bagefter.

Til at starte med skal man fokusere på at bruge tid hver dag for at vænne sig til tanken. Niveaueet skal absolut hellere være for lavt end for højt, så man ikke løber sur i det eller pådrager sig skader, der kan bruges som undskyldning for ikke at bevæge sig en uge eller to, til man har glemt at man havde sat sig et mål.

Man kan starte med 1 armbøjning om dagen den første uge, og så stige til 2 armbøjninger om dagen den anden uge. Har man ikke energi til en lang gåtur starter man med at gå rundt i stuen den første uge.

Det vigtige er at komme i gang og at holde fast. At føre logbog over ens fremskridt kan være en rigtig god ide, da det kan hjælpe en med at huske hvad man kom fra og/eller dokumentere at man ikke har været så aktiv som man har troet. (Har jeg kun bevæget mig *en* gang i sidste uge?? Jeg synes kun det var en gang jeg sprang over...)

Motionsspil som Wii Fit eller andre konsolspil er en mulighed. Man kan faktisk få en motionscykel der kan sluttes til Wii'en.

Går man til fodbold eller anden krævende sport, kan de 20 minutter samles til 3 gange om ugen, men det er næppe realistisk at starte her.

Man behøver ikke at gå til traditionelle sportsgrene som fodbold og håndbold. At gå/løbe/cykle/løbe på rulleskøjter eller svømme er mindst lige så godt – hvis man får det gjort.

Kampsport appellerer typisk mere til autister end holdsport som fodbold eller volleyball, da man ikke er så afhængig af andre. I Tai Chi er der ofte meget lidt eller ingen kropskontakt.

3) Søvn

Hvis vi ikke får søvn nok bliver vi træge og dumme. Efter 24 timer uden søvn fungerer man på niveau der svarer til en promille på 0,1 – dvs over promillegrænsen for at køre bil.

Hvor meget er så ”nok”? Det afhænger af personen, og det aftager med alderen:



De magiske 8 timer er nok en middelværdi af de 7-9 timer de fleste voksne behøver, så man bør finde sit personlige behov. Det kan gøres ved at føre søvndagbog en måned eller to og tage et gennemsnit, eller også kan man bruge tommelfingerreglen at hvis man har brug for vækkeur alle morgener, får man nok for lidt søvn. Hvis man regelmæssigt er svimmel når man lukker øjnene, får man helt bestemt for lidt søvn og bør gøre noget ved det!

Jeg troede i en periode at jeg kunne klare mig med 5-6 timers søvn, men ved at føre søvndagbog viste det sig at jeg indhentede det i weekenden, så mit gennemsnit blev 7,5 timer pr. nat. Det har jeg så forsøgt at ramme siden. Søvnunderskud giver nemlig øgede mængder af stresshormonet cortisol

og skader ens immunforsvar. Desuden får man ”socialt jetlag”, hvis man sover for lidt i ugen og indhenter det i weekenden, og der er ting der tyder på at det er næsten lige så usundt som skifteholdsarbejde.

Ens ”søvntryk” bygges op i løbet af dagen fordi man får større mængder af hormonerne GABA og melatonin indtil lidt før midnat. Derefter falder kroppens indhold af GABA og melatonin. Det gælder derfor om at falde i søvn når hormonerne topper. Skal man op kl. 6 og skal man have 8 timers søvn betyder det at man skal ligge i sin seng kl. 22. Man bør geare ned ca. en halv time før man skal sove for at sove godt, så allerede kl. 21³⁰ skal man til at begynde at gå i seng. Det kan betyde at aftensmaden skal planlægges tidligere end man er vant til, for at få en aften.

Hvis man falder i søvn i samme øjeblik ens hoved rammer puden, får man for lidt søvn. Det bør tage 5-15 minutter at falde i søvn.

Ting der giver dårlig søvn er at komme for sent i seng, alkohol og blå lys fra skærme.

Kommer man for sent i seng vågner man paradoksalt nok for tidligt og man sover dårligere.

Nyere forskning viser at alkohol efter kl. 17 kan give dårlig søvn sidst på natten, selv om al alkoholen er omsat når man går i seng. Alkoholens nedbrydningsprodukter er stadig i kroppen og de forstyrrer også søvnkvaliteten. Virkningen bliver større med alderen, så der er simpelthen en fysiologisk grund til at folk over 30 ikke fester igennem på samme måde som da de var 20 år.

Naturligt dagslys bliver rødere hen mod aften, da solskinnet skal igennem mere og mere luft. Luft spreder den blå del af spektret, så aftenlys indeholder ikke så meget blå lys. Vores krop er udviklet til at få input fra omgivelserne og mindre blå lys gør os klar til at sove. Omvendt bliver vi speedet af blå lys og får svært ved at sove. Det er blevet et problem i takt med at vi ser mere og mere fjernsyn og ser på telefon og tabletskærme, da de udsender en del blå lys.


En del af det at geare ned til natten er derfor at begrænse skærmtiden to timer før man skal sove, eller i det mindste ændre farven på skærmen så den udsender mindre blå lys. Til Android er der et udmærket program der hedder *Twilight* og findes lignende programmer til iOS. Nogle fjernsyn har en ”biografitilstand” og ellers kan man justere farven manuelt. Mange fjernsyn har mulighed for farveprofiler, så det er nemt at skifte. Læser man meget på sin tablet er det måske værd at investere i en ebogslæser. Skærmen lyser ikke og den bruger mindre strøm. Der kan nu købes LED-pærer til lamper og læselamper som man kan styre fra sin smartphone, så de automatisk ændrer farve når det bliver aften. De er dog stadig dyre og man skal nok få professionel rådgivning før man investerer.

Har du sovet godt?

Det kan føles som om man ikke har sovet godt lige når man vågner, men det behøver ikke at være rigtigt. Søvn består af forskellige faser, og vågner man midt i en fase med dyb søvn kan man føle sig groggy i op til en time, selv om man ellers har sovet godt.

Det er heller ikke nødvendigvis et problem at man er vågnet mange gange i løbet af natten, hvis det er sket kortvarigt mellem søvnfaserne.

På figuren viser den røde kurve hvor dybt man sover på forskellige tidspunkter af natten og søvnfaserne er forklaret:



Man kan også komme ud for at blive vækket af en lyd, for eksempel en fugl der skræpper eller en bil der kører forbi. Det sætter hjernen i alarmberedskab, men ofte har man ikke registreret hvad det var der vækkede en. Hjernen begynder derfor at lede efter en grund, og er man stresset og bekymret finder den hurtigt noget der kunne være årsag til at man vågnede.

Logikken er "Jeg vågnede og er i alarmberedskab. Jeg er bekymret over ... , så det var nok det der vækkede mig. Derfor må jeg prøve at løse det!".

Klokken 3 om natten er bare ikke det rigtige tidspunkt at løse problemer på, så i stedet bør man sige til sig selv, at det nok var noget uvigtigt der vækkede en og at man ikke skal til at tænke nu. Et godt trick er at begynde at trække vejret dybt og så prøve at mærke hænder og fødder og måske slappe af i dem. Man kan også løfte hovedet en anelse og lade det falde på plads, så man ikke ligger og spænder i nakken. Det er bedre at koncentrere sig om at få kroppen til at ligge godt og slappe af end at prøve at løse problemer. Oftest kommer man ikke videre alligevel, og de gange hvor man finder en løsning, kan man som regel ikke huske detaljerne i løsningen når man vågner...

Det kan være en ide at have en blok liggende ved sengen til at notere ting ned man kommer i tanke om – ellers kan man være så nervøs for at glemme det igen, at man ikke kan falde i søvn igen.

4) Velvære

Det er vigtigt at prioritere lystbetonede aktiviteter der giver energi.

Er man stresset kan man synes at der ikke er tid til den slags, men jo mindre tid man har, jo mere har man brug for at slappe af og lade op. Det siges om Luther at han slappede af hver dag, men når han havde travlt slappede han af to gange!

Det er en god ide at *starte* med det sjove for at få energi og lade op.

For nogle af os er det et problem at stoppe det sjove igen fordi verden udenfor forsvinder helt når vi morer os. Det kan derfor være nødvendigt at planlægge hvor lang tid man skal more sig og få sat en alarm på telefonen – og så lægge den så langt væk at man skal rejse sig efter den...

5) Gode gerninger

Gode gerninger er noget man gør for andre uden at forvente at få noget igen.

Forskningen har vist at vi får endnu mere serotonin, som er et af de gode stoffer, ved at gøre noget godt for andre eller donere penge. Faktisk får vi mere serotonin af gode gerninger end ved at vinde eller tjene penge, som ellers antages at være det højst opnåelige i vide kredse.

Kudos kan man tænke på som en fiktiv valuta mellem mennesker. Man tjener kudos ved at gøre noget for andre som man ikke havde behovet. Jeg finder det nyttigt at føre et uformelt og meget omtrentligt kudosregnskab i mit eget hoved. Hvis jeg sørger for at have kudos-overskud i forhold til andre kan jeg gå og føle mig godt tilpas og hvis andre prøver at gøre mig usikker og forlange at jeg gør noget for dem, kan jeg tjekke mit kudos-regnskab og se om jeg har grund til at føle mig dårligt tilpas. Da kudos er fiktive kan de ikke bruges som argument!

Forskning viser også at sociale relationer betyder meget for os.

Det betyder ikke at mere er bedre, men at det gælder om at finde nogen man svinger med og så tilbringe "tilpas" meget tid med dem.

"Tilpas" er meget individuelt, men man skal ikke lave den fejlslutning at fordi man ikke kræver lige så meget socialt samvær som neurotypiske, så har man slet ikke brug for det. Igen er her et punkt hvor man må prøve sig frem.