

ETI – Aufgabenblatt 3

Hausaufgaben

Aufgabe 3.6

Methodik / Definition.

Ein GNFA hat zwischen je zwei Zuständen genau eine Kante, deren Beschriftung ein regulärer Ausdruck ist. Nicht vorhandene Kanten haben Beschriftung $\emptyset$.


Beim Eliminieren eines Zustands x ersetzt man für alle übrigen Zustände p, q die Kante

$$\gamma(p, q) \text{ durch } \gamma(p, q) \cup \gamma(p, x)\gamma(x, x)^*\gamma(x, q).$$


Danach wird x entfernt. Man wiederholt das, bis nur noch Start- und Endzustand übrig sind. Die Beschriftung der Kante vom Start- zum Endzustand ist der gesuchte reguläre Ausdruck.

Alle nicht eingezeichneten Kanten haben Beschriftung $\emptyset$.


Start-GNFA.




Eliminiere q_1 .



Eliminiere q_2 .



Eliminiere q_3 .



$$R = \varepsilon \cup 0(10)^*1 \cup 0(10)^*11 (000(10)^*11)^* (00 \cup 000(10)^*1).$$

Aufgabe 3.7

Methodik / Definition.

Pumping-Lemma zum Nachweis von Nicht-Regularität:

1. Annahme: Die Sprache ist regulär. Sei p die Pumping-Länge.
2. Wähle ein Wort s aus der Sprache mit $|s| \geq p$.
3. Betrachte eine beliebige Zerlegung $s = xyz$ mit $|y| > 0$ und $|xy| \leq p$.
4. Zeige für ein geeignetes i meistens $i = 0$ oder $i = 2$, dass xy^iz nicht mehr in der Sprache liegt.

Das ist ein Widerspruch. Also ist die Sprache nicht regulär.

Sei

$$A = \{w\#1^k \mid w \in \{0,1\}^*, w \text{ codiert die Zahl } k\}.$$

Wir zeigen mit dem Pumping-Lemma, dass A nicht regulär ist.

Beweis.

1. Annahme: A ist regulär. Sei p die Pumping-Länge.
2. Wähle

$$s = 10^p\#1^{2^p}.$$

Das Wort 10^p codiert die Zahl 2^p , also gilt $s \in A$. Außerdem ist $|s| \geq p$.

3. Sei $s = xyz$ eine Zerlegung gemäß Pumping-Lemma, also

$$|y| > 0 \quad \text{und} \quad |xy| \leq p.$$

Dann liegt y vollständig im vorderen Binärteil 10^p , also noch vor dem Zeichen $\#$. Setze $k = |y| \geq 1$.

4. Pumpe mit $i = 0$. Dann bleibt der rechte Teil $\#1^{2^p}$ unverändert, aber der Binärteil links von $\#$ wird kürzer.

Falls y die führende 1 enthält, besteht der neue Binärteil nur noch aus Nullen. Er codiert also nicht mehr 2^p . Falls y nur aus Nullen besteht, wird aus 10^p ein Wort der Form 10^{p-k} . Dieses codiert 2^{p-k} , und wegen $k \geq 1$ gilt $2^{p-k} \neq 2^p$.

5. In beiden Fällen codiert der linke Teil nach dem Pumpen nicht mehr die Anzahl der Einsen rechts von $\#$. Also gilt

$$xy^0z = xz \notin A.$$

Das ist ein Widerspruch zum Pumping-Lemma.

Folglich ist A nicht regulär.

Aufgabe 3.8

Methodik / Definition.

Das Pumping-Lemma ist nur eine notwendige Bedingung für Regularität. Wenn eine Sprache das Pumping-Lemma erfüllt, folgt daraus noch nicht, dass sie regulär ist.

Für Nicht-Regularität kann man Abschlusseigenschaften benutzen: Sind C und R regulär, dann ist auch $C \cap R$ regulär. Findet man ein reguläres R mit $C \cap R = B$, wobei B bekannt nicht regulär ist, dann kann C nicht regulär sein.

Wir schreiben

$$B = \{b^m a^{r^2} \mid m \geq 1, r \geq 0\}.$$

Dann ist

$$C = B \cup L(a^*) = B \cup \{a^n \mid n \geq 0\}.$$

1. C erfüllt die Bedingungen des Pumping-Lemmas

Wir zeigen direkt die Pumping-Eigenschaft. Wähle $p = 1$. Sei $w \in C$ mit $|w| \geq 1$.

Fall 1: $w \in L(a^*)$. Dann ist $w = a^n$ mit $n \geq 1$. Wähle

$$x = \varepsilon, \quad y = a, \quad z = a^{n-1}.$$

Dann gilt $|y| = 1 > 0$ und $|xy| = 1 \leq p$. Für alle $i \geq 0$ gilt

$$xy^i z = a^{n-1+i} \in L(a^*) \subseteq C.$$

Fall 2: $w \in B$. Dann ist $w = b^m a^{r^2}$ mit $m \geq 1$. Wähle

$$x = \varepsilon, \quad y = b, \quad z = b^{m-1} a^{r^2}.$$

Dann gilt wieder $|y| = 1 > 0$ und $|xy| = 1 \leq p$. Für $i \geq 0$ gilt

$$xy^iz = b^{m-1+i}a^{r^2}.$$

Falls $m - 1 + i \geq 1$, liegt dieses Wort in B . Der einzige andere Fall ist $m = 1$ und $i = 0$; dann ist

$$xy^0z = a^{r^2} \in L(a^*) \subseteq C.$$

Also gilt in jedem Fall $xy^iz \in C$ für alle $i \geq 0$.

Damit erfüllt C alle Bedingungen des Pumping-Lemmas.

2. C ist nicht regulär

Aus der Aufgabenstellung wissen wir, dass B nicht regulär ist. Betrachte die reguläre Sprache

$$R = L(b^+a^*) = \{b^ma^n \mid m \geq 1, n \geq 0\}.$$

Dann gilt

$$C \cap R = (B \cup L(a^*)) \cap R = B.$$

Denn $B \subseteq R$, aber $L(a^*) \cap R = \emptyset$, da Wörter aus R mindestens ein b enthalten.

Angenommen, C wäre regulär. Dann wäre auch $C \cap R$ regulär, weil reguläre Sprachen unter Schnitt abgeschlossen sind. Also wäre B regulär. Das widerspricht der gegebenen Aussage, dass B nicht regulär ist.

Folglich ist C nicht regulär.