

# Eine Abfolge von Blockuniversen?

Harald Rieder

29. Januar 2022

## Inhaltsverzeichnis

Motivation	1
Blockuniversen ersetzen absolute Zeit	2
Die Rolle des Subjekts	5

## Motivation

Das Messproblem der Quantenmechanik entsteht aus der Vorstellung einer stetigen Entwicklung von mathematischen Größen in der als absolut angesehen gemeinsamen Zeit in Verbindung mit der Erfahrung, dass Kenntnis über das durch die mathematischen Größen beschriebene Quantending nur dann erlangt werden kann, wenn sich dabei dessen Zustand un stetig ändert. Dadurch sind zu jedem Zeitpunkt 2 verschiedene sich daran anschließende Arten von Zukünften möglich und niemand kann sagen, wann oder warum die eine oder die andere gewählt wird.

Dieses Paradoxon hat schon die besten Köpfe herausgefordert und der ein oder andere dachte sich, eine Lösung zu haben. Mitunter taucht die Denke auf, dass verschiedene Sichten auf die Quantenmechanik möglich seien, so genannte „Interpretationen der Quantenmechanik“, die am Ende doch nur eine Frage des Geschmacks seien. Wir werden hier diesen Weg nicht gehen. Statt dessen soll das Paradoxon dadurch aufgelöst werden, dass zu jedem Zeitpunkt nur eine Art von Zukunft möglich ist. Anstatt an der Vorstellung eines Zeitparameters, von dem Geschehen stetig abhängt, festzuhalten, werfen wir diese Vorstellung komplett über Bord. Es gibt einige gute Gründe, es auf diese Art zu versuchen:

1. Unterhalb der Planck-Zeit kann es keine stetige Zeitentwicklung mehr geben.
2. Eine Propagation des Geschehens durch lineare Operatoren, wie sie für die sich stetig anschließende Zukunft im Modell geschieht, treibt das Weltgeschehen eben *linear* weiter. Man kann schwerlich glauben, dass dadurch irgend etwas wie Lebendigkeit erfolgreich modelliert werden kann. Aus der klassischen Chaos-Theorie haben wir gelernt, dass nur eine nichtlineare Dynamik zu etwas führt, dass uns an Leben erinnert. Die unstetig sich anschließende Zukunft liefert uns dagegen eine nichtlineare Dynamik.

3. Um Kenntnis über ein Quantending zu erlangen ist ein Verlassen der stetigen Entwicklung notwendig. Die Dekohärenztheorie kann erklären, wie Information aus einem Quantending in seine Umgebung fließt unter der Annahme einer gemeinsamen stetigen Entwicklung. Doch wenn Kenntnis über Quantending und/oder Umgebung erlangt werden soll, ist ein unstetiger Schritt notwendig. Das *problem of outcomes* wird durch die Dekohärenztheorie nicht gelöst, und das ist das eigentliche Paradoxon.
4. Eine komplett neue Dynamik könnte erfunden werden. Das erscheint aber schwieriger, als einfach die Hälfte der Dynamik wegzwerfen.

Die Quantenmechanik liefert uns statistische Größen: Wahrscheinlichkeiten für Ereignisse. Wir haben gelernt, wie man Empfindungen mit den Ereignissen zu verknüpfen hat, die das mathematische Modell hergibt. Dabei hat sich herausgestellt, dass diese Theorie Häufigkeiten und Mittelwerte teilweise erschreckend genau liefern kann. Wenn die Hälfte der Dynamik über Bord geworfen werden soll, dann müssen dennoch die statistischen Aussagen der Theorie im experimentell gesteckten Rahmen erhalten bleiben. Ob dies überhaupt möglich ist, soll hier untersucht werden.

Die unstetige Dynamik hat die Eigenart, dass das Geschehen zum Erliegen kommt, wenn man immer nach derselben Information fragt. In traditioneller technischer Ausdrucksweise führt die Anwendung eines projektiven Messoperators zum „Kollaps“ des Zustandsvektors auf einen Eigenraum des Messoperators. Danach führt die Wiederholung der projektiven Messung zu keinem Verlassen des Eigenraums mehr. Um ein Geschehen allein mit der unstetigen Dynamik am Laufen zu halten benötigen wird deswegen wenigstens 2 unverträgliche Messoperatoren.

Während in gewöhnlicher Quantentheorie mit der Beobachtung üblicherweise Schluss ist, denn dann können die subjektiven Empfindungen gegen die Zahlen des mathematischen Modells verglichen werden, fordern wir ständige Beobachtungen, damit ein Geschehen überhaupt stattfinden kann. Da das menschliche Subjekt aber nur mit einer Seite der projektiven Messungen in Verbindung steht, sind ihm die anderen verborgen. Natürlich wäre es ontologisch das Einfachste anzunehmen, dass die anderen Messungen genauso wie die einen stattfinden, dass sie am Ende mit Empfindungen in Zusammenhang stehen, nur eben für andere Subjekte.

## Blockuniversen ersetzen absolute Zeit

Sei  $|\psi\rangle$  der Zustandsvektor einer Quantenwelt. Dann berechnet sich in der nichtrelativistischen Quantenmechanik die bedingte Wahrscheinlichkeit dafür, die Quantenwelt zur Zeit  $t_1$  im Zustand  $|\psi^{(1)}\rangle$  anzutreffen unter der Bedingung, dass sie zur Zeit  $t_0$  im Zustand  $|\psi^{(0)}\rangle$  war, zu

$$p^{(0) \rightarrow (1)} = \left| \langle \psi^{(1)} | \hat{U}(t_1 - t_0) | \psi^{(0)} \rangle \right|^2 \quad (1)$$

Dabei ist  $\hat{U}$  der unitäre Zeitentwicklungsoperator, der parametrisch von einem als absolut angesehenen Zeitparameter  $t$  abhängt. Wir beschränken uns hier auf nicht explizit zeitabhängige Welten, d.h.  $\hat{U}$  kann mit einem hermiteschen Operator  $\hat{H}$  in der Form

$$\hat{U}(t_1, t_0) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H} \cdot (t_1 - t_0)\right) \quad (2)$$

geschrieben werden.

———— diskret

Schrödi + 1 Kollaps

$$p^{(0) \rightarrow (1)} = \left| \sum_{x'x} \psi_{x'}^{(1)*} U(\Delta t)_{x'x} \psi_x^{(0)} \right|^2 \quad (3)$$

Elementares  $\Delta t$  Planck-Zeit  $\hat{U} = \hat{U}^{t/t_{Planck}}$

$$p^{(0) \rightarrow (1)} = \left| \sum_{x'x} \psi_{x'}^{(1)*} u_{x'x} \psi_x^{(0)} \right|^2 \quad (4)$$

1 Zwischenbasis, 2 Kollapse

$$|\psi\rangle^{(0)} = \sum_x \psi_x^{(0)} |x\rangle \otimes |t_0\rangle \quad |\psi\rangle^{(1)} = \sum_x \psi_x^{(1)} |x\rangle \otimes |t_1\rangle \quad (5)$$

Zwischenbasis  $\{|z\rangle\}$   $N \cdot M$  Elemente

$$|x\rangle \otimes |t\rangle = \sum_z V_{xtz} |z\rangle \quad |z\rangle = \sum_{xt} V_{zxt}^* |x\rangle \otimes |t\rangle \quad (6)$$

$$\langle x| \otimes \langle t| = \sum_z V_{zxt}^* \langle z| \quad \langle z| = \sum_{xt} V_{xtz} \langle x| \otimes \langle t|$$

$$p^{(0) \rightarrow (z)} = \left| \langle z| \hat{V} (|x\rangle \otimes |t_0\rangle) \right|^2 = \left| \sum_{xtx'} \psi_{x'}^{(0)} \langle x'| \otimes \langle t| V_{xtz} |x\rangle \otimes |t_0\rangle \right|^2 \quad (7)$$

$$p^{(0) \rightarrow (z)} = \left| \sum_x \psi_x^{(0)} V_{xt_0 z} \right|^2 \quad (8)$$

analog

$$p^{(z) \rightarrow (1)} = \left| \sum_x \psi_x^{(1)} V_{xt_1 z} \right|^2 \quad (9)$$

Gesamtübergangswahrscheinlichkeit

$$p^{(0) \rightarrow (1)} = \sum_z p^{(0) \rightarrow (z)} p^{(z) \rightarrow (1)} = \sum_z \left( \left| \sum_x \psi_x^{(1)} V_{xt_1 z} \right|^2 \left| \sum_x \psi_x^{(0)} V_{xt_0 z} \right|^2 \right) \quad (10)$$

$$p^{(0) \rightarrow (1)} = \sum_z \left| \sum_{x'x} \psi_{x'}^{(1)} V_{x't_1 z} V_{xt_0 z} \psi_x^{(0)} \right|^2 \quad (11)$$

Also

$$\boxed{\left| \sum_{x'x} \psi_{x'}^{(1)*} u_{x'x} \psi_x^{(0)} \right|^2 = \sum_z \left| \sum_{x'x} \psi_{x'}^{(1)} V_{x't_1 z} V_{xt_0 z} \psi_x^{(0)} \right|^2} \quad (12)$$

Ausmultipliziert links

$$\sum_{x'''x''x'} \psi_{x'''}^{(1)} \psi_{x''}^{(0)*} \psi_{x'}^{(1)*} \psi_x^{(0)} u_{x'''x''}^* u_{x'x} \quad (13)$$

rechts

$$\sum_{z x'''x''x'} \psi_{x'''}^{(1)} \psi_{x''}^{(0)*} \psi_{x'}^{(1)*} \psi_x^{(0)} V_{x'''t_1 z} V_{x''t_0 z}^* V_{x't_1 z}^* V_{xt_0 z} \quad (14)$$

Muss für alle  $|\psi^{(0)}\rangle$  und  $|\psi^{(1)}\rangle$  gelten, deshalb

$$\boxed{u_{x'''x''}^* u_{x'x} = \sum_z V_{x'''t_1 z} V_{x''t_0 z}^* V_{x't_1 z}^* V_{xt_0 z}} \quad (15)$$

Unitarität von  $u$  und  $V$  sind zusätzlich zu fordern!

$$\sum_{x''} u_{x'x''} u_{xx''}^* = \delta_{x'x} \quad \sum_z V_{x't'z} V_{xtz}^* = \delta_{x'x} \delta_{t't} \quad \sum_{xt} V_{xtz'} V_{xtz}^* = \delta_{z'z} \quad (16)$$

(2) diagonalisiert durch unitäre Matrix  $W$  im  $x$ -Unterraum. D.h. auf  $V$  wirkt  $W \otimes 1$ .

$$U_{x'xt't} = e^{i\varphi_x(t'-t)} \delta_{x'x} \quad (17)$$

$$\boxed{e^{i(\varphi_x - \varphi_{x''})(t'-t)} \delta_{x''x'} \delta_{x'x} = \sum_z V_{x''t'z} V_{x''tz}^* V_{x't'z} V_{xtz}} \quad (18)$$

$\varphi_x \in \mathbb{R}$   
 $V_{xtz} \in \mathbb{C}$   
 $x \in \{1, 2, \dots, N_x\}$   
 $t \in \{1, 2, \dots, N_t\}$   
 $z \in \{1, 2, \dots, N_x \cdot N_t\}$

Nur noch Unitarität von  $V$  ist zusätzlich zu fordern!

$$\sum_z V_{x't'z} V_{xtz}^* = \delta_{x'x} \delta_{t't} \quad \sum_{xt} V_{xtz'} V_{xtz}^* = \delta_{z'z} \quad (19)$$

———— ab hier überarbeiten

Wenn die Quantenzahlen kontinuierlich sind, dann drückt sich (1) in den Komponenten zu einer weiteren Basis  $f$  so aus<sup>1</sup>

$$p(x_1, t_1) \Big|_{x_0, t_0} = \left| \iint df df' x_1^*(f) U(t_1 - t_0, f, f') x_0(f') \right|^2 \quad (20)$$

Wenn wir von der parametrischen absoluten Zeit wegkommen wollen, dann wünschen wir uns so etwas wie

$$p(x_1, t_1) \Big|_{x_0, t_0} = \left| \langle x_1, t_1 | x_0, t_0 \rangle \right|^2 \quad (21)$$

womit die bedingte Wahrscheinlichkeit gemeint ist, die Quantenwelt in den Zustand  $|x_1, t_1\rangle$  zu bringen unter der Voraussetzung, dass sie im Zustand  $|x_0, t_0\rangle$  ist.  $x$  und  $t$  nummerieren nun gemeinsam die Zustandsvektoren so wie in relativistischen Quantenfeldtheorien. Jeder Zustandsvektor stellt ein bestimmtes Blockuniversum dar.

Jeder unstetige Übergang von einem Zustandsvektor zum nächsten wird in der Physik traditionell als *Messung* bezeichnet.

<sup>1</sup>Es ist  $x(f) \equiv \langle f | x \rangle$  und  $U(t, f, f') \equiv \langle f | \hat{U}(t) f' \rangle$ .

# Die Rolle des Subjekts

Subjektiv erleben wir Ereignisse in der (psychischen) Zeit.  $|x, t\rangle$  steht nun aber nicht für ein Ereignis der Erfahrung eines Zustands  $|x\rangle$  in der Zeit  $t$ , sondern im Allgemeinen für einen x,t-verschränkten Zustand<sup>2</sup>. Da das Subjekt keine Zustände erfährt, die in der Zeit verschränkt sind, muss es an der Messung in einer Weise beteiligt sein, so dass auf entschränkte Produktzustände projiziert wird. Das Subjekt muss also dafür sorgen, dass auf Produktzustände  $|x_i\rangle \otimes |t_i\rangle$  projiziert wird, wobei  $|t_i\rangle$  eine Zeiteigenfunktion<sup>3</sup> zum Zeiteigenwert  $t_i$  ist. Dadurch erfährt das Subjekt die physikalische Zeit  $t_i$  zusammen mit dem neuen Weltzustand  $|x_i\rangle$ . Wiederholt sich dies, dann erfährt das Subjekt eine Folge von Weltzuständen  $|x_i\rangle$ , die durch die Eigenzeiten  $t_i$  nummeriert sind, also bei genügender Feinheit des Prozesses vermeintlich eine quasikontinuierliche Abfolge  $|x(t)\rangle$ .

Sei  $|y_0\rangle$  ein Blockuniversum vor der Messung, oder in Komponenten zur Produktbasis  $f, t$  ausgedrückt  $y_0(f, t)$ . Dann ist die Übergangswahrscheinlichkeit (21) in einen subjektiv erfahrbaren Zustand  $|y_1\rangle = |x_1\rangle \otimes |t_1\rangle$

$$p(x_1, t_1) \Big|_{y_0} = \left| \iint df dt x_1^*(f) \delta(t - t_1) y_0(f, t) \right|^2 = \left| \int df x_1^*(f) y_0(f, t_1) \right|^2 \quad (22)$$

Vergleichen wir dies nun mit (20), dann lesen wir ab

$$y_0(f, t_1) = \int df' U(t_1 - t_0, f, f') x_0(f') \quad (23)$$

---

<sup>2</sup>Irgendeine Funktion zweier Veränderlicher  $f(x, t) \equiv \langle x, t | f \rangle$  zerfällt im Allgemeinen nicht in ein Produkt  $g(x)h(t)$  und ist damit im Allgemeinen x,t-verschränkt.

<sup>3</sup>in Komponenten also eine Delta-Distribution  $\delta(t - t_i)$