
Baseline cost of uniform sampling
Li–Sprott 4D, hyperchaos
p = 0.994
Chua II: cycle LC
p = 0.992
Rabinovich, r = 100
p = 0.763
Wang–Chen #2
p = 0.666
Jiang (c)
p = 0.572
Jahanshahi 4D: chaos
p = 0.512
Li–Sprott 4D: strange B
p = 0.464
Jiang (b)
p = 0.461
Li–Sprott 4D: strange A
p = 0.446
Li–Sprott 4D, a = 7: strange B
p = 0.441
Li–Sprott 4D, a = 7: strange A
p = 0.427
Jiang NF I g: cycle
p = 0.344
NE4
p = 0.33
Jiang NF I i: cycle
p = 0.221
Jiang (a)
p = 0.207
SE3
p = 0.153
Li–Sprott 4D, a = 7: cycle
p = 0.13
Wang–Chen #1
p = 0.103
Jiang SF I d
p = 0.1
Wei (NE2)
p = 0.0956
Li–Sprott 4D: torus
p = 0.0898
Jiang NF I f: cycle
p = 0.0892
Jiang SF I c
p = 0.079
Jiang SF I b
p = 0.0655
Jiang SF I a
p = 0.0649
Jiang NF I g
p = 0.0385
Jiang NF I i
p = 0.0333
Jiang NF I f
p = 0.0299
Jiang NF I e
p = 0.0279
Chua I: chaos B
p = 0.0185
Chua I: chaos A
p = 0.0168
Huynh 2019
p = 0.0091
Jafari 2026: cycle
p = 0.00905
SE11
p = 0.0079
LE1
p = 0.00156
Chua II: chaos A
p = 0.00142
Chua II: chaos B
p = 0.00126
Jafari 2026: chaos
p = 0.0002
10^1
10^3
10^5
$N_{0.9}$ (integrations), uniform sampling