

Hypernova Aerospace

ENMICE

Reporte de diseño de TonaQube

EQUIPO

Mejia Pérez Juan Manuel



1. Anetecedetes.

1.1. Introducción

TonaQube es la carga útil que se presentará en ENMICE. Consiste en un satélite educativo que sigue el factor de forma PocketQube y que su misión es la adquisición y distribución de señales ambientales para tener conocimiento sobre la calidad del aire en la región de lanzamiento y también funcionará como un satélite de observación de bajo costo.

1.2. Factor de forma PocketQube

El factor de forma PocketQube establece que una unidad debe cumplir con las siguientes características:

- 5 cm cúbicos
- Masa menor igual a 250g

La idea es que 8 unidades de PocketQube quepan dentro de una unidad de CubeSat. La Figura 1 muestra una ilustración de una unidad de PocketQube.




Figura 1: Fotografía de un PocketQube

Las ventajas de este tipo de satélite están en el costo, tiempo de desarrollo y la masa. Cuando se trata de enviar cosas al espacio, se cobra por Kg de masa que se envía. Por lo que una masa baja, reduce el costo de poner el satélite en el espacio para que cumpla su función. El tiempo de desarrollo de este tipo de satélites llega a reducirse hasta 1 año de desarrollo en comparación de los satélites convencionales que son gigantescas masas tecnológicas que llevan años de desarrollo y millones de dólares americanos.

1.3. Calidad del aire y sus varbiales

La calidad del aire se refiere a la condición o pureza del aire en un lugar determinado. Para determinar la calidad del aire, se deben medir varias variables ambientales clave como:

 Concentración de contaminantes. Implica medir la cantidad de contaminantes presentes en el aire, como partículas en suspensión, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono, ozono y compuestos orgánicos volátiles.



- Partículas en suspensión. La medición de partículas finas y gruesas es esencial, ya que pueden tener efectos perjudiciales en la salud huma y el medio ambiente.
- Temperatura y humedad. Estas variables pueden influir en la dispersión de contaminantes en el aire y en la formación de ciertos contaminantes atmosféricos, como el ozono.
- Velocidad y dirección del viento. Estos factores son importantes para comprender cómo se mueven los contaminantes en la atmósfera y cómo pueden afectar diferentes áreas.
- Radiación solar. La cantidad de radiación solar puede influir en la formación de ozono y en la calidad del aire en general.
- Contaminantes biológicos. También es importante medir la presencia de contaminantes biológicos, como polen y esporas de moho, que pueden afectar la calidad del aire y desencadenar alergias.

La calidad del aire se evalúa en función de los niveles de contaminantes presentes y se compara con estándares y pautas pautas establecidos por las autoridades ambientales para determinar si el aire es seguro para la salud humana y el medio ambiente. La mejora de la calidad del aire es fundamental para proteger la seguridad pública y el entorno natural.

En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, establece las pautas mostradas en la tabla 1.

| CONTAMINANTE | EVALUACIÓN | EXPOSICIÓN | FRECUENCIA | LÍMITE | NOM |
|------------------|---------------------|------------|----------------|----------------------------|---------------|
| Partículas PM10 | Promedio 24 hrs | Aguda | No se permite | $75 \frac{\mu g}{m^3}$ | 025-SSA1-2014 |
| Partículas PM10 | Promedio 24 hrs | Crónica | Promedio anual | $40 \frac{\mu g}{m^3}$ | 025-SSA1-2014 |
| Partículas PM2.5 | Promedio 24 hrs | Aguda | No se permite | $45 \frac{\mu g}{m^3}$ | 025-SSA1-2014 |
| Partículas PM2.5 | Promedio 24 hrs | Crónica | Promedio anual | $12 \frac{\mu g}{m^3}$ | 025-SSA1-2014 |
| Ozonono (O_3) | Dato horario | Aguda | No se permite | $0.095~\mathrm{ppm}$ | 020-SSA1-2014 |
| Ozonono (O_3) | Promedio de 8 hrs | Aguda | No se permite | $0.070~\mathrm{ppm}$ | 020-SSA1-2014 |
| (SO_2) | Promedio de 8 hrs | Aguda | 1 vez al año | 0.200 ppm | 022-SSA1-2010 |
| (SO_2) | Promedio de 8 hrs | Aguda | No se permite | 0.110 ppm | 022-SSA1-2010 |
| (SO_2) | Dato horario | Crónica | _ | $0.025~\mathrm{ppm}$ | 022-SSA1-2010 |
| (NO_2) | Dato horario | Aguda | 1 vez al año | 0.210 ppm | 023-SSA1-1993 |
| (CO) | Promedio de 8 hrs | Aguda | 1 vez al año | 11 ppm | 021-SSA1-1993 |
| (Pb) | Promedio de 3 meses | Crónica | No se permite | $1.5 \; \frac{\mu g}{m^3}$ | 026-SSA1-1993 |

Cuadro 1: Normas mexicanas sobre la calidad del aire