Gaussian fit for Re $\tilde{A}_{2B}$ at fixed eta & P_L=-2

$b \geq 3$ are SELECTED for fit!

Fit model:a $e^{-c\, b_L^2 - d\, b_T^2}$

η	Parameters {a, c, d}	Stability (c-d)	χ^2/DOF
0	$\{\langle 0.5071(45)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.03510(37)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.02766(26)\rangle_{2902\,J}\}$	$\langle 0.00744(42)\rangle_{2902\,J}$	4.46967
1	$\{\langle 0.4299(40)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.03544(40)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.03070(31)\rangle_{2902\,J}\}$	$\langle 0.00474(47)\rangle_{2902\,J}$	3.28061
2	$\{\langle 0.3175(32)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.03810(51)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.03528(42)\rangle_{2902\,J}\}$	$\langle 0.00282(62)\rangle_{2902\,J}$	3.73065
3	$\{\langle 0.2154(26)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.04222(74)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.04119(62)\rangle_{2902\,J}\}$	$\langle 0.00103(86)\rangle_{2902\,J}$	4.32244
4	$\{\langle 0.1474(24)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.0482(12)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.04772(99)\rangle_{2902\,J}\}$	$\langle 0.0005 \pm 0.0012\rangle_{2902\,J}$	4.01132
5	$\{\langle 0.0992(27)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.0566(19)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.0580(18)\rangle_{2902\,J}\}$	$\langle -0.0014(19)\rangle_{2902\,J}$	2.91725
6	$\{\langle 0.0710(32)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.0680(32)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.0678(32)\rangle_{2902\,J}\}$	$\langle 0.0002 \pm 0.0029\rangle_{2902\,J}$	2.1496
7	$\{\langle 0.0504(39)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.0815(52)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.0808(58)\rangle_{2902\,J}\}$	$\langle 0.0007 \pm 0.0048\rangle_{2902\,J}$	1.55872
8	$\{\langle 0.0391(45)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.0986(79)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.0965(95)\rangle_{2902\,J}\}$	$\langle 0.0021(75)\rangle_{2902\,J}$	1.35457
9	$\{\langle 0.0247(46)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.111(13)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.105(16)\rangle_{2902\,J}\}$	$\langle 0.007 \pm 0.012\rangle_{2902\,J}$	0.84488
10	$\{\langle 0.0184(52)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.129(17)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.119(26)\rangle_{2902\,J}\}$	$\langle 0.01 \pm 0.021\rangle_{2902\,J}$	0.608731