Gaussian fit for Re $\tilde{A}_{2B}$ at fixed eta & P_L=-4

$b \geq 3$ are SELECTED for fit!

Fit model:a $e^{-c\, b_L^2 - d\, b_T^2}$

η	Parameters {a, c, d}	Stability (c-d)	χ^2/DOF
0	$\{\langle 0.553(21)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.0623(35)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.0286(12)\rangle_{2902\,J}\}$	$\langle 0.0337(34)\rangle_{2902\,J}$	0.486436
1	$\{\langle 0.454(18)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.0629(39)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.0332(17)\rangle_{2902\,J}\}$	$\langle 0.0297(39)\rangle_{2902\,J}$	1.07119
2	$\{\langle 0.318(15)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.0691(50)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.0417(28)\rangle_{2902\,J}\}$	$\langle 0.0274(50)\rangle_{2902\,J}$	1.72423
3	$\{\langle 0.224(17)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.0811(72)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.0564(58)\rangle_{2902\,J}\}$	$\langle 0.0247(72)\rangle_{2902\,J}$	1.81792
4	$\{\langle 0.175(22)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.098(11)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.083(12)\rangle_{2902\,J}\}$	$\langle 0.015(11)\rangle_{2902\,J}$	1.06913
5	$\{\langle 0.120(20)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.107(14)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.096(16)\rangle_{2902\,J}\}$	$\langle 0.011(15)\rangle_{2902\,J}$	0.410807
6	$\{\langle 0.058(12)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.097(15)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.077(18)\rangle_{2902\,J}\}$	$\langle 0.021(19)\rangle_{2902\,J}$	0.312752
7	$\{\langle 0.0244(71)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.089(22)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.051(19)\rangle_{2902\,J}\}$	$\langle 0.038(26)\rangle_{2902\,J}$	0.240991
8	$\{\langle 0.0163(69)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.126(39)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.050(27)\rangle_{2902\,J}\}$	$\langle 0.076(44)\rangle_{2902\,J}$	0.507327
9	$\{\langle 0.0156(72)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.219(78)\rangle_{2902\,J}, \langle 0.072(33)\rangle_{2902\,J}\}$	$\langle 0.147(80)\rangle_{2902\,J}$	0.466947
10	$\{\langle -0.600(60)\rangle_{2902\,J}, \langle 4.42(51)\rangle_{2902\,J}, \langle -5.20(50)\rangle_{2902\,J}\}$	$\langle 9.62(51)\rangle_{2902\,J}$	37.5327