(b_L, b_T, η) Fits for Re $\tilde{A}_{2B}$ for $P_L = -1$

with $b \geq 3$ and $6 \geq \eta \geq 10$

Model Expression	Params List	Fitted Values	χ^2/DoF
$a\, e^{-f\eta}\, e^{-c\left(1-\frac{k_1}{\eta}-\frac{k_2}{\eta^2}\right)\lvert b_L P_L\rvert}\, e^{-d\sqrt{b_L^2+b_T^2}}$	{a, c, k1, k2, d, f}	{⟨5.28(42)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.51(12)⟩$_{2902\,J}$, ⟨11.60(44)⟩$_{2902\,J}$, ⟨−32.4(27)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.580(13)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.473(11)⟩$_{2902\,J}$}	1.57561
$a\, e^{-f\eta}\, e^{-c\left(1-\frac{k_1}{\eta}-\frac{k_2}{\eta^2}\right)\lvert b_L P_L\rvert}\, e^{-d\,(b_L^2+b_T^2)}$	{a, c, k1, k2, d, f}	{⟨1.36(10)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.53(13)⟩$_{2902\,J}$, ⟨11.09(49)⟩$_{2902\,J}$, ⟨−30.8(28)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.0564(15)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.473(12)⟩$_{2902\,J}$}	4.38385
$\frac{a\, e^{-f\eta}\, e^{-c\left(1-\frac{k_1}{\eta}-\frac{k_2}{\eta^2}\right)\lvert b_L P_L\rvert}}{(1+d\,(b_L^2+b_T^2))^{j_2}}$	{a, c, k1, k2, d, f, j2}	{⟨3.53(47)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.49(12)⟩$_{2902\,J}$, ⟨11.79(45)⟩$_{2902\,J}$, ⟨−33.0(26)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.096(16)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.473(11)⟩$_{2902\,J}$, ⟨2.06(12)⟩$_{2902\,J}$}	1.3183
$a\, e^{-f\eta}\, e^{-c\left(1-\frac{k_1}{\eta}-\frac{k_2}{\eta^2}\right)(b_L P_L)^2}\, e^{-d\sqrt{b_L^2+b_T^2}}$	{a, c, k1, k2, d, f}	{⟨5.94(48)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.114(30)⟩$_{2902\,J}$, ⟨11.96(44)⟩$_{2902\,J}$, ⟨−34.3(26)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.588(14)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.487(10)⟩$_{2902\,J}$}	1.54574
$\frac{a\, e^{-f\eta}\, e^{-c\left(1-\frac{k_1}{\eta}-\frac{k_2}{\eta^2}\right)(b_L P_L)^2}}{(1+d\,(b_L^2+b_T^2))^{j_2}}$	{a, c, k1, k2, d, f, j2}	{⟨3.68(38)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.110(29)⟩$_{2902\,J}$, ⟨12.02(44)⟩$_{2902\,J}$, ⟨−34.8(26)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.084(13)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.4896(98)⟩$_{2902\,J}$, ⟨2.16(14)⟩$_{2902\,J}$}	1.35274