(b_L, b_T, η) Fits for Re $\tilde{A}_{2B}$ for P_L=-1

with $b \geq 3$ and $6 \geq \eta \geq 10$

Model Expression	Params List
$a\, e^{-f\,\eta}\, e^{-c\left(1-\frac{k_1}{\eta}-\frac{k_2}{\eta^2}\right)\lvert b_L\, P_L\rvert}\, e^{-d\,\sqrt{b_L^2+b_T^2}}$	{a, c, k1, k2, d, f}
$a\, e^{-f\,\eta}\, e^{-c\left(1-\frac{k_1}{\eta}-\frac{k_2}{\eta^2}\right)\lvert b_L\, P_L\rvert}\, e^{-d\left(b_L^2+b_T^2\right)}$	{a, c, k1, k2, d, f}
$\frac{a\, e^{-f\,\eta}\, e^{-c\left(1-\frac{k_1}{\eta}-\frac{k_2}{\eta^2}\right)\lvert b_L\, P_L\rvert}}{\left(1+d\left(b_L^2+b_T^2\right)\right)^{j_2}}$	{a, c, k1, k2, d, f, j2}
$a\, e^{-f\,\eta}\, e^{-c\left(1-\frac{k_1}{\eta}-\frac{k_2}{\eta^2}\right)\left(b_L\, P_L\right)^2}\, e^{-d\,\sqrt{b_L^2+b_T^2}}$	{a, c, k1, k2, d, f}
$\frac{a\, e^{-f\,\eta}\, e^{-c\left(1-\frac{k_1}{\eta}-\frac{k_2}{\eta^2}\right)\left(b_L\, P_L\right)^2}}{\left(1+d\left(b_L^2+b_T^2\right)\right)^{j_2}}$	{a, c, k1, k2, d, f, j2}