

第十六章 半群与独异点

- 半群、独异点的定义与性质
 - 半群与独异点定义
 - 半群与独异点性质
- 半群、独异点的子代数、积代数、商代数
 - 子半群与子独异点
 - 半群与独异点的直积
 - 商半群与商独异点
- 半群与独异点的同态
 - 独异点的表示定理

半群与独异点的定义

广群、半群、独异点（幺半群）的定义

广群：封闭二元运算

半群：封闭二元运算，结合律

独异点：封闭二元运算，结合律，单位元

说明：任何半群都可以扩张成独异点
表示式中可以省略运算符

半群与独异点性质

幂运算的定义

半群 独异点

$$a^1 = a \qquad a^0 = e$$

$$a^{n+1} = a^n a$$

性质：

(1) **定理1** 幂运算的等式

$$a^n a^m = a^{n+m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

(2) 结合律

实例

例 1 V 为半群, 任取 $a, b \in S$, 如果 $a \neq b$, 则有 $ab \neq ba$, 证明

- (1) V 中成立幂等律
- (2) $\forall a, b \in V, aba = a$
- (3) $\forall a, b, c \in V, abc = ac$

证 (1) 假若 $aa \neq a$, 则

$$(aa)a \neq a(aa) \Rightarrow aaa \neq aaa, \text{ 矛盾!}$$

(2) 假若 $aba \neq a$, 则

$$(aba)a \neq a(aba) \Rightarrow aba \neq aba, \text{ 矛盾!}$$

(3) 假若 $abc \neq ac$, 则

$$(abc)(ac) \neq (ac)(abc) \Rightarrow abcac \neq acabc \Rightarrow abc \neq abc, \text{ 矛盾!}$$

子半群、子独异点

子半群、子独异点 B 的判别

非空子集 B ,

B 对于 V 中的运算 (含 0 元运算) 封闭.

定理2 若干子半群的非空交集仍为子半群;
若干子独异点的交集仍为子独异点.

重要的子半群---子集合 B 生成的子半群

$V = \langle S, * \rangle$, $B \subseteq S$, 包含 B 的最小的半群

$\langle B \rangle = \cap \{A \mid A \text{ 是 } S \text{ 的子半群, } B \subseteq A\}$

$\langle B \rangle = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}^+} B^n$, $B^n = \{b_1 b_2 \cdots b_n \mid b_i \in B, i = 1, 2, \dots, n\}$

实例

例 2 $V = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 半群, $B = \{4, 6\}$,

$$\begin{aligned}\langle B \rangle &= \{ 4i + 6j \mid i, j \in \mathbb{N}, i \text{ 和 } j \text{ 不同时为 } 0 \} \\ &= \{ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, \dots \} = 2\mathbb{Z}^+ - \{2\}\end{aligned}$$

例 3 Σ 有穷字母表, Σ^+ 为不含空串字的集合, Σ^* 为所有字的集合。

$$a_1 a_2 \cdots a_n = b_1 b_2 \cdots b_n \Leftrightarrow a_1 = b_1, a_2 = b_2, \dots, a_n = b_n$$

每个字可以唯一分解为 Σ 中的元素之积。

Σ^+ 上的连接运算满足结合律, $V = \langle \Sigma^+, \cdot \rangle$ 构成半群, 称为 Σ 上的**自由半群**, Σ 为这个自由半群的生成元集, 即 $\langle \Sigma \rangle = V$.
 Σ^* 构成**自由独异点**。

半群独异点的直积、商代数、同态

□ 半群与独异点的直积

半群的直积仍是半群

独异点的直积仍是独异点

□ 半群与独异点的商代数

半群 $\langle A, \circ \rangle$, 商半群 $\langle A/R, \bar{\circ} \rangle$

独异点 $\langle A, \circ, e \rangle$, 商独异点 $\langle A/R, \bar{\circ}, [e] \rangle$

□ 半群与独异点的同态和同构

半群 $f(xy) = f(x)f(y)$

独异点 $f(xy) = f(x)f(y), f(e) = e'$

半群同态的性质

定理3 设 $V = \langle S, * \rangle$ 为半群, $V' = \langle S^S, \circ \rangle$, \circ 为合成, 则 V' 也是半群, 且存在 V 到 V' 的同态.

证: 只证同态. 令 $f_a: S \rightarrow S$, $f_a(x) = a * x$,

$f_a \in S^S$, 且 $\{f_a | a \in S\} \subseteq S^S$,

令 $\varphi: S \rightarrow S^S$, $\varphi(a) = f_a$,

$$\varphi(a * b) = f_{a*b}, \quad \varphi(a) \circ \varphi(b) = f_a \circ f_b$$

为证同态只需证明 $f_{a*b} = f_a \circ f_b$

$$\forall x \in S$$

$$f_{a*b}(x) = (a * b) * x = a * b * x$$

$$f_a \circ f_b(x) = f_a(f_b(x)) = f_a(b * x) = a * (b * x) = a * b * x$$

独异点的表示定理

定理4 设 $V = \langle S, *, e \rangle$ 为独异点, 则存在 $T \subseteq S^S$, 使得 $\langle S, *, e \rangle$ 同构于 $\langle T, \circ, I_S \rangle$

证: 令 $\varphi: S \rightarrow S^S, \varphi(a) = f_a$, 则

$$\varphi(a * b) = \varphi(a) \circ \varphi(b)$$
$$\varphi(e) = f_e = I_S$$

φ 为独异点 V 到 $\langle S^S, \circ, I_S \rangle$ 的同态.

$\varphi(a) = \varphi(b) \Rightarrow f_a = f_b \Rightarrow \forall x \in S (a * x = b * x)$
 $\Rightarrow a * e = b * e \Rightarrow a = b$, 故 φ 为单射。

令 $T = \varphi(S)$, 则 $T \subseteq S^S$, 且 $\varphi: S \rightarrow T$ 为双射,
 $\langle S, *, e \rangle \cong \langle T, \circ, I_S \rangle$

实例

例4 $S = \mathbb{Z}_3 = \{0, 1, 2\}$, 独异点 $V = \langle S, \oplus, 0 \rangle$,

$S^S = \{f_0, f_1, f_2, \dots, f_{26}\}$, 其中

$$f_0 = \{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$$

$$f_1 = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 0 \rangle\}$$

$$f_2 = \{\langle 0, 2 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$$

$$\varphi: S \rightarrow S^S, \varphi(0) = f_0, \varphi(1) = f_1, \varphi(2) = f_2$$

$$\varphi(S) = \{f_0, f_1, f_2\} \subseteq S^S$$

\oplus	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

\circ	f_0	f_1	f_2
f_0	f_0	f_1	f_2
f_1	f_1	f_2	f_0
f_2	f_2	f_0	f_1