

组合数学

Combinatorial Mathematics



组合存在定理

递推方程

容斥原理

基本计数公式

生成函数

Polya定理

组合数学的主要内容

研究离散个体满足约束条件下的配置问题

□ 组合存在性

- 偏序集分解定理
- Ramsey定理
- 相异代表系存在定理

□ 组合计数

- 基本计数公式
- 计数方法
- 计数定理

□ 组合枚举：生成算法、组合设计

□ 组合优化：最短路径、最小生成树、网络流

组合数学的主要技巧

重要的组合思想


- 一一对应
- 数学归纳法
- 上下界逼近的处理方法

一一对应

例1 $3 \times 3 \times 3$ 的立方体至少需要多少次才能切成27个小立方体？

解： 6次

切割 \leftrightarrow 中心立方体的面
次数至少等于面数



例2 n 个选手两人一组比赛决出冠军，需要多少次比赛？

解： $n-1$ 次，比赛 \leftrightarrow 淘汰，比赛次数=淘汰人数

组合计数模型与一一对应

□ 计数方法：计数模型与实际问题的对应

□ 计数模型：

- 选取问题
- 不定方程非负整数解问题
- 非降路径问题
- 整数拆分问题
- 放球问题
-

数学归纳法

- 描述一个与自然数相关的命题 $P(n)$

归纳基础：例如 $P(0)$ 真；

归纳步骤：例如 $P(n) \Rightarrow P(n+1)$

- 第一数学归纳法：

$n=0$ 为真；假设对 n 为真，证对 $n+1$ 为真

- 第二数学归纳法：


$n=0$ 为真；假设对一切小于 n 的 k 为真，证明对 n 为真

数学归纳法的推广

□ 证明命题 $P(m, n)$

针对 m, n 两个自然数

任意给定 m （或 n ）对 n （或 m ）归纳



多重归纳

归纳基础

$\langle 0, n' \rangle$ 为真,


$\langle m', 0 \rangle$ 为真

归纳步骤

假设 $\langle m - 1, n \rangle$,

$\langle m, n - 1 \rangle$ 为真,

证 $\langle m, n \rangle$ 为真



上下界逼近

确定某个值（或阶）

步骤

证明这个值的上界

证明这个值的下界

如果上界与下界相等，则结束

否则改进上界或者下界，使得它们逐渐逼近




实例

K_n : n 个顶点的无向完全图

用红、蓝两色任意对 K_n 的边涂色, n 至少是多少才能出现一个红色三角形, 或一个蓝色的三角形?

证明

□ 上界 $n \leq 6$. 某顶点关联的边至少有3条同色



□ 下界 $n > 5$. $n = 5$ 不可能做到.

□ $n = 6$.

反例

第二十章 组合存在性定理

□ 有限偏序集的分解定理

若最大链长度为 n , 则偏序集最少可分解成 n 条不相交的反链

若最大反链长度为 n , 则偏序集最少可分解为 n 条不相交的链 (p. 52-53)

□ Ramsey定理: 鸽巢原理的推广

□ 相异代表系存在定理: Hall定理 (完美匹配存在条件) 的推广

主要内容

□ 鸽巢原理

- 简单形式
- 一般形式

□ Ramsey定理


- 简单形式
- 小Ramsey数的相关结果
- 一般形式
- 关于Ramsey数的若干已知结果

鸽巢原理的简单形式

鸽巢原理： $n+1$ 个物体放到 n 个盒子里，则存在一个盒子至少含有2个或者2个以上的物体。


应用实例

例1 边长为2的正三角形中 5个点，则存在2个点距离小于1.



应用实例

例2 3×9 的方格用黑、白两色涂色，则存在两列涂色方案相同.



例3 空间9个格点，证明所有两点连线的中点中有一个是格点.

证： 若 (x, y, z) 与 (x', y', z') 的奇偶性相同，则连线中点为格点. 奇偶模式共8种.

应用实例(续)

例4 设有 3 个 7 位二进制数

$$A: a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6 a_7$$

$$B: b_1 b_2 b_3 b_4 b_5 b_6 b_7$$

$$C: c_1 c_2 c_3 c_4 c_5 c_6 c_7$$

证明存在整数*i*和*j*, $1 \leq i < j \leq 7$, 使得下列之一必然成立:

$$a_i = a_j = b_i = b_j,$$

$$a_i = a_j = c_i = c_j,$$

$$b_i = b_j = c_i = c_j$$

应用实例(续)

$$a_i = a_j = b_i = b_j$$

$$a_i = a_j = c_i = c_j$$

$$b_i = b_j = c_i = c_j$$

A	0	1	0	1	×	×	1
B	0	1	×	×	0	1	1
C	×	×	0	1	0	1	×

证 a_i, b_i, c_i 中，必有两个相同，每个同为0或1，有6种选择。例如 $a_i = b_i = 0$ ，记为1-2-0，同样 $a_i = c_i = 1$ ，记为1-3-1，这6种选择为：

1-2-0, 1-2-1, 1-3-0, 1-3-1, 2-3-0, 2-3-1

7列数6种选择，由鸽巢原理必有两列相等，这两列中含有一个四角数字相同的矩形，这四角的数字满足要求。

应用实例(续)

例5 从1到 $2n$ 的正整数中，任取 $n+1$ 个数，至少有一对数，其中一个数是另一个数的倍数。

证 $a_i = 2^{\alpha_i} r_i, i = 1, 2, \dots, n+1$, r_i 为奇数，1到 $2n$ 只有 n 个奇数，故存在 r_i, r_j 使得 $r_i = r_j, i < j$. 于是 $a_i = 2^{\alpha_i} r_i, a_j = 2^{\alpha_j} r_j$.

若 $a_i > a_j$ ，则 $\frac{a_i}{a_j} = 2^{\alpha_i - \alpha_j}$ 故 a_i 是 a_j 的倍数。

应用实例(续)

例6 $n + 1$ 个 $\leq 2n$ 的正整数中，必有两个数互素。

证 相邻的数互素，若不然， p 是 k 与 $k + 1$ 的公因子，且 $1 < p < k$ 。那么 $k = pq_i$ ， $k + 1 = pq_j$ ，因此 $pq_i + 1 = pq_j$ ，于是 $p(q_j - q_i) = 1$ ，矛盾。

构造 n 个组： $\{1, 2\}, \{3, 4\}, \dots, \{2n - 1, 2n\}$ ， $n + 1$ 个数必有2个取自同一个组。

应用实例(续)

例7 设 a_1, a_2, \dots, a_m 是正整数序列, 则至少存在整数 k 和 l 使得 $1 \leq k \leq l \leq m$, 使得和 $a_k + a_{k+1} + \dots + a_l$ 是 m 的倍数.

证 设 $S_1 = a_1$

$$S_2 = a_1 + a_2$$

...

$$S_m = a_1 + a_2 + \dots + a_m$$

S_i 除以 m 的余数为 $r_i, i = 1, 2, \dots, m$, 若存在 $r_j = 0$, 则命题得证; 否则由鸽巢原理有 $r_i = r_j, i < j$. 因此 $S_j - S_i$ 被 m 整除。取 $k = i + 1, l = j$, 命题得证。

应用实例(续)

例8 设 $4, 44, \dots, 44 \dots 4$, 是1997个数的序列, 证明存在一个数被1996整除.

证 设这1997个数分别为 $a_1, a_2, \dots, a_{1997}$, 除以1996的余数依次为 $i_1, i_2, \dots, i_{1997}$. 由鸽巢原理, 必有 $i_k = i_j, k < j$. 于是, $a_j - a_k$ 被1996整除, 且

$$a_j - a_k = 44 \dots 400 \dots 0 = a_{j-k} \times 10^k.$$

其中含 $j - k$ 个4, k 个0.

$1996 = 4 \times 499$, 499为素数, 必有 a_{j-k} 被499整除, 而同时 a_{j-k} 被4整除, 因此 a_{j-k} 被1996整除.

鸽巢原理的一般形式

鸽巢原理 设 q_1, q_2, \dots, q_n 是给定正整数, 若把 $q_1 + q_2 + \dots + q_n - n + 1$ 个物体放入 n 个盒子里, 则或第一个盒子至少包含了 q_1 个物体, 或者第二个盒子至少包含了 q_2 个物体, \dots , 或者第 n 个盒子至少包含了 q_n 个物体。

说明:

- 证明用反证法
- 这是存在这种配置的最小个数
- 令 $q_1 = q_2, = \dots = q_n = 2$, 则变成简单形式

推论 若 $n(r-1) + 1$ 个物体放到 n 个盒子里, 则存在一个盒子至少包含了 r 个物体. 令 $q_1 = q_2, = \dots = q_n = r$ 即可。

鸽巢原理的算术平均形式

设 m_1, m_2, \dots, m_n 是 n 个正整数，如果它们的算术平均

$$\frac{m_1 + m_2 + \dots + m_n}{n} > r - 1$$

则存在 $m_i \geq r$.

证：令 m_1, m_2, \dots, m_n 是放入盒子的物体数，则

$$(m_1 + m_2 + \dots + m_n) > (r-1)n$$

$$\Leftrightarrow m_1 + m_2 + \dots + m_n \geq (r-1)n + 1$$

满足鸽巢原理条件。

顶函数与底函数

顶函数(Ceiling function), 底函数(Floor function)

定义 对于实数 x ,

顶函数 $\lceil x \rceil$: 大于或等于 x 的最小整数

底函数 $\lfloor x \rfloor$: 小于或等于 x 的最大整数

有时将底函数记作 $[x]$

性质:

$$(1) x-1 < \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil < x+1$$

$$(2) \lfloor x+m \rfloor = \lfloor x \rfloor + m, \lceil x+m \rceil = \lceil x \rceil + m, m \text{ 为整数}$$

$$(3) \lceil m/2 \rceil + \lfloor m/2 \rfloor = m, m \text{ 为整数}$$

鸽巢原理的函数形式

设 $f: A \rightarrow B$, $|A|=m$, $|B|=n$, 若 $m \geq n$, 则存在至少 $\lceil m/n \rceil$ 个元素 $a_1, a_2, \dots, a_{\lceil m/n \rceil}$ 使得

$$f(a_1) = f(a_2) = \dots = f(a_{\lceil m/n \rceil})$$

证：令 $B = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, m_i 表示函数值为 y_i 的自变量个数, $i=1, 2, \dots, n$.

$$\frac{m_1 + m_2 + \dots + m_n}{n} = \frac{m}{n} > \left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil - 1$$

必存在某个 $m_i \geq \lceil m/n \rceil$.

鸽巢原理应用

例9 $a_1, a_2, \dots, a_{n^2+1}$ 是实数序列, 证明可以选出 $n+1$ 个数的子序列 $a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_{n+1}}$ 使得其为递增子序列或递减子序列.

证 假设没有长为 $n+1$ 的递增子序列, 设 m_k 表示从 a_k 开始的最长递增子序列长度, 则 $1 \leq m_k \leq n$, 而 $m_1, m_2, \dots, m_{n^2+1}$ 中必存在 $\lceil (n^2+1)/n \rceil = n+1$ 个 m_k 取值相等. 设 $m_{k_1} = m_{k_2} = \dots = m_{k_{n+1}} = l$. 若 $a_{k_i} \leq a_{k_{i+1}}$, 则从前者开始的递增子序列长度为 $l+1$, 矛盾. $a_{k_1} > a_{k_2} > \dots > a_{k_{n+1}}$ 是长为 $n+1$ 的递减子序列.

Ramsey定理

□ Ramsey定理的简单形式

- 两个简单命题
- Ramsey定理
- 小Ramsey数的有关结果
- Ramsey数的性质
- Ramsey定理的推广

□ Ramsey定理的一般形式

- Ramsey定理
- 关于一般Ramsey数的结果

□ Ramsey定理的应用

Ramsey定理的简单形式

两个简单的命题

命题1 用红蓝两色涂色 K_6 的边，则或有一个红色 K_3 ，
或有一个蓝色 K_3 .

任意六个人中要么至少三个人认识，要么至少三个不认识。

$$R(3, 3) = 6$$



命题2 用红蓝两色涂色 K_9 的边，则或有一个红色 K_4 ，
或有一个蓝色 K_3 .

命题2的证明

用红蓝两色涂色 K_9 的边，则或有一个红色 K_4 ，或有一个蓝色 K_3 .

证：断言：存在一个顶点至少关联4条蓝边或者6条红边. 否则蓝边数 < 4 , 红边数 < 6 , 则蓝边总数至多 $\lfloor (3 \times 9) / 2 \rfloor = 13$, 红边总数至多 $\lfloor (5 \times 9) / 2 \rfloor = 22$, 总共35条边，与 K_9 边数为36矛盾。



设 v_1 关联4条蓝边，若对应4个顶点没有蓝边，则构成红 K_4 ；有1条蓝边，则构成蓝 K_3 。



命题2的证明


用红蓝两色涂色 K_9 的边，则或有一个红色 K_4 ，或有一个蓝色 K_3 .

设 v_1 关联6条红边，对应6个顶点必有蓝 K_3 或红 K_3 .



对于 K_8 ，存在一种涂色方案，既没有蓝色三角形，也没有红色完全四边形。

$$R(3, 4) = 9.$$



Ramsey(1903–1930)定理

定理 设 p, q 为正整数, $p, q \geq 2$, 则存在最小正整数 $R(p, q)$, 使得当 $n \geq R(p, q)$ 时, 用红蓝两色涂色 K_n 的边, 则或存在一个蓝色的 K_p , 或存在一个红色的 K_q .

核心思想是: “任何一个足够大的结构中必定包含一个给定大小的规则子结构”

证明思路: 归纳法

归纳基础 $R(p, 2) \leq p, R(2, q) \leq q,$

归纳步骤 $R(p-1, q), R(p, q-1)$ 存在

$$\Rightarrow R(p, q) \leq R(p-1, q) + R(p, q-1)$$

证明

证：采用数学归纳法。

设 p 为任意正整数， $q = 2$ 。用红蓝两色涂色 K_p 的边：
若没有一条红边，则存在一个蓝色的完全 p 边形；
若有一条红边，则构成一个完全红2边形，因此
 $R(p, 2) \leq p$ 。同理可证 $R(2, q) \leq q$ 。

假设对正整数 p', q' 命题为真, 其中 $p' \leq p, q' \leq q, p' + q' < p + q$, 则 $R(p-1, q), R(p, q-1)$ 存在。
令

$$n \geq R(p-1, q) + R(p, q-1).$$

证明

用红、蓝两色涂色 K_n 的边，则 v_1 或关联 $R(p-1, q)$ 条蓝边或关联 $R(p, q-1)$ 条红边。否则， v_1 至多关联 $R(p-1, q) - 1 + R(p, q-1) - 1 = R(p-1, q) + R(p, q-1) - 2$ 条边，与 $n \geq R(p-1, q) + R(p, q-1)$ 矛盾。

Case 1. v_1 关联 $R(p-1, q)$ 条蓝边；

Case 2. v_1 关联 $R(p, q-1)$ 条红边。

对于case 1，由归纳假设这 $R(p-1, q)$ 个顶点中或含有一个蓝色的完全 $p-1$ 边形，或含有一个红色的完全 q 边形。

证明

若为前者，则这个 $p-1$ 边形加上 v_1 构成一个蓝色的完全 p 边形，命题为真；若为后者，命题也为真。

对于case 2可以类似分析。

因此，

$$R(p, q) \leq R(p-1, q) + R(p, q-1), \quad p \geq 3, \quad q \geq 3$$

定义 对于任意给定的两个正整数 a 和 b , $a, b \geq 2$, 最小的正整数 $R(a, b)$, 使得当 $n \geq R(a, b)$ 时, 对 K_n 任意进行红、蓝两种着色, K_n 中均有蓝色 K_a 或红色 K_b , 称 $R(a, b)$ 为**Ramsey数**。

小Ramsey数的值

http://en.wikipedia.org/wiki/Ramsey's_theorem#Ramsey_numbers

$p \backslash q$	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		6	9	14	18	23	28	36	40-42 (43)
4			18	25	36-41	49-61	(56) 59-84	73-115	92-149
5				43-48(49)	58-87	80-143	101-216	(126)133-316	(144)149-442
6					102-165	(113)115-298	(132)134-495	(169)183-780	(179)204-1171
7						205-540	217-1031	(241)252-1713	(289)292-2826
8							282-1870	(317)329-3583	(331)343-6090
9								565-6588	581-12677
10									798-23556

Ramsey数的性质

$$(1) R(a, b) = R(b, a), R(a, 2) = R(2, a) = a$$

$$(2) R(a, b) \leq R(a-1, b) + R(a, b-1), a \geq 3, b \geq 3.$$

性质 (2) 给出上界

$$9 = R(3, 4) \leq R(2, 4) + R(3, 3) = 4 + 6 = 10$$

$$18 = R(4, 4) \leq R(3, 4) + R(4, 3) = 9 + 9 = 18$$

$$25 = R(4, 5) \leq R(3, 5) + R(4, 4) = 14 + 18 = 32$$

$$R(3, 10) \leq R(2, 10) + R(3, 9) = 10 + 36 = 46$$

$$R(3, 10) \leq 43$$

Ramsey数的性质

推论 对任意正整数 $a \geq 2$, $b \geq 2$, 有

$$R(a, b) \leq \binom{a+b-2}{a-1} = \frac{(a+b-2)!}{(a-1)!(b-1)!}$$

证: 对 $a+b$ 作归纳。当 $a+b \leq 5$ 时, $a=2$ 或 $b=2$, 由前面定理知推论成立。假设对一切满足 $5 \leq a+b < m+n$ 的 a, b 推论成立, 从而有

$$\begin{aligned} R(m, n) &\leq R(m, n-1) + R(m-1, n) \\ &\leq \binom{m+n-3}{m-1} + \binom{m+n-3}{m-2} = \binom{m+n-2}{m-1} \end{aligned}$$

所以, 对任意的正整数 $a \geq 2$, $b \geq 2$, 推论均成立。

Ramsey定理的推广

(1) $R(p, q)$ 的图表示

K_n 的顶点集 V

K_n 的边集 E

用2色涂色 K_n 的边

存在蓝色完全 p 边形

存在红色完全 q 边形

$R(p, q)$ 的集合表述:

集合 S

S 的2元子集的集合 T

将 T 划分成 E_1, E_2

存在 S 的 p 子集其所有2元子集 $\in E_1$

存在 S 的 q 子集其所有2元子集 $\in E_2$

集合表述具有更强的表达能力!

(2) 将2元子集推广到 r 元子集

(3) 将 T 划分成 E_1, E_2, \dots, E_k

推广的Ramsey定理

定理2 对于任意给定的正整数 $p, q, r, (p, q \geq r)$ ，存在一个最小的正整数 $R(p, q; r)$ ，使得当 $|S| \geq R(p, q; r)$ 时，将 S 的 r 元子集族任意划分成 E_1, E_2 ，则：
或者 S 有 p 元子集 A_1 ， A_1 的所有 r 元子集属于 E_1 ；
或者 S 有 q 元子集 A_2 ， A_2 的所有 r 元子集属于 E_2 。

推广的Ramsey定理

定理3 设 $r, k \geq 1, q_i \geq r, i = 1, 2, \dots, k$, 是给定正整数, 则存在一个最小的正整数 $R(q_1, q_2, \dots, q_k; r)$, 使得当 $n \geq R(q_1, q_2, \dots, q_k; r)$ 时, 将 n 元集 S 的所有 r 元子集划分成 k 个子集族 E_1, E_2, \dots, E_k , 那么

存在 S 的 q_1 元子集 A_1 , 其所有 r 元子集属于 E_1 ;
或者存在 S 的 q_2 元子集 A_2 , A_2 的所有 r 元子集属于 E_2 ;
...
或者存在 S 的 q_k 元子集 A_k , 其所有 r 元子集属于 E_k .

关于一般Ramsey数的说明

$R(q_1, q_2, \dots, q_k; r)$

(1) 条件: $r, k \geq 1, q_i \geq r, i = 1, 2, \dots, k$, 都是给定正整数

(2) 当 $r = 2$ 时, 可以简记为 $R(q_1, q_2, \dots, q_k)$

(3) Ramsey定理断定Ramsey数的存在性.

Ramsey数的确定是一个很困难的问题.

(4) $r = 1$, 是鸽巢原理,

$$R(q_1, q_2, \dots, q_k; 1) = q_1 + q_2 + \dots + q_k - k + 1$$

$r = 2, k = 2$, 是简单的Ramsey定理。

结果: 9个(不含 $q = 2$)Ramsey数的精确值, 部分上界、

下界 $r = 2, k = 3$, 只有一个精确值 $R(3, 3, 3) = 17$.

几个Ramsey数的上下界

$$51 \leq R(3, 3, 3, 3) \leq 62$$

$$65 \rightarrow 62$$

$$162 \leq R(3, 3, 3, 3, 3) \leq 307$$

$$322 \rightarrow 307$$

$$538 \leq R(3, 3, 3, 3, 3, 3) \leq 1838$$

$$500 \rightarrow 538$$

$$30 \leq R(3, 3, 4) \leq 31$$

$$32 \rightarrow 31$$

$$45 \leq R(3, 3, 5) \leq 57$$

$$59 \rightarrow 57$$

$$55 \leq R(3, 4, 4) \leq 79$$

$$81 \rightarrow 79$$

$$93 \leq R(3, 3, 3, 4) \leq 153$$

$$84 \rightarrow 93, 159 \rightarrow 153$$

$$128 \leq R(4, 4, 4) \leq 236$$



$$242 \rightarrow 236$$

Ramsey定理的应用

例10 对于任意 $m \geq 3, m \in \mathbb{Z}^+$, 存在正整数 $N(m)$, 使得当 $n \geq N(m)$ 时, 若平面的 n 个点没有三点共线, 则其中总有 m 个点构成一个凸 m 边形的顶点。

实例: $m=3, N(m)=N(3)=3,$

$m=4, N(m)=N(4)=5,$



需证: $N(m) \leq R(5, m; 4)$


引理1 平面上任给5点, 没有3点共线, 则必有4点是凸4边形的顶点。

引理2 平面上 m 个点, 若没有3点共线且任4点都是凸4边形的顶点, 则这 m 个点构成凸 m 边形的顶点。

引理1的证明

引理1 平面上任给5点，没有3点共线，则必有4点是凸4边形的顶点。


证 做最大的凸多边形 T 。如果 T 是4边形或5边形，则命题为真。如果为3多边形，则3边形内存在2点，与过这2点的直线一侧的另外2点构成凸4边形。



引理2的证明

引理2 平面上 m 个点，若没有3点共线且任4点都是凸4边形的顶点，则这 m 个点构成凸 m 边形的顶点。

证： 假设最大的凸多边形是 p 边形， $p < m$. 则必有点落入这个多边形内部. 将这个多边形划分成三角形，必有点落入某个三角形，这个三角形的顶点与内部的点构成凹4边形，与已知矛盾。



命题证明

任意 $m \geq 3$, 存在正整数 $N(m)$, 使得当 $n \geq N(m)$ 时, 若平面的 n 个点没有三点共线, 则其中总有 m 个点构成一个凸 m 边形的顶点

证 不妨设 $m > 3$, 令 $n \geq R(5, m; 4)$, S 为 n 个点的集合。将 S 的所有的4元子集划分成两个子集族。如果构成凹4边形, 放到 T_1 , 如果构成凸4边形, 则放到 T_2 。

根据Ramsey数定义, 或有5个点, 其所有4元子集都构成凹4边形; 或有 m 个点, 其所有的4子集都构成凸4边形。

若为前者, 与引理1矛盾。若为后者, 根据引理2, 这 m 个点构成凸 m 边形的顶点。

组合存在性定理的应用

例11 最少连接缆线问题

条件: 15台工作站和10台服务器，每个工作站可以用一条电缆直接连到某个服务器，同一时刻每个服务器只能接受一个工作站的访问。

目标: 任何时刻，任意选10台工作站，保证这组工作站可以同时访问不同的服务器。

问题: 达到这个目标需要的最少缆线数目 N 是多少？


方案1: 每个工作站都连到每个服务器，需要
 $10 \times 15 = 150$ ，缆线数 $N \leq 150$ 。

例11的解决方案

方案2 将工作站标记为 W_1, W_2, \dots, W_{15} , 服务器标记为 S_1, S_2, \dots, S_{10} .

对于 $k=1, 2, \dots, 10$, 我们连接 W_k 到 S_k , 剩下5个工作站的每一个都连接到10个服务器。

总共60条直接连线。



方案的最优性

满足目标要求：任取10个工作站. 如果恰好为 W_1, W_2, \dots, W_{10} , W_i 访问 S_i , $i=1, \dots, 10$, 满足要求; 如果 W_1-W_{10} 中只选中 k 个工作站, 不妨设为 W_1-W_k , 剩下的 $10-k$ 个选自 $W_{11}-W_{15}$. 那么 W_i 访问 S_i , $i=1, \dots, k$. 还剩下 $10-k$ 个服务器空闲, 恰好分配给 $10-k$ 个工作站.

结论： $N \leq 60$.

证明 $N \geq 60$.

假设在工作站和服务器之间缆线至多59条, 那么某个服务器将至多连接 $\lfloor 59/10 \rfloor = 5$ 工作站。若选择剩下的10个工作站作为一组, 则只有9个空闲的服务器, 必有2个工作站连接同一服务器, 与题目要求矛盾。

例12 电路板排列问题

电路板集合: $B = \{1, 2, \dots, n\}$

连接块集合: $L = \{N_1, N_2, N_i, \dots, N_m\}$

$N_j \subseteq B$, N_j 中所有电路板用一根导线连接

排列: $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$

排列密度 $\text{density}(X)$: 跨越相邻电路板插槽的最大连线数

求具有最小排列密度 $\text{density}(X)$ 的排列。


实例：方案1

$B = \{1, 2, \dots, 8\}, L = \{N_1, N_2, \dots, N_5\},$

$N_1 = \{4, 5, 6\}, N_2 = \{2, 3\}, N_3 = \{1, 3\},$

$N_4 = \{3, 6\}, N_5 = \{7, 8\}$


排列 $X_2 = \langle 3, 4, 6, 5, 1, 7, 8, 2 \rangle$, $\text{density}(X_2) = 4$



方案2

$B = \{1, 2, \dots, 8\}$, $L = \{N_1, N_2, \dots, N_5\}$,
 $N_1 = \{4, 5, 6\}$, $N_2 = \{2, 3\}$, $N_3 = \{1, 3\}$, $N_4 = \{3, 6\}$, $N_5 = \{7, 8\}$

排列 $X_1 = \langle 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \rangle$, $\text{density}(X_1) = 2$



因为3出现在3个连接块中，以横跨电路板2-3为一边，3-4为另一边。根据鸽巢原理，无论怎样排列，都存在某一边至少有2条线，因此 $\text{density}(X) \geq 2$ ，这是一个最优方案。

例13 通信抗噪音编码问题

例13 通信噪音干扰

混淆图 $G = \langle V, E \rangle$, V 为有穷字符集,

$\{u, v\} \in E \Leftrightarrow u$ 和 v 易混淆.

$\beta_0(G)$: **点独立数**, 最大不混淆字符集大小
编码是字符串的集合

xy 与 uv 混淆 $\Leftrightarrow x$ 与 u 混淆且 y 与 v 混淆


$\vee x = u$ 且 y 与 v 混淆

$\vee x$ 与 u 混淆且 $y = v$

$V_1 \times V_2$ 的混淆图是两个混淆图 G 与 H 的正规积 $G \cdot H$

定理 $\beta_0(G \cdot H) \leq R(\beta_0(G) + 1, \beta_0(H) + 1) - 1$

实例: 设 $|G| = 5, \beta_0(G) = 3$, 则 $\beta_0(G \cdot G) \leq R(\beta_0(G) + 1, \beta_0(G) + 1) - 1$
 $= R(4, 4) - 1 = 17$



Ramsey定理的应用和推广

□ 应用

- 数论、代数、几何、拓扑学、集合论、逻辑等；
- 信息论、理论计算机科学

□ 推广（超图、有向图、无限...）

□ V. Rosta, Ramsey theory applications, Electronic Journal of Combinatorics, 2004.

□ Applications of Ramsey Theory to Computer Science: <http://www.cs.umd.edu/~gasarch/ramsey/ramsey.html>