

2

No.

Date

Phân Thu	180	250	320	250	u_i
200	17	15	20	18	0
300	16	18	22	20	2
400	18	14	17	18	-3
100	13	17	16	16	-1
v_j	14	17	20	18	

+ Hệ thống thể vi $\left\{ \begin{array}{l} u_i = C \\ u_i + v_j = c_{ij} \end{array} \right.$

$$v_i = c_{ij} - v_j \quad ; \quad v_j = c_{ij} - u_i$$

+ Lượng hiện tra

$$\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$$

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 7 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & [-3] & -1 \end{pmatrix}$$

+ ô điều chỉnh : (4, 3)

+ ô điều chỉnh : $q = \min \{400, 170\} = 100$



phân \ Thu	180	250	320	250	41
200	17	15 +	20	18 -	0
300	16	18	22 -	20 +	2
400	18	14 -	17 +	18	-3
100	13	17	16	16	-4
V _J	14	17	20	18	

$$(A_{ij}) = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 7 & 0 & 0 & 3 \\ 3 & 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

+ ô điều chỉnh (1,2)

+ Pg điều chỉnh:

$$q = \min \{ 250, 70, 200 \}$$

$$= 70$$

phân \ Thu	180	250	320	250	41
200	17	15	20	18	0
300	16	18	22	20	2
400	18	14	17	18	-1
100	13	17	16	16	-2
V _i	14	15	18	18	

TÂN VINH TIỀN



$$(D_{ij}) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ta có $D_{ij} \geq 0; \forall (i,j)$ nên bài toán có ph. ăn tối ưu

$$x^* = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$f_{\min} = f(x^*) = 16530$$