

【兽药名称】

通用名称:加米霉素注射液

商品名称:回米佳

英文名称:Gamithromycin Injection

汉语拼音:Jiamimeisu Zhusheye

【主要成分】加米霉素

【性状】本品为无色至淡黄色澄明液体。

【药理作用】药效学 大环内酯类抗生素。加米霉素为15元环的半合成氮杂内酯类,主要通过和细菌核糖体50S亚基结合,阻止多肽链延长,抑制细菌蛋白质的合成。体外试验数据表明加米霉素以抑菌方式对胸膜肺炎放线杆菌、多杀巴氏杆菌和副猪嗜血杆菌起作用,加米霉素内酯环的7a位为烷基化氮,在生理pH值条件下能快速吸收,并在靶动物肺组织中维持长时间的作用。

药动学 猪颈部单剂量以6mg/kg体重肌肉注射加米霉素,可迅速吸收,达峰时

湖北回盛生物科技有限公司

HUBEI HUSEN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.

间(T_{max})和峰浓度(C_{max})约为1.66h和1007.77ng/ml,平均药时曲线下面积(AUC)约为5156.67h·ng/ml,绝对生物利用度为83.85%,消除半衰期($T_{1/2\beta}$)约为29.92h,药物主要以原形通过胆汁排泄。

【适应证】用于治疗对加米霉素敏感的胸膜肺炎放线杆菌、多杀巴氏杆菌和副猪嗜血杆菌引起的猪呼吸道疾病。

【用法与用量】按加米霉素计。肌肉注射:一次量,猪每1kg体重6mg(相当于每25kg体重注射1ml)。仅用一次。每个注射部位的给药体积不超过5ml。

【不良反应】猪肌肉注射本品时,注射部位可能会出现短暂的肿胀,并偶尔伴有轻微疼痛。

【注意事项】1.禁用于对大环内酯类抗生素过敏的猪。

2.禁与其它大环内酯类或林可酰胺类抗

专家咨询热线: 400-107-6699

生素同时使用。

3.本品对怀孕的母猪未进行安全性评估,请根据兽医的风险评估使用。

4.加米霉素可能对眼睛和/或皮肤有刺激性,应避免接触皮肤和/或眼睛。如不慎接触,应立即用水冲洗。

5.若不慎注入人体,需立即就医,并向医生提供本品标签或说明书。

6.用后需洗手。

7.置于儿童不可触及处。

【休药期】猪23日。

【规格】50ml : 7.5g

【包装】50ml/瓶×1瓶/盒

【贮藏】密闭保存。

【有效期】24个月;开启后28日。

公司地址:湖北省应城市城南经济开发区横一路

电话:0712-3131222

销售专线:027-83235377

邮编:432400

网址:www.hbyssw.cn