

【兽药名称】

通用名称：泰拉霉素注射液

商品名称：泰立达

英文名称：Tulathromycin Injection

汉语拼音：Tailameisu Zhusheye

【主要成分】泰拉霉素

【性 状】本品为无色至微黄色澄明液体。

【适 应 证】治疗和预防对泰拉霉素敏感的溶血巴氏杆菌、多杀巴氏杆菌、睡眠嗜血杆菌和支原体引起的牛呼吸道疾病；治疗和预防对泰拉霉素敏感的胸膜肺炎放线杆菌、多杀巴氏杆菌和肺炎支原体引起的猪呼吸道疾病。

【用法与用量】以泰拉霉素计。皮下注射：一次量，每1kg体重，牛2.5mg（相当于1ml/40kg体重）。每个注射部位的给药剂量不超过7.5ml。

颈部肌肉注射：一次量，每1kg体重，猪2.5mg（相当于1ml/40kg体重）。每个注射部位的给药剂量不超过2ml。

【不良反应】牛皮下注射本品时，常会引起注射部位出现短暂性的疼痛反应和局部肿胀，并局部肿胀可持续长达30日。猪肌肉注射后未见上述反应。在注射后约30日内，两种动物的注射部位仍有组织病理变化。

山东鲁抗舍里乐药业有限公司高新区分公司

地址：山东省济宁市东外环路6号 网 址：www.lkpc.com
销售联系电话：0537-2985938 技术服务电话：0537-2985832
质量联系电话：0537-2608743 传 真：0537-2985506

- 【注意事项】1.不得用于对大环内酯类抗生素过敏的动物。
2.本品不能与其它大环内酯类抗生素或林可霉素同时使用。
3.不得用于供生产人用乳品的泌乳期奶牛。
4.不得用于预计在2个月内分娩的可能生产人用乳品的怀孕母牛。
5.当多次取药时，建议使用专用吸取针头或多剂量注射器，以避免在瓶塞上扎孔过多。
6.建议在疾病的早期进行治疗，在给药后48小时内评价治疗效果。如果呼吸道疾病的症状仍然存在或增加，或出现复发，应改变治疗方案。
7.泰拉霉素对眼睛有刺激性，如果眼睛意外接触到本品，请立即用清水冲洗。
8.皮肤接触到泰拉霉素时，可引起过敏反应。如果皮肤意外接触到本品，请立即用肥皂和水冲洗。
9.用后请洗手。
10.置于儿童不可触及处。

【休药期】牛49日；猪33日。

【规格】50ml：5g

【贮藏】避光，密闭，在凉暗处保存。

【有效期】36个月。开启后28日。

【批准文号】兽药字150077169

【包装】50ml/瓶×1瓶/盒

【生产批号】见盒底

【生产日期】见盒底

【有效期至】见盒底

山东鲁抗舍里乐药业有限公司高新区分公司

地址：山东省济宁市东外环路6号 网 址：www.lkpc.com
销售联系电话：0537-2985938 技术服务电话：0537-2985832
质量联系电话：0537-2608743 传 真：0537-2985506