

Wszywka alkoholowa – chirurgiczna implantacja disulfiramu (Esperal)

Chirurgiczna implantacja disulfiramu (Esperal) wykonywana przez lekarza, po kwalifikacji medycznej.

Leczenie uzależnienia od alkoholu jest procesem złożonym, wymagającym świadomego zaangażowania pacjenta oraz wsparcia medycznego i terapeutycznego. Jedną z metod wspomagających leczenie alkoholizmu oraz utrzymanie abstynencji jest wszywka alkoholowa.

Zabieg wykonywany jest przez doświadczonego chirurga, w warunkach ambulatoryjnych, po wcześniejszej kwalifikacji medycznej. Przyjmujemy pacjentów prywatnie, bez skierowania.



Wszywka alkoholowa (Disulfiram-Esperal)

od 1500 zł

Umów konsultację

Zadzwoń teraz

★★★★★ 5.0 • Zobacz opinie Google

Wszywka alkoholowa-wprowadzenie

Wszywka alkoholowa nie stanowi samodzielnego leczenia uzależnienia, lecz może być elementem kompleksowego programu terapeutycznego u wybranych, współpracujących pacjentów. Zabieg polega na podskórnym wszczepieniu preparatu, który w przypadku spożycia alkoholu wywołuje reakcję disulfiramową o działaniu zniechęcającym do dalszego picia.

Wszywka alkoholowa może być rozważana jako element wspomagający leczenie uzależnienia od alkoholu dla pacjentów po wcześniejszej kwalifikacji medycznej i świadomej zgodzie.

Kiedy rozważyć wszywkę alkoholową?

Wszywka alkoholowa (Disulfiram-Esperal) może być rozważana jako element leczenia u osób, które:

- są świadome problemu alkoholowego
- podjęli próbę przerwania ciągu alkoholowego
- mają trudności z utrzymaniem abstynencji
- poszukują dodatkowego wsparcia w początkowej fazie leczenia

Decyzja o zastosowaniu wszywki alkoholowej zawsze wymaga indywidualnej konsultacji lekarskiej oraz świadomej zgody pacjenta.

Czym jest Disulfiram (Esperal)?

Disulfiram, znany również pod historyczną nazwą handlową Esperal, jest substancją leczniczą stosowaną jako środek wspomagający leczenie uzależnienia od alkoholu. Jego mechanizm działania polega na trwałym hamowaniu dehydrogenazy aldehydu octowego, enzymu odpowiedzialnego za metabolizm alkoholu.

Po spożyciu alkoholu dochodzi do nagromadzenia aldehydu octowego w organizmie, co wywołuje tzw. reakcję disulfiramową. Objawy tej reakcji mogą obejmować m.in. nudności, wymioty, zaczerwienienie skóry, kołatanie serca, duszność oraz silne samopoczucie.

Działanie to ma charakter awersyjny i służy wspieraniu abstynencji alkoholowej.

Skuteczność i ograniczenia metody

Dane medyczne wskazują, że disulfiram może być pomocny w czasowym utrzymaniu abstynencji u wybranych pacjentów. Forma implantacyjna, czyli wszywka alkoholowa, nie powinna być traktowana jako samodzielna metoda leczenia alkoholizmu.

Ekspert podkreśla, że:

- skuteczność wszywki zależy od współpracy pacjenta
- najlepsze efekty osiąga się w połączeniu z terapią uzależnień
- metoda ta budzi kontrowersje przy niewłaściwej kwalifikacji pacjenta

Jak wygląda zabieg implantacji disulfiramu?

Implantacja disulfiramu (esperalu) w Skarżysku-Kamiennej:

- wykonywana jest wyłącznie przez lekarza
- trwa zazwyczaj około 30 minut
- przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym
- polega na umieszczeniu żałowych tabletek disulfiramu podpowięziowo
- standardowo implantuje się 8–10 tabletek, rozmieszczonych „gwiazdźdźcie”

Pacjent nie powinien spożywać alkoholu przez co najmniej 12–48 godzin przed zabiegiem. Po zabiegu możliwy jest powrót do codziennych aktywności zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przeciwwskazania i bezpieczeństwo

Zabieg implantacji disulfiramu nie może być wykonany u pacjentów z:

- aktualnym spożyciem alkoholu lub ekspozycją na alkohol
- ciężkimi chorobami układu krążenia
- istotnymi zaburzeniami psychicznymi
- nadwrażliwością na disulfiram lub pochodne tiokarbaminianów
- ciążą

Szczególne ostrożności wymagają pacjenci z chorobami wątroby, nerek, padaczką, cukrzycą oraz chorobami układu oddechowego. Każdy pacjent przed zabiegiem przechodzi kwalifikację lekarską, a lekarz może odmówić wykonania zabiegu, jeśli istnieją przeciwwskazania.

Działania niepożądane i ryzyko spożycia alkoholu

Spożycie alkoholu podczas terapii disulfiralem może prowadzić do ciężkiej reakcji disulfiramowej, a w skrajnych przypadkach do:

- zaburzeń rytmu serca
- ciężkich drgawek
- niewydolności krążeniowo-oddechowej
- śpiączki

Disulfiram może również powodować działania niepożądane niezależne od alkoholu, w tym zaburzenia neurologiczne, uszkodzenie wątroby czy reakcje skórne. Pacjent musi być o tym szczegółowo poinformowany i pozostawać pod kontrolą lekarza.

Usunięcie wszywki alkoholowej

Usunięcie wszywki alkoholowej możliwe jest wyłącznie w warunkach medycznych i wymaga interwencji chirurgicznej. Nie ma możliwości samodzielnego usunięcia zaimplantowanego disulfiramu.

Lokalizacja i dostępność

Zabieg implantacji disulfiramu (wszywka alkoholowa) wykonywany jest w Centrum Medycznym 7. Z naszych usług korzystają pacjenci ze Skarżyska-Kamiennej, a także z Szydłowca, Kielc, Radomia, Starachowic, Warszawy i okolicznych województw.

Umów konsultację

Konsultacje i zabiegi implantacji wszywki alkoholowej (Esperalu) wykonuje

Ilek. Michał Szczubkowski

Chirurg z wieloletnim doświadczeniem



Zobacz Chirurga

Chirurg z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu schorzeń proktologicznych. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu chirurgii kolorektalnej oraz diagnostyki chorób odbytu.

Specjalizuje się w nowoczesnym, małoinwazyjnym leczeniu m.in. hemoroidów, szczelin odbytu, przetok oraz innych dolegliwości tej okolicy.

Jest chirurgiem skupiającym się na praktycznym, klinicznym leczeniu schorzeń proktologicznych, z indywidualnym podejściem do każdego pacjenta.