

Задача 16571

Расстояние между 4-ым и 9-ым темными кольцами Ньютона в отраженном свете равно 3 мм. Радиус кривизны линзы 25 м. Вычислите радиусы колец.

$$i = 4$$

$$k = 9$$



$$\Delta r = 3 \text{ мм} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ м}$$

$$R = 25 \text{ м}$$

$$r_4 = ?$$

$$r_9 = ?$$

При нормальном падении света геометрическая разность хода лучей 1 и 2 равна $2d$. В случае наблюдения в отражённом свете у луча 2 изменяется фаза колебаний на π при отражении от оптически более плотной среды (пластины). Это соответствует удлинению (или укорочению) оптического пути луча 2 на $\lambda/2$. Поэтому при вычислении разности хода лучей 1 и 2 нужно учесть слагаемое $\lambda/2$.



В результате разность хода равна

$$\Delta = 2d + \lambda/2.$$

Чтобы в этом месте был минимум интерференции лучей, должно выполняться условие

$$\Delta = 2m \cdot \lambda/2 = m\lambda, \quad m = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Приравняем выражения для Δ :

$$2d + \lambda/2 = m\lambda;$$

$$d = \frac{2m\lambda - \lambda}{4} = \frac{(2m-1)\lambda}{4}.$$

Из рисунка:

$$(R-d)^2 + r_m^2 = R^2;$$

$$R-d = \sqrt{R^2 - r_m^2};$$

$$d = R - \sqrt{R^2 - r_m^2}.$$

Приравняем выражения для d :

$$\begin{aligned}\frac{(2m-1)\lambda}{4} &= R - \sqrt{R^2 - r_m^2}; \\ R^2 - r_m^2 &= \left(R - \frac{(2m-1)\lambda}{4} \right)^2; \\ r_m &= \sqrt{R^2 - \left(R - \frac{(2m-1)\lambda}{4} \right)^2} = \sqrt{2R \cdot \frac{(2m-1)\lambda}{4} - \left(\frac{(2m-1)\lambda}{4} \right)^2} = \\ &= \sqrt{\frac{(2m-1)\lambda}{4} \cdot \left(2R - \frac{(2m-1)\lambda}{4} \right)}.\end{aligned}$$

Учитывая, что

$$2R \gg \frac{(2m-1)\lambda}{4},$$

равенство упростится:

$$r_m = \sqrt{\frac{(2m-1)\lambda}{4} \cdot 2R} = \sqrt{\frac{(2m-1)\lambda R}{2}}.$$

Для колец с номерами i и k соответственно имеем

$$\begin{aligned}r_i &= \sqrt{\frac{(2i-1)\lambda R}{2}}; \quad r_k = \sqrt{\frac{(2k-1)\lambda R}{2}}; \\ \Delta r &= r_k - r_i = \sqrt{\frac{(2k-1)\lambda R}{2}} - \sqrt{\frac{(2i-1)\lambda R}{2}} = \sqrt{\frac{\lambda R}{2}} \cdot (\sqrt{2k-1} - \sqrt{2i-1}); \\ \sqrt{\frac{\lambda R}{2}} &= \frac{\Delta r}{\sqrt{2k-1} - \sqrt{2i-1}}.\end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned}r_i &= \sqrt{\frac{\lambda R}{2}} \cdot \sqrt{2i-1} = \frac{\Delta r \cdot \sqrt{2i-1}}{\sqrt{2k-1} - \sqrt{2i-1}} = \frac{3 \cdot 10^{-3} \cdot \sqrt{2 \cdot 4 - 1}}{\sqrt{2 \cdot 9 - 1} - \sqrt{2 \cdot 4 - 1}} = \\ &= 5,37 \cdot 10^{-3} \text{ м} = 5,37 \text{ мм}; \\ r_k &= \sqrt{\frac{\lambda R}{2}} \cdot \sqrt{2k-1} = \frac{\Delta r \cdot \sqrt{2k-1}}{\sqrt{2k-1} - \sqrt{2i-1}} = \frac{3 \cdot 10^{-3} \cdot \sqrt{2 \cdot 9 - 1}}{\sqrt{2 \cdot 9 - 1} - \sqrt{2 \cdot 4 - 1}} = \\ &= 8,37 \cdot 10^{-3} \text{ м} = 8,37 \text{ мм}.\end{aligned}$$

Ответ: $r_4 = 5,37$ мм; $r_9 = 8,37$ мм.