이로부터 다음 방정식을 얻는다

$$1 = \frac{b^2}{r_{min}^2} + z\frac{r_{min}^2 b}{R^3} - 3z\frac{b}{R}, \tag{34}$$


그 해는 다음과 같다

$$r_{min} = \sqrt{\frac{(\frac{3zb}{R}+1) \pm \sqrt{(\frac{3zb}{R}+1)^2 - \frac{4zb^3}{R^3}}}{2\frac{zb}{R^3}}}. \tag{35}$$

다음 조건 $r_{min} = 0$은 $b = 0$일 때 성립해야 하므로 작은 쪽 근만 물리적 의미가 있다.
따라서 최종적으로

$$r_{min} = R\sqrt{\frac{\left(\frac{3GM}{v_\infty^2 R}+1\right) - \sqrt{(\frac{3GM}{v_\infty^2 R}+1)^2 - \frac{4b^2 GM}{R^3 v_\infty^2}}}{\frac{2GM}{v_\infty^2 R}}} = 4.97 \times 10^9 m. \tag{36}$$

2.3 **[1.0점]** 충돌을 피하는 최소 속력 $v_{\infty,min}$은 우주선이 구름에 접하는 경우에 해당한다.
그 궤적을 아래 그림에 나타냈다.



이때도 속도의 방사 성분은 영이 되며, 에너지 보존 법칙과
각운동량 보존 법칙은 다음과 같이 쓸 수 있다

$$\frac{m v_{\infty,min}^2}{2} = \frac{m0^2}{2} + \frac{m u_\tau^2}{2} - G\frac{Mm}{R}, \tag{37}$$

$$u_\tau R = v_\infty b, \tag{38}$$

이로부터

$$v_{\infty,min} = \sqrt{\frac{2GM}{R\left(\frac{b^2}{R^2}-1\right)}} = 252\ km/s. \tag{39}$$

2.4 **[0.6점]** 구름을 두께 Δr
인 얇은 층으로 차례로 분리하여 항상 구대칭을 유지한다고 하자.
구름의 반지름이 r일 때 얇은 층 하나를 떼어 내는 데 필요한 일은

$$\Delta A = G\frac{(\rho_4 \frac{4}{3}\pi r^3)(\rho_4 4\pi r^2 \Delta r)}{r} = \frac{16}{3}\pi^2 G\rho_4^2 r^4 \Delta r, \tag{40}$$

따라서 구름 전체를 분해하는 데 필요한 일은

$$A = \frac{16}{3}\pi^2 G\rho_4^2 \int_0^R r^4 \Delta r = \frac{16}{15}\pi^2 G\rho_4^2 R^5 = 1.33 \times 10^{45} J. \tag{41}$$

	평가 항목	배점	
1.1	쿨롱 법칙과 뉴턴의 만유인력 법칙 사이의 유사성 (1): $F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{12}^2}$ 및 $F = G\frac{m_1 m_2}{r_{12}^2}$.	0.2	**0.7**
	식 (2) $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$	0.2	
	식 (4) $h = \frac{g_1}{2\pi G\rho_1}$	0.2	
	다음의 수치 $h = 78.0km$	0.1	
1.2	식 (5) $\Omega_1 = 2\pi$	0.2	**0.5**
	식 (6) $\alpha = \frac{g_1}{2\pi}$ 또는 $\alpha = G\rho_1 h$	0.2	
	다음의 수치 $\alpha = 1.56 \times 10^{-2} m/s^2$	0.1	