
1.5	(10) $\lambda_{1,2} = 2 \pm \sqrt{3}$	0.2	**1.0**
	(11) $x_k = C_1\lambda_1^k + C_2\lambda_2^k$	0.2	
	(12) $\begin{cases} C_1 + C_2 = A \\ C_1\lambda_1^N + C_2\lambda_2^N = B \end{cases}$	0.2	
	(13) $\begin{cases} C_1 = \dfrac{B - A\lambda_2^N}{\lambda_1^N - \lambda_2^N} \\ C_2 = \dfrac{A\lambda_1^N - B}{\lambda_1^N - \lambda_2^N} \end{cases}$	0.2	
	(14) $x_k = \dfrac{A\left(\lambda_1^{N-k} - \lambda_2^{N-k}\right) + B\left(\lambda_1^k - \lambda_2^k\right)}{\lambda_1^N - \lambda_2^N}$	0.2	
1.6	(16) $x_k = \dfrac{Aq_{N-k} + Bq_k}{q_N}$	0.5	**0.5**
2.1		0.3	**0.8**
	(17) $R = \dfrac{7}{12}R_0$	0.5	
2.2	(18) $y_k = -x_k$	0.1	**0.2**
	(19) $x_{N-k} = x_k$	0.1	
2.3	(20) $\dfrac{x_{k-1} - x_k}{R_0} + \dfrac{x_{k+1} - x_k}{R_0} + \dfrac{y_k - x_k}{R_0} = 0$	0.5	**1.0**
	(21) $x_{k+1} - 4x_k + x_{k-1} = 0$	0.5	
2.4	(22) $x_0 = \varphi_0$	0.1	**0.2**
	(23) $x_N = x_0$	0.1	
2.5	(24) $x_k = \dfrac{Aq_{N-k} + Bq_k}{q_N} = \varphi_0 \dfrac{q_{N-k} + q_k}{q_N}$	0.2	**0.2**
2.6	(25) $I = \dfrac{4x_0 - 2x_1}{R_0}$	0.2	**0.4**
	(26) $I_0 = \dfrac{2\varphi_0}{R_0}\dfrac{p_N - 1}{q_N}$	0.2	
2.7	(27) $U_0 = 2\varphi_0$	0.1	**0.2**
	(28) $R_N = \dfrac{U_0}{I_0} = R_0\dfrac{q_N}{p_N - 1}$	0.1	
2.8	2 2. N | p_N | q_N | R_N 1 | 2 | 1 | R_0	1.0	**1.0**