$$-\frac{1}{4}p_0SL\left(1+\frac{\rho g(L-h)}{p_0}\right)\sqrt{\left(1+\frac{h}{L}+\frac{p_0}{\rho gL}\right)^2-\frac{4h}{L}}. \quad (16)$$

수치를 대입하면


$$Q = 17.0\ kJ. \quad (17)$$

채점 기준

№	평가 항목	배점	
1	식 (1) $p = p_0 + \rho g(L - x_0)$	0,25	**2,0**
	식 (2) $p_0Sh = vRT_0$	0,25	
	식 (3) $pS(h - x_0) = vRT_0$	0,25	
	식 (4) $\rho g x_0^2 - [p_0 + \rho g(L + h)]x_0 + \rho ghL = 0$	0,25	
	식 (5) $x_0 = \frac{1}{2}\left[\frac{p_0}{\rho g} + L + h \pm \sqrt{\left(\frac{p_0}{\rho g} + L + h\right)^2 - 4hL}\right]$	0,25	
	식 (6) $x_0 = \frac{1}{2}\left[\frac{p_0}{\rho g} + L + h - \sqrt{\left(\frac{p_0}{\rho g} + L + h\right)^2 - 4hL}\right]$	0,5	
	식 (7) $x_0 = 7{,}86 \cdot 10^{-2}\ m$	0,25	
2	식 (8) $p(x) = p_0 + \rho g(L - x)$	0,5	**0,5**
3	식 (9) $p(x)S(h - x) = vRT(x)$	0,5	**1,0**
	식 (10) $T(x) = T_0\left(1 - \frac{x}{h}\right)\left(1 + \frac{\rho g(L-x)}{p_0}\right)$	0,5	
4	식 (11) $T_m = T_0\left(1 + \frac{\rho gL}{p_0}\right)$	0,5	**1,0**
	식 (12) $T_m = 350\ K$	0,5	
5	식 (13) $\Delta U = \frac{5}{2}vR(T - T_0) = \frac{5}{2}\rho gLSh$	0,5	**2,5**
	식 (14) $A = \frac{1}{2}p_0SL\left(1 + \frac{p_0}{2\rho gL} + \frac{\rho gL}{2p_0}\left[1 + \frac{2h}{L} - \frac{h^2}{L^2}\right]\right) - -\frac{1}{4}p_0SL\left(1 + \frac{\rho g(L-h)}{p_0}\right)\sqrt{\left(1 + \frac{h}{L} + \frac{p_0}{\rho gL}\right)^2 - \frac{4h}{L}}.$	0,5	
	식 (15) $Q = \Delta U + A$	0,5	
	식 (16) $Q = \frac{1}{2}p_0SL\left(1 + \frac{p_0}{2\rho gL} + \frac{\rho gL}{2p_0}\left[1 + \frac{12h}{L} - \frac{h^2}{L^2}\right]\right) - -\frac{1}{4}p_0SL\left(1 + \frac{\rho g(L-h)}{p_0}\right)\sqrt{\left(1 + \frac{h}{L} + \frac{p_0}{\rho gL}\right)^2 - \frac{4h}{L}}.$	0,5	
	식 (17) $Q = 17{,}0\ kJ$	0,5	
합계			**7,0**

문제 3. 지연과 감쇠 (16점)

1.1.1 전류가 흐르는 원형 고리의 자기장은 비오·사바르 법칙과 중첩 원리로 구하면 간단하다. 고리 미소 부분의 자기장 z 성분은 다음과 같이 주어진다



$$dB_z = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl}{r^2}\sin\theta \quad (1)$$

기하학적 관계를 이용하면

$$dB_z = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl}{r^2}\frac{R}{r} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{IdlR}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{IdlR}{\left(R^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}} \quad (2)$$

고리의 모든 미소 부분에 대해 합하면 최종적으로 다음을 얻는다