


العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
		التمرين الأول: (04 نقاط)
0.75	0.5	(1 أ) نقل الشكل وتمثيل الحدود الأربعة الأولى على محور الفواصل
	0.25	(ب) وضع تخمين: (u_n) متزايدة تماما ومتقاربة.
1.5	0.5	(2 أ) البرهان أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $\frac{1}{2} \leq u_n < 1$
	0.5	(ب) لدينا: من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} - u_n = \frac{u_n(3 - \sqrt{4u_n^2 + 5})}{\sqrt{4u_n^2 + 5}}$
	0.25	وبما أن $3 - \sqrt{4u_n^2 + 5} > 0$ فإن (u_n) متزايدة تماما. (تقبل كل طريقة صحيحة للحل)
	0.25	استنتاج أن المتتالية (u_n) متقاربة.
0.75	0.5 0.25	(3) من أجل كل عدد طبيعي n : $v_{n+1} = \frac{9}{5}v_n$ ومنه (v_n) هندسية أساسها $\frac{9}{5}$ و $v_0 = \frac{1}{3}$
1	0.25	(4 أ) عبارة الحد العام v_n : $v_n = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{9}{5}\right)^n$ و $u_n = \sqrt{\frac{1}{1 + 3\left(\frac{5}{9}\right)^n}}$
	0.5	
	0.25	(ب) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$
		التمرين الثاني : (04 نقاط)
0.75	0.5+ 0.25	(1) نجد: $PGCD(693; 216) = 9$ واستنتاج : (E_1) و (E_2) متكافئتان
1	0.25	(2) التحقق أن الثنائية $(2; 3)$ حل للمعادلة (E_2)
	0.75	و حلول المعادلة (E_2) في $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ هي الثنائيات: $(24k + 2; 77k + 3)$; $k \in \mathbb{Z}$
0.75	0.75	(3) لدينا: $ y - x \leq 54$ يكافئ $k \in \{-1; 0; 1\}$ وبالتالي: $(x; y) \in \{(-22; -74), (2; 3), (26; 80)\}$
1.5	2x0.5	(4) $N = \overline{1\alpha\beta 0\alpha}^6 = 217\alpha + 36\beta + 1296$ و $N = \overline{\beta 68\alpha}^9 = \alpha + 729\beta + 558$
	0.25	مع $0 < \beta < 6$ و $0 \leq \alpha < 6$
	0.25	لدينا: $\alpha + 729\beta + 558 = 217\alpha + 36\beta + 1296$ تكافئ $693\beta - 216\alpha = 738$ ومنه: $N = 2019$ و $\beta = 2$ و $\alpha = 3$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)								
مجموعة	مجزأة									
التمرين الثالث: (05 نقاط)										
1.5	2x0.75	(1) $P(A) = \frac{11}{21}$ ، $P(B) = \frac{12}{21}$.								
1	0.5	(2) أ) $P(A \cap B) = \frac{C_4^1 \times C_1^1}{21} = \frac{4}{21}$								
	0.5	ب) الاستنتاج: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{19}{21}$								
1.5	0.25 1.25	(3) مجموعة قيم X هي $\{4; 6; 9\}$ وقانون احتمال X معرف بالجدول التالي: <table><tr><td>x_i</td><td>4</td><td>6</td><td>9</td></tr><tr><td>$P(X = x_i)$</td><td>$\frac{10}{21}$</td><td>$\frac{10}{21}$</td><td>$\frac{1}{21}$</td></tr></table>	x_i	4	6	9	$P(X = x_i)$	$\frac{10}{21}$	$\frac{10}{21}$	$\frac{1}{21}$
x_i	4	6	9							
$P(X = x_i)$	$\frac{10}{21}$	$\frac{10}{21}$	$\frac{1}{21}$							
1	2x0.5	(4) تكون اللعبة عادلة من أجل $x^2 - y^2 = 13$ ومنه: $x = 7$ ، $y = 6$.								
التمرين الرابع: (07 نقاط)										
0.75	0.5 0.25	(I) 1) من أجل كل x من $]0; +\infty[$: $g'(x) = \frac{x+2}{x}$ و $g'(x) > 0$ ومنه g متزايدة تماما على $]0; +\infty[$.								
1	0.25+0.75	(2) نجد: $g(1) = 0$ ، $g(x)$ سالبة تماما على $]0; 1[$ وموجبة تماما على $]1; +\infty[$								
1	2x0.25	(II) 1) أ) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$. المستقيم ذي المعادلة $x = 0$ مقارب للمنحنى (C_f)								
	0.5	ب) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.								
1.25	0.5	(2) أ) من أجل كل عدد حقيقي x من $]0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$								
	0.5	ب) الدالة f متناقصة تماما على $]0; 1[$ ومتزايدة تماما على $]1; +\infty[$								
	0.25	جدول التغيرات								
1.5	0.5	(3) أ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - \ln x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{-1}{x} - \frac{2 \ln x}{x} \right) = 0$								
	0.25	التفسير الهندسي: المنحنى (Γ) مقارب للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$								
	0.25	ب) لدينا: $f(x) - \ln x = -\frac{1}{x}(1 + 2 \ln x)$								
	0.25	إشارة المقدار $f(x) - \ln x$								
	0.25	يكون المنحنى (C_f) فوق (Γ) على المجال $]0; e^{\frac{1}{2}}[$ و تحت (Γ) على $]e^{\frac{1}{2}}; +\infty[$								
	0.25	و $(C_f) \cap (\Gamma) = \left\{ A \left(e^{\frac{1}{2}}; \frac{-1}{2} \right) \right\}$								

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
0.75	0.5 0.25	<p>4) تبيان أن المنحنى (C_f) يتقاطع مع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتيهما α و β والتحقق أن: $0.5 < \alpha < 0.6$ و $2.9 < \beta < 3$</p>
0.75	0.25 0.5	<p>5) رسم (Γ) رسم (C_f)</p> 

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)								
مجموعة	مجزأة									
التمرين الأول: (04 نقاط)										
1.25	0.25 2x0.5	(I) لدينا عدد الحالات الممكنة : $C_9^3 = 84$ نجد: $P(A) = \frac{5}{84}$ ، $P(B) = 1 - \frac{5}{42} = \frac{37}{42}$								
2.25	0.25 0.75 2x0.5	(2) أ) قيم X هي 2 ، 3 و 4 $P(X = 3) = \frac{3}{7}$ وقانون احتمال X : <table><tr><td>x_i</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>$P(X = x_i)$</td><td>$\frac{5}{21}$</td><td>$\frac{9}{21}$</td><td>$\frac{7}{21}$</td></tr></table>	x_i	2	3	4	$P(X = x_i)$	$\frac{5}{21}$	$\frac{9}{21}$	$\frac{7}{21}$
	x_i	2	3	4						
$P(X = x_i)$	$\frac{5}{21}$	$\frac{9}{21}$	$\frac{7}{21}$							
	0.25	ب) $E(X) = \frac{65}{21}$								
0.5	2x0.25	(II) عدد الحالات الممكنة: $A_9^3 = 504$ و منه: $P(C) = 1 - \frac{A_4^3}{504} = \frac{20}{21}$								
التمرين الثاني: (04 نقاط)										
1.5	1	(1) أ) دراسة بواقي قسمة 3^n على 5 : من أجل $n = 4k$ نجد $3^n \equiv 1[5]$ ، من أجل $n = 4k + 1$ نجد $3^n \equiv 3[5]$ من أجل $n = 4k + 2$ نجد $3^n \equiv 4[5]$ ، من أجل $n = 4k + 3$ نجد $3^n \equiv 2[5]$								
	0.5	ب) باقي قسمة العدد: $8^{2020} - 2 \times 3^{1441} - 1$ على 5 هو 4								
0.75	0.75	(2) لدينا: $a_n \equiv 0[5]$ يكافئ : $n = 4k + 3$ و k عدد طبيعي								
1.75	0.5	(3) أ) القيم الممكنة للقاسم المشترك الأكبر للعددين a_n و b_n هي 1 و 5								
	0.5	ب) بيان أن: $a_n \equiv 0[5]$ اذا وفقط اذا كان $b_n \equiv 0[5]$								
	0.25	ج) قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون القاسم المشترك الأكبر للعددين a_n و b_n هو 5 هي $n = 4k + 3$ و k عدد طبيعي، بالتالي:								
	0.25	قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها a_n و b_n أوليان فيما بينهما هي: $n = 4k$ ، $n = 4k + 1$ و $n = 4k + 2$ مع k عدد طبيعي								
التمرين الثالث: (05 نقاط)										
1	1	(1) برهان بالتراجع، أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $-1 < u_n < 2$								
1.25	0.5	(2) أ) بيان أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} - u_n = \frac{(2 - u_n)(1 + u_n)}{u_n + 2}$								
	0.5	ب) المتتالية (u_n) متزايدة تماما على \mathbb{N} . الاستنتاج: المتتالية (u_n) متزايدة تماما ومحدودة من الأعلى فهي متقاربة								

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموعة	مجزأة	
2.75	1 0.25	(3) لدينا: $v_n = \frac{u_n + \alpha}{u_n + 1}$ حيث α عدد حقيقي. (أ) قيمة α حتى تكون (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{4}$ هي -2. ونجد $v_0 = -1$
	0.5	(ب) من: $v_n = \frac{u_n - 2}{u_n + 1}$ نجد: $u_n = \frac{v_n + 2}{1 - v_n}$ ولدينا: $v_n = -\left(\frac{1}{4}\right)^n$
	0.75	بالتالي: $u_n = \frac{2 \times 4^n - 1}{4^n + 1}$
	0.25	ونجد: $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$
التمرين الرابع: (07 نقاط)		
2	0.5	(1) (أ) بيان أنه من أجل كل x من $[-1; +\infty[$: $f'(x) = (1 - e^{-x})(2e^{-x} + 1)$
	0.5	(ب) $f'(x) < 0$ على $[-1; 0[$: و $f'(x) > 0$ على $]0; +\infty[$ مع: $f'(0) = 0$
	0.25	الاستنتاج: الدالة f متناقصة تماما على $[-1; 0]$ و متزايدة تماما على $]0; +\infty[$
	0.5 0.25	(ج) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ جدول التغيرات
1.25	0.5	(2) (أ) لدينا: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f(x) - \left(x - \frac{3}{4}\right) \right] = 0$ ومنه (Δ) مقارب مائل لـ (C_f)
	0.5	(ب) من إشارة $\left[f(x) - \left(x - \frac{3}{4}\right) \right]$
	0.25	نجد: (C_f) فوق (Δ) على $[-1; 0[$ و (C_f) تحت (Δ) على $]0; +\infty[$ و $(C_f) \cap (\Delta) = \left\{ A \left(0; -\frac{3}{4} \right) \right\}$
0.75	0.5	(3) لدينا: $f'(x) = 1$ يكافئ: $x = \ln 2$ بالتالي (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ)
	0.25	في النقطة التي فاصلتها $\ln 2$ و $(T): y = x - 1$
1.25	0.5	(4) لدينا: من أجل كل x من $[-1; +\infty[$: $f''(x) = e^{-x}(4e^{-x} - 1)$
	0.5	و f'' تتعدم عند $\ln 4$ مغيرة إشارتها بالتالي $w \left(\ln 4; -\frac{15}{6} + \ln 4 \right)$ نقطة انعطاف
	0.25	

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموعة	مجزأة	
1	2×0.25	<p>(5) رسم (Δ) و (T) رسم (C_f)</p>
	0.5	
0.75	0.25 0.5	<p>(6) حلول المعادلة $f(x) = x + m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) والمستقيم ذي المعادلة $y = x + m$ بالتالي للمعادلة حلان مختلفان يكافئ $m \in \left] -1; -\frac{3}{4} \right[$</p>