

## الجزء الثاني

## التمرين 08

1 – قانون التناقص الإشعاعي  $N = N_0 e^{-\lambda t}$  ، حيث  $N_0$  هو متوسط عدد الأنوية في بداية التفكك ،  $N$  هو متوسط عدد الأنوية في بعد المدة  $t$  من بداية التفكك .

2 – من أجل الحصول على عبارة ثابت الزمن نعوض في عبارة التناقص  $N$  بـ  $\frac{N_0}{2}$  وندخل اللوغاريتم النبري على الطرفين ، فجد ثابت الزمن  $\tau = \frac{t_{1/2}}{\ln 2}$  .

3 - لدينا كمية المادة في عينة  $(n)$  هي :  $n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M}$  (1)

حيث  $N$  هو العدد المتوسط للأنوية ،  $N_A$  هو عدد أفوقادرو ،  $m$  هي كتلة العينة ،  $M$  الكتلة المولية للعنصر .

من العلاقة (1) نستخرج عدد الأنوية الابتدائي  $N_0 = \frac{N_A}{M} m_0$  ، وبعد المدة  $t$  يكون هذا العدد  $N = \frac{N_A}{M} m$

بتعويض  $N$  و  $N_0$  بعبارتيهما في قانون التناقص نجد :  $\frac{N_A}{M} m = \frac{N_A}{M} m_0 e^{-\lambda t}$  ومنه قانون التناقص بعبارة أخرى :

$$m = m_0 e^{-\lambda t}$$


الكتلة المتبقية من الفرانسيوم 223 : نحسب قيمة الثابت الإشعاعي  $\lambda$  ،  $\lambda = \frac{0,69}{t_{1/2}} = \frac{0,69}{22} = 3,1 \times 10^{-2} \text{ mn}^{-1}$  ،

$$m = 15 \text{ fg} \quad , \quad m = m_0 e^{-\lambda t} = 1,0 \times 10^{-13} e^{-0,031 \times 60} = 1,5 \times 10^{-14}$$

$$4 - \text{ عدد الأنوية المتبقية : } N = \frac{N_A}{M} m = \frac{6,023 \times 10^{23} \times 1,5 \times 10^{-14}}{223} = 4 \times 10^7$$

$$\text{نشاط الكتلة المتبقية : } A = \lambda N = \frac{0,69}{22 \times 60} \times 4 \times 10^7 = 2,1 \times 10^4 \text{ Bq}$$

## التمرين 09




2 - كتلة الفوسفور 32 في العينة هي :  $m_0 = \frac{53}{100} \times 1 = 0,53 \text{ g}$  ، ثم بقسمة كتلة العينة على كتلة نواة واحدة من الفوسفور 32


$$\text{نجد عدد الأنوية ، } N_0 = \frac{0,53}{5,356 \times 10^{-23}} = 9,9 \times 10^{21}$$

3 – باستعمال قانون التناقص نحسب العدد المتوسط للأنوية في كل لحظة :

$t (j)$	0	5	10	15	20	25	30	35	40
$N(t) \times 10^{21}$	9,9	7,77	6,11	4,80	3,77	2,96	2,33	1,83	1,43



### التمرين 10



2 - ثابت النشاط الإشعاعي :  $\lambda = \frac{0,69}{t_{1/2}} = \frac{0,69}{60 \times 60} = 1,9 \times 10^{-4} s^{-1}$

3 - النشاط هو عدد التفككات في الثانية . المطلوب في هذا السؤال هو حساب النشاط علما أن عدد التفككات في المدة  $\Delta t = 6 s$  هو  $1,88 \times 10^{17}$  تفكك . (مدة القياس صغيرة جدا أمام نصف عمر البزموت)

النشاط هو  $A = \frac{\Delta N}{\Delta t} = \frac{1,88 \times 10^{17}}{6} = 3,1 \times 10^{16} Bq$

4 - العدد المتوسط للأنوية المشعة في لحظة القياس هو  $N = \frac{A}{\lambda} = \frac{3,1 \times 10^{16}}{1,92 \times 10^{-4}} = 1,61 \times 10^{20}$

5 - كتلة البزموت الحاضرة في المنبع هي :  $m = \frac{M \cdot N}{N_A} = \frac{212 \times 1,61 \times 10^{20}}{6,023 \times 10^{23}} = 5,6 \times 10^{-2} g = 56 mg$

6 - نتأكد أولا أن النشاط لا يتغير في المدة  $\Delta t = 1mn$

لدينا في اللحظة  $t$  :  $A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$  (1)

ويكون لدينا في اللحظة  $(t + \Delta t)$  :  $A(t + \Delta t) = A_0 e^{-\lambda(t + \Delta t)}$  (2)

بقسمة العلاقة (2) على (1) نكتب :  $\frac{A(t + \Delta t)}{A(t)} = \frac{A_0 e^{-\lambda(t + \Delta t)}}{A_0 e^{-\lambda t}} = e^{-\lambda t} e^{\lambda t} e^{-\lambda \Delta t} = e^{-\lambda \Delta t} = e^{-1,9 \times 10^{-4} \times 60} = 0,988 \approx 1$

إذن يمكن اعتبار  $A(t) = A(t + \Delta t)$  ، وبالتالي النشاط يبقى ثابتا خلال دقيقة واحدة .

نحسب عدد التفككات في خلال دقيقة والتي لم تغيّر النشاط بكيفية محسوسة ،  $\Delta N = A \cdot \Delta t = 3,1 \times 10^{16} \times 60 = 1,86 \times 10^{18}$  ، وهو متوسط عدد الأنوية المتفككة ، وهو نفس عدد أنوية الهيليوم الصادرة حسب معادلة التفكك .

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{1,86 \times 10^{18}}{6,023 \times 10^{23}} = 3,1 \times 10^{-6} \text{ mol}$$
 كمية مادة الهيليوم الناتجة هي

$$V = n V_m = 3,1 \times 10^{-6} \times 22,4 = 6,9 \times 10^{-6} \text{ L}$$
 حجم غاز الهيليوم في الشروط النظامية هو

7 - نعتبر في اللحظة  $t$  النشاط هو  $A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$  ، وفي اللحظة  $(t + \Delta t)$  هو  $A(t + \Delta t) = A_0 e^{-\lambda(t + \Delta t)}$  ، ومنه

$$\frac{A(t + \Delta t)}{A(t)} = e^{-\lambda \Delta t} \text{ ، وبالتالي : } A(t + \Delta t) = A(t) e^{-\lambda \Delta t}$$


$$A(t) = 3,1 \times 10^{16} \text{ Bq}$$

$\Delta t \text{ (s)}$	3600	$24 \times 3600$	$60 \times 3600$
$A(\text{Bq})$	$1,55 \times 10^{16}$	$2,3 \times 10^9$	$4,7 \times 10^{-2}$

بعد 60 ساعة تصبح قيمة النشاط صغيرة جدا ، فإذا حسبنا العدد المتوسط للأنوية المشعة في هذه اللحظة نجد :

$$N = \frac{A}{\lambda} = \frac{4,7 \times 10^{-2}}{1,9 \times 10^{-4}} = 247!!$$
 نعتبر أن العينة اختفت ولم تصبح تشع .

## التمرين 11



1 - في اللحظة  $t$  تكون كتلة العينة  $m(t) = m_0 e^{-\lambda t}$  (1)

وفي اللحظة  $(t + \Delta t)$  تكون كتلة العينة  $m(t + \Delta t) = m_0 e^{-\lambda(t + \Delta t)}$  (2)

$$m(t + \Delta t) = \frac{1}{10} m(t)$$
 ولدينا

$$\frac{1}{10} = e^{-\lambda \Delta t} \text{ : نجد (1) على (2) } (3)$$

( الكتلة الباقية تمثل  $\frac{1}{10}$  من الكتلة الابتدائية ، وكذلك متوسط الأنوية )

$$\lambda = \frac{0,69}{t_{1/2}} = \frac{0,69}{3,825} = 0,18 \text{ j}^{-1}$$
 لدينا الثابت الإشعاعي ، وبذلك نحسب المدة الزمنية بإدخال اللوغاريتم على طرفي العلاقة (3) ،

$$\ln 0,1 = -\lambda \Delta t \text{ ، ومنه } \Delta t = \frac{2,3}{\lambda} = \frac{2,3}{0,18} = 12,7 \text{ jrs}$$

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{10^4 \times 2 \times 10^{-6}}{8,31 \times (30 + 273)} = 7,9 \times 10^{-6} \text{ mol}$$
 2 - بتطبيق قانون الغازات المثالية :  $P V = n R T$  ، ومنه :

$$N_0 = n \times N_A = 7,9 \times 10^{-6} \times 6,023 \times 10^{23} = 4,76 \times 10^{18}$$
 3 - عدد الأنوية هو  $N_0$  ، حيث :

4 - اختصارا نعتبر عدد الأنوية  $N_0$  كان متواجدا في اللحظة  $t = 0$  ، وبالتالي يكون النشاط في هذه اللحظة :

$$A_0 = \lambda N_0 = \frac{0,69}{3,825 \times 24 \times 3600} \times 4,78 \times 10^{18} = 10^{13} \text{ Bq}$$

لكي نحسب النشاط بعد 100 يوم ، أي في اللحظة  $t = 100 \text{ jrs}$  ، نطبق العلاقة :

$$A = A_0 e^{-\lambda t} = 10^{13} \times e^{-0,18 \times 100} = 1,52 \times 10^5 \text{ Bq}$$

## التمرين 12

1 - نجد علاقة بين النشاط  $A$  في اللحظة  $t$  والنشاط في اللحظة  $t = 0$  عندما يكون الزمن  $t$  من مضاعفات زمن نصف العمر .

لدينا :  $A = A_0 e^{-\frac{\ln 2}{t_{1/2}} t}$  ، نضع :  $t = n t_{1/2}$  ، فيصبح  $A = A_0 e^{n \ln(\frac{1}{2})} = A_0 e^{\ln(\frac{1}{2})^n} = \frac{A_0}{2^n}$

لأن :  $e^{\ln x} = x$

$t$	$t_{1/2}$	$2 t_{1/2}$	$3 t_{1/2}$	$4 t_{1/2}$	$5 t_{1/2}$
A (Bq)	$\frac{A_0}{2} = 16 \times 10^6$	$\frac{A_0}{4} = 8 \times 10^6$	$\frac{A_0}{8} = 4 \times 10^6$	$\frac{A_0}{16} = 2 \times 10^6$	$\frac{A_0}{32} = 10^6$



2 -  $A = A_0 e^{-\lambda t}$  ، ولدينا  $\lambda = \frac{0,69}{8} = 0,086 \text{ jrs}^{-1}$

، وبإدخال اللوغاريتم النيبيري على الطرفين نجد  $t = 13,5 \text{ jrs}$

3 - تمثيل  $\ln A = f(t)$

نحسب قيم  $\ln A$  ونضعها على الجدول التالي :

$t \text{ (j)}$	0	8	16	24	32	40
$\ln A$	17,3	16,6	15,9	15,2	14,5	13,8



4 - ندخل اللوغاريتم النيبيري على طرفي علاقة النشاط :  $\ln A = \ln A_0 e^{-\lambda t}$

$$\ln A = \ln A_0 - \lambda t$$

معادلة المستقيم الذي حصلنا عليه هي من الشكل :  $y = ax + b$  ، وهي :  $\ln A = -\lambda t + \ln A_0$  ميل المستقيم هو  $-\lambda$

$$\lambda = 1,08 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1} \quad , \quad -\lambda = -\frac{CB}{BA} = -\frac{3}{32 \times 24 \times 3600}$$

### التمرين 13

1 - يكون الإنحفاظ في الشحنة وفي عدد النوكليونات  $^{137}_{55}\text{Cs} \rightarrow ^{137}_{56}\text{Ba} + ^0_{-1}e$  .

2 - الطاقة المحررة هي :  $E = \Delta m c^2$  ، حيث  $\Delta m$  هو الفرق بين كتلتي المتفاعلات والناتج ، و  $c$  هو ثابت أنشتاين .

$$E = (m_{\text{Cs}} - m_{\text{Ba}} - m_e) c^2 = (136,90707 - 136,90581 - 0,0005486) \times c^2 \times 932,5 / c^2$$

حيث 0,0005486 هي كتلة الإلكترون بوحدة الكتل الذرية  $u$

الطاقة المحررة بتفكك السيزيوم 137 هي :  $E = 0,66 \text{ MeV}$


3 - المقصود بالدور هو زمن نصف العمر . ضياع 99 % معناه في كل 100 نواة متوسطا بقيت نواة واحدة ، أي :  $\frac{N}{N_0} = 0,01$

وذلك باعتبار  $N_0$  عدد الأنوية في اللحظة  $t = 0$  و  $N$  عدد الأنوية في اللحظة  $t$  .

$$\lambda = \frac{0,69}{t_{1/2}} = \frac{0,69}{2} = 0,345 \text{ an}^{-1} \quad , \quad \frac{N}{N_0} = e^{-\lambda t}$$

$$\ln 0,01 = -\lambda t \quad , \quad \text{ومنه } t = \frac{-\ln 0,01}{\lambda} = \frac{4,6}{0,345} = 13,34 \text{ ans}$$

### التمرين 14



1 - نكتب المعادلة بالشكل :  $^{238}_{92}\text{U} \rightarrow ^{206}_{82}\text{Pb} + x \text{ } ^4_2\text{He} + y \text{ } ^0_{-1}e$

بتطبيق قانوني الإنحفاظ في الشحنة وفي عدد النوكليونات نكتب :

$$(1) \quad 92 = 82 + 2x - y$$

$$(2) \quad 238 = 206 + 4x$$

من المعادلة (2) نجد :  $x = 8$  ، وبالتعويض في المعادلة (1) نجد :  $y = 6$

2 - نعوض  $N$  بـ  $\frac{N_0}{2}$  في علاقة التناقص  $N = N_0 e^{-\lambda t}$  ونجد  $\frac{1}{2} = e^{-\lambda t_{1/2}}$  ، وبإدخال اللوغاريتم النيبيري على طرفي هذه

$$\text{العلاقة نجد } \lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$$

3 - التناقص في متوسط عدد الأنوية هو عدد أنوية الرصاص :  $N_{\text{Pb}} = N_{U_0} - N_U$  (2)

$$(3) \quad N_{\text{Pb}} = N_{U_0} - N_{U_0} e^{-\lambda t} = N_{U_0} (1 - e^{-\lambda t})$$

4 - من العلاقة (3) نكتب :  $\frac{N_{\text{Pb}}}{N_{U_0}} = 1 - e^{-\lambda t}$

لدينا قانون التقريب :  $e^\varepsilon \approx 1 + \varepsilon$  ، حيث  $\varepsilon$  عدد حقيقي صغير أمام 1 . مثال :  $\varepsilon = 0,01$  ، يكون لدينا :

$$1 + \varepsilon = 1 + 0,01 = 1,01 \text{ و } e^\varepsilon = 1,01$$

نعوض في العلاقة (4) بـ  $\lambda = \frac{0,7}{t_{1/2}}$  :  $\frac{N_{Pb}}{N_{U_0}} = 1 - e^{-\frac{0,7}{t_{1/2}}t}$  ، ولدينا  $t$  أصغر بكثير من  $t_{1/2}$  وبالتالي تصبح العلاقة من الشكل :

$$\frac{N_{Pb}}{N_{U_0}} = 1 - (1 - \varepsilon) = \varepsilon = \frac{0,7}{t_{1/2}}t$$
 ، وبالتالي يمكن تطبيق التقريب :  $\frac{N_{Pb}}{N_{U_0}} = 1 - e^{-\varepsilon}$

$$(5) \quad t = \frac{1}{0,7} \frac{N_{Pb}}{N_{U_0}} t_{1/2} \quad \text{ومنه :}$$

$$5 - \text{ لدينا عدد الأنوية في عينة : } N = \frac{m \cdot N_A}{M} \text{ ، إذن بالنسبة للرصاص : } N_{Pb} = \frac{10 \times 10^{-3} \times 6,023 \times 10^{23}}{206} = 29,2 \times 10^{18}$$

$$\text{ أما بالنسبة لعدد أنوية اليورانيوم في اللحظة } t \text{ فهو } N_U = \frac{1 \times 6,023 \times 10^{23}}{238} = 25,3 \times 10^{20}$$



$$\text{ ومن العلاقة (2) نحسب } N_{U_0} = N_{Pb} + N_U = 29,2 \times 10^{18} + 25,3 \times 10^{20} = 25,6 \times 10^{20} \approx N_U$$

$$\text{ بالتعويض في العلاقة (5) نجد الزمن المطلوب : } t = 4,5 \times 10^9 \frac{29,2 \times 10^{18}}{2530 \times 10^{18}} \times \frac{1}{0,7} = 7,42 \times 10^7 \text{ ans}$$

## التمرين 15

### ملاحظة :

عندما تتفكك نواة لإعطاء نواة إبن ، نادرا ما تكون هذه النواة الإبن في حالتها الأساسية (أي غير المثارة) .



2 - نحسب نقص الكتلة في هذا التفكك :

كتلتا الذرتين  ${}^{24}\text{Na}$  و  ${}^{24}\text{Mg}$  المضبوطتان هما على التوالي:

$$23,97846 \text{ u و } 23,984929 \text{ u}$$


$$\Delta m = (m_{\text{Na}} - m_{\text{Mg}} - m_e)$$

$$\Delta m = 23,984929 - 23,97846 - 0,000548 = 5,92 \times 10^{-3} \text{ u}$$

الطاقة المحررة عن تفكك نواة الصوديوم 24 هي :

$$E_{\text{lib}} = 0,00592 \times 931,5 = 5,51 \text{ MeV}$$

إذا صدرت نواة المغنيزيوم في حالة مثارة فإنها تُصدر فوتونات (إشعاعات كهرومغناطيسية  $\gamma$ )




إذا صدرت نواة المغنيزيوم في حالتها الأساسية فإن الطاقة المحررة (5,51 MeV) تُقدم كلها للإلكترون  ${}_{-1}^0e$  على شكل طاقة حركية .

3 - إذا صدرت نواة المغنيزيوم في الحالة المثارة 2 ، فهذا يُعني أولا أن النواة تبعث فوتونا طاقته 4,12 MeV


أما الطاقة 1,39 MeV  $E$  تُقدم على شكل طاقة حركية للإلكترون (باهمال طاقة النوترينو  $\nu$  طبعاً)

مستويات الطاقة للنظير  ${}^{24}\text{Mg}$  (MeV)



**ملاحظة :** عندما تنطلق قذيفة من مدفع نلاحظ رجوع المدفع للخلف ، هذه الظاهرة نسميها إرتداد المدفع . إن رجوع المدفع للخلف يحتاج لطاقة يُحوّلها لطاقة حركية . هذا ما يحدث عند انبعاث الإلكترون فإن النواة ترتد ، ونحن قمنا بإهمال الارتداد .

## التمرين 16



2 – القيمة الصحيحة للدور (زمن نصف العمر) هي  $t_{1/2} = 9,27 \text{ mn}$

$$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{0,69}{9,27} = 7,4 \times 10^{-2} \text{ mn}^{-1}$$

3 – الكتلة الموجودة في اللحظة  $t$  هي :  $\frac{1}{10} m_0$

$$\text{ولدينا } m = m_0 e^{-\lambda t} \text{ ، وبالتعويض الكتلة } m \text{ بعبارتها ، نكتب } \frac{1}{10} m_0 = m_0 e^{-\lambda t} \text{ ، ومنه } \frac{1}{10} = e^{-\lambda t}$$

بإدخال اللوغاريتم النبيري على طرفي هذه العلاقة نجد  $-2,3 = -\lambda t$  ، ومنه :  $t = 31 \text{ mn}$


4 – النشاط : لدينا  $A = \lambda N$  (1)

$$\text{نحسب أولا عدد الأنوية } N = N_A \frac{m}{M} = 6,023 \times 10^{23} \frac{1 \times 10^{-6}}{139} = 43 \times 10^{14}$$

$$\text{ولدينا الثابت الإشعاعي } \lambda = \frac{0,69}{9,27 \times 60} = 1,24 \times 10^{-3} \text{ s} \text{ ، وبالتعويض في العلاقة (1) نجد}$$

$$A = 1,24 \times 10^{-3} \times 43 \times 10^{14} = 5,3 \times 10^{10} \text{ Bq}$$

## التمرين 17



قانونا الانحفاظ هما إنحفاظ الشحنة وانحفاظ النوكليونات . نوع التفكك هو  $\beta^-$  .

2 – الزمن اللازم هو زمن نصف العمر  $t_{1/2} = 5570 \text{ ans}$

3 – العلاقة هي  $A = A_0 e^{-\lambda t}$

4 – لدينا  $A = 70 \text{ Bq}$  و  $A_0 = 120 \text{ Bq}$

نحسب عمر القطعة الخشبية من العلاقة  $A = A_0 e^{-\lambda t}$

$$70 = 120 e^{-\frac{0,69}{5570} t}$$

$$\frac{7}{12} = e^{-1,238 \times 10^{-4} t}$$

$$\ln \frac{7}{12} = -1,238 \times 10^{-4} t$$

$$\text{ومنه } t = 3041 \text{ ans}$$

## التمرين 18

$$A = 12 \text{ mn}^{-1} = \frac{12}{60} = 0,2 \text{ s}^{-1} = 0,2 \text{ Bq} \quad \text{لدينا}$$

$$A_0 = 12 \text{ mn}^{-1} = \frac{13,6}{60} = 0,226 \text{ s}^{-1} = 0,226 \text{ Bq}$$

1 - زمن نصف العمر هو الزمن اللازم لتفكك نصف العدد المتوسط للأنوية .

$$\text{لدينا } N = \frac{N_0}{2}, \text{ وبالتالي نكتب } \frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda t_{1/2}}, \text{ وبإدخال اللوغاريتم النبيري على الطرفين نجد } t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}.$$

$$2 - A = A_0 e^{-\lambda t}, \text{ ومنه } \frac{A}{A_0} = e^{-\lambda t}, \text{ وبإدخال اللوغاريتم النبيري على الطرفين نجد } -\lambda t = \ln \frac{A}{A_0} \text{ أو } \lambda t = \ln \frac{A_0}{A}.$$

$$\text{وبالتالي } t = \frac{\ln \frac{A_0}{A}}{\lambda}$$

$$3 - t = \frac{\ln \frac{0,226}{0,2}}{0,69} = \frac{0,125 \times 5570}{0,69} = 1009 \text{ ans} \quad \text{ومنه سنة صُنْع الباخرة هي } 1009 - 1983 = -974 \text{ م}$$

4 - الفرضية صحيحة لأن  $1000 > 974 > 700$

## التمرين 19

1 -

إعادة صياغة الفقرة الأولى من التمرين :

يشابه تفكك الأنوية عملية رمي مجموعة من

أزهار النرد (Dés) عددها  $N_0$  .

تتم هذه العملية كما يلي :

لدينا مجموعة من أزهار النرد عددها  $N_0 = 400$

( أزهار النرد عبارة عن مكعبات متماثلة - أي

6 أوجه - هذه الأوجه مرقمة من 1 إلى 6 )

نقوم برميها فوق طاولة ، ثم نسحب من المجموعة

كل الأزهار التي تعطي الوجه رقم 6 .

نعتبر هذه الأزهار كأنها الأنوية التي تفككت ضمن مجموعة من الأنوية .


نعيد خلط الأزهار الباقية ، ثم نرميها ونقوم بسبب رقم 6 ، وهكذا ...

نعتبر أن كل عملية رمي توافق ثانية واحدة (1s) ، أي أن في الجدول الزمن يوافق  $N^\circ$  de lancé . أما Dés restants يوافق الأنوية

المتواجدة في اللحظة  $t$  . انتهى

$$(1) \Delta N = -pN\Delta t \quad \text{نجد}$$

حيث  $p$  هو احتمال الحصول على الوجه رقم 6 في الرمية الواحدة .





الثابت  $p$  يوافق ثابت التفكك  $\lambda$  ، وهذا الاحتمال طبعاً هو  $p = \frac{1}{6}$  ، أي احتمال 1 من 6 ( 6 هو عدد الأوجه وليس الرقم 6 المسجل على أحد الوجوه ) .

أما من أجل التجربة الثانية الإحتمال هو  $p' = \frac{1}{6} \times 2 = \frac{1}{3}$

من أجل  $\Delta t \rightarrow 0$  نكتب العلاقة (1) على الشكل  $\frac{dN}{dt} = -pN$  ، ويكون حل هذه المعادلة التفاضلية من الشكل  $N = N_0 e^{-pt}$

**ملاحظة :**


خلال تفكك الأنوية يكون دائماً  $p = \frac{1}{2}$  ، لأن النواة إما تتفكك أو لا تتفكك ، أي أن احتمال تفككها هو 50% .

2 - لدينا  $\ln \frac{N}{N_0} = -pt$  ، وبالتالي  $\ln \frac{N_0}{N} = pt$  ، وهي العلاقة التي نمثلها بيانياً ، وهي من الشكل  $y = ax$

التجربة الأولى :

رقم الرمية	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$\frac{N_0}{N}$	1	1,16	1,42	1,74	1,98	2,16	2,51	2,77	3,25	3,92	4,44	5	6,55	7,84	8,89
$\ln \frac{N_0}{N}$	0	0,15	0,35	0,55	0,68	0,77	0,92	1,02	1,18	1,36	1,49	1,61	1,88	2,06	2,18

رقم الرمية	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
$\frac{N_0}{N}$	10,52	14,28	16	21,05	28,57	30,77	36,36	44,44	50	57,14	66,67
$\ln \frac{N_0}{N}$	2,35	2,66	2,77	3,05	3,35	3,42	3,60	3,79	3,91	4,04	4,20




ثابت التفكك هو ميل المستقيم .

$$p = \lambda = \frac{8 \times 0,5}{12 \times 2} = 0,167 s^{-1}$$

التجربة الثانية :

رقم الرمية	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\frac{N_0}{N}$	1	1,46	2,03	2,83	3,81	5,33	6,89	9,30	14,28	21,05	33,33
$\ln \frac{N_0}{N}$	0	0,38	0,71	1,04	1,33	1,67	1,93	2,23	2,66	3,04	3,50



ثابت التفكك هو ميل المستقيم .

$$p' = \lambda' = \frac{6 \times 0,5}{9 \times 1} = 0,33 s^{-1}$$

3 - نصف العمر في كل حالة :

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{p} = \frac{0,69}{0,167} = 4,13 s$$

$$t'_{1/2} = \frac{\ln 2}{p'} = \frac{0,69}{0,33} = 2,09 s$$

ملاحظة :

يمكن التأكد من ثابت التفكك في كل تجربة

برسم المماسين للبيانين عند  $t = 0$

فيقطعان محور الزمن في ثابت الزمن  $\tau = \frac{1}{\lambda}$



4 - نصف عمر السيزيوم 137 هو

$$t_{1/2} = 30,2 ans$$

كل هذا شرحناه في مقدمة التمرين .



التمرين 20



$$N = \frac{A(t)}{\lambda} = \frac{A(t) \times t_{1/2}}{\ln 2} \quad - 2$$

3 - الطاقة المحررة عن تفكك البوتاسيوم 40 إلى كلسيوم 40 :

$$E_{lib(1)} = (m_K - m_{Ca} - m_e) c^2 \times \frac{931,5}{c^2} = (39,964 - 39,9626 - 0,000548) \times 931,5 = 0,79 MeV$$

4 - الطاقة المحررة عن تفكك البوتاسيوم 40 إلى أرغون 40 :

$$E_{lib(2)} = (m_K - m_{Ar} - m_e) c^2 \times \frac{931,5}{c^2} = (39,964 - 39,9624 - 0,000548) \times 931,5 = 0,98 MeV$$

5 - الطاقتان المحسوبتان سابقا هما الطاقتان المحررتان جرّاء تفكك نواة واحدة فقط .

عدد الأنوية في جسم الإنسان الذي يزن 70 kg هي :


$$N = \frac{A(t) \times t_{1/2}}{0,69} = \frac{5000 \times 1,28 \times 10^9 \times 365,25 \times 24 \times 3600}{0,69} = 2,93 \times 10^{11}$$

$$E'_{lib(1)} = \frac{89}{100} \times 0,79 \times 2,93 \times 10^{11} = 2,07 \times 10^{20} MeV$$
 الطاقة المحررة من هذه الأنوية عندما يتحول البوتاسيوم إلى كلسيوم :

$$E'_{lib(2)} = \frac{11}{100} \times 0,98 \times 2,93 \times 10^{11} = 0,32 \times 10^{20} MeV$$
 الطاقة المحررة من هذه الأنوية عندما يتحول البوتاسيوم إلى أرغون :

$$E_{lib} = E'_{lib(1)} + E'_{lib(2)} = 2,39 \times 10^{20} MeV$$
 الطاقة الكلية هي :

## التمرين 21



$$A = 232 - 4 = 228$$

$$Z = 90 - 2 = 88$$

من المعطيات نستنتج أن النوكليد  $^A_ZX$  هو  $^{228}_{88}Ra$

2 - الكتلة المولية (M) تحوي عدد أوفوقادرو ( $N_A$ ) من الأنوية ، أما الكتلة  $m_0$  تحوي العدد  $N_0$  من الأنوية ، وبالتالي بالقاعدة

$$N_0 = N_A \times \frac{m_0}{N_A} = 6,023 \times 10^{23} \times \frac{10^{-3}}{232} = 26 \times 10^{17}$$
 ومنه ،  $\frac{m_0}{M} = \frac{N_0}{N_A}$  :

3 - أ) نصف العمر للتوريوم هو المدة الزمنية اللازمة لتفكك نصف العدد المتوسط للأنوية الابتدائية .

.... « إن الجدول أعلاه يسمح باعطاء تأطير بصفة لفظية ، ماهو ؟ »

هذه العبارة غامضة ، نقوم بتوضيحها .

إن الجدول أعلاه يسمح بحصر زمن نصف العمر بين قيمتين يُطلب تعيينهما

الجواب :

زمن نصف العمر يوافق عدد الأنوية  $N = \frac{N_0}{2}$  المتواجدة آنذاك ، أي  $\frac{N}{N_0} = 0,5$  ، ونعلم أن هذه القيمة محصورة بين

$$0,46 \text{ و } 0,56 \text{ في الجدول ، إذن } 15 \text{ jrs} < t_{1/2} < 20 \text{ jrs}$$


ب) الجدول والبيان :

$t$ (jrs)	0	5	10	15	20
$\frac{N}{N_0}$	1	0,82	0,68	0,56	0,46
$-\ln \frac{N}{N_0}$	0	0,20	0,38	0,58	0,77

العلاقة النظرية : لدينا  $\frac{N}{N_0} = e^{-\lambda t}$  ، وبإدخال اللوغاريتم النبيري على الطرفين

$\ln \frac{N}{N_0} = -\lambda t$  ، أو  $-\ln \frac{N}{N_0} = \lambda t$  ، وهذه العلاقة توافق مستقيما معادلته

من الشكل :  $y = ax$  ، حيث  $\lambda$  تمثل الميل  $a$  .



(جـ)

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0,69}{3,85 \times 10^{-2}} = 17,9 \text{ jrs} \quad , \quad \lambda = \frac{0,5}{13} = 3,85 \times 10^{-2} \text{ jrs}^{-1} = \frac{3,85 \times 10^{-2}}{24 \times 3600} = 4,45 \times 10^{-7} \text{ s}^{-1}$$

4 - النشاط في اللحظة  $t = 0$  :


$$A_0 = \lambda N_0 = 4,45 \times 10^{-7} \times 26 \times 10^{17} = 1,16 \times 10^{12} \text{ Bq}$$

## التمرين 22

I - أسئلة تمهيدية

1 - تتميز نواة الذرة برقمها الشحني  $Z$  وعددها الكتلي  $A$  (عدد النوكليونات) .

2 -  $^{11}_6\text{C}$  و  $^{12}_6\text{C}$  نظيران ، لأن لهما نفس  $Z$  (6) ويختلفان في  $N$  (بالنسبة للأول  $N = 5$  وبالنسبة للثاني  $N = 6$ )



II - بعض أنماط الإشعاع

1 -  $\beta^-$  عبارة عن إلكترون  $^0_{-1}\text{e}$

$\alpha$  عبارة عن نواة الهليوم  $^4_2\text{He}$

2 - كتلة الإلكترون  $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

$$m_{\text{He}} = 2m_p + 2m_n = 2(1,673 + 1,675) \times 10^{-27} = 6,7 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

كتلة نواة الهليوم أكبر من كتلة الإلكترون (وكذلك كتلة البوزيترون  $^0_{+1}\text{e}$ ) بحوالي 7360 مرة .

### III - التصوير الوماض


طالع الصفحة 91 من - تجريب واستكشاف - للتعرف على كيفية استعمال النشاط الإشعاعي في الطب (الرسّامات) .

1 - زمن نصف العمر هو الزمن اللازم لتفكك نصف متوسط الأنوية  $N_0$  .

2 - في الطب نستعمل النوكليد المشع الذي يتناقص نشاطه بسرعة ، وهذا يتوافق مع  $^{131}I$  ، حيث أن خلال 400 يوم يتغير النشاط

من القيمة  $2 \times 10^5 \text{ Bq}$  إلى القيمة  $6 \times 10^{-3} \text{ Bq}$  .

### IV - المعالجة الإشعاعية



2 - (أ)  $N_0 = N_A \frac{m_0}{M} = 6,023 \times 10^{23} \times \frac{1 \times 10^{-6}}{60} = 10^{16}$

(ب) العبارة المطلوبة هي  $\frac{\Delta N}{\Delta t} = -\lambda N$  (1)

(ج) المطلوب هو : أعط عبارة  $\Delta N$  ، ليس : أعط العينة  $\Delta N$  .

(د) نعوض في العبارة (1)  $N = N_0 e^{-\lambda t}$  ، فنجد  $\Delta N = -\lambda \Delta t N_0 e^{-\lambda t}$  (2)

(د) النشاط في اللحظة  $t$  هو  $A = \frac{|\Delta N|}{\Delta t} = A_0 e^{-\lambda t}$  ، وبتعويض  $\Delta N$  من العلاقة (2) نكتب :  $\frac{\lambda \Delta t N_0 e^{-\lambda t}}{\Delta t} = A_0 e^{-\lambda t}$  ، ومنه


$$A_0 = \lambda N_0$$

(هـ) لدينا  $A = A_0 e^{-\lambda t}$  ، وبادخال اللوغاريتم النيبيري على الطرفين نكتب :

$$\ln A = \ln A_0 - \lambda t \quad \text{ومنه} \quad \ln A = \ln A_0 + \ln e^{-\lambda t}$$

(و) هذه العلاقة الأخيرة من الشكل  $y = ax + b$  ، حيث  $a$  توافق  $\lambda$  ، أما  $b$  توافق  $\ln A_0$  .

إن بيان هذه العلاقة يقطع محور الترتيب في  $\ln A_0$  وميله سالب ، إذن فهو يوافق البيان المعطى في التمرين .



(ز)  $-\lambda = -\frac{17,4 - 16,6}{7 - 1}$

$$\lambda = 0,13 \text{ an}^{-1}$$

(ح) العلاقة المطلوبة هي :  $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$

(ط)  $t_{1/2} = \frac{0,69}{0,13} = 5,23 \text{ ans} = 1,65 \times 10^8 \text{ s}$

### التمرين 23

1 - الدور الإشعاعي (زمن نصف العمر)  $T_A$  هو  $A$  لـ  $A$  (أو  $t_{1/2}$ )

$$\lambda_A = \frac{0,69}{T_A} = \frac{0,69}{15} = 4,6 \times 10^{-2} \text{ jrs}^{-1}$$

2 - نحسب عدد الأنوية الابتدائي :  $N_0 = N_A \frac{m_0}{M} = 6,023 \times 10^{23} \times \frac{20}{225} = 53 \times 10^{21}$

$$A_0 = \lambda N_0 = \frac{4,6 \times 10^{-2}}{24 \times 3600} \times 53 \times 10^{21} = 2,8 \times 10^{16} Bq \text{ هو النشاط الابتدائي}$$

3 - الاتزان الإشعاعي (أو التوازن القرني) : عندما تتفكك مجموعة من الأنوية لإعطاء أنوية غير مستقرّة ، فتبدأ هذه الأخيرة في التفكك في الوقت الذي مازالت المجموعة الأولى تتفكك ، نقول أن التوازن القرني قد حدث عندما يصبح نشاطا المجموعتين متساويين .

لدينا التفكك :  $A \rightarrow B \rightarrow C$

$$\alpha = \frac{m_A}{m_B} = \frac{3}{2} \text{ تكون النسبة}$$

$$(1) \quad N_{(A)} = N_A \frac{m_A}{M_A} \quad : \text{ في اللحظة } t \text{ يكون عدد أنوية } A$$

$$(2) \quad N_{(B)} = N_A \frac{m_B}{M_B} \quad : \text{ في اللحظة } t \text{ يكون عدد أنوية } B$$

حيث  $N_A$  هو عدد أفوقادرو .

بما أن النوكليد B ناتج عن تفكك النوكليد A حسب النمط  $\beta$  ، إذن  $M_A = M_B$  . (A لا يتغير في التفكك  $\beta$ )

$$(3) \quad \frac{N_{(A)}}{N_{(B)}} = \frac{m_A}{m_B} = \frac{3}{2} \quad : \text{ بقسمة (1) على (2) نجد}$$

بما أن نشاطي A و B متساويان ، نكتب  $\lambda_A N_{(A)} = \lambda_B N_{(B)}$  ، ومنه  $\frac{N_{(A)}}{N_{(B)}} = \frac{\lambda_B}{\lambda_A}$  ، وباستعمال العلاقة (3) نجد

$$\lambda_B = \frac{3}{2} \lambda_A = 1,5 \times 4,6 \times 10^{-2} = 6,9 \times 10^{-2} \text{ jrs}^{-1} \quad \text{ ومنه } \frac{\lambda_B}{\lambda_A} = \frac{3}{2}$$

$$T_B = \frac{\ln 2}{\lambda_B} = \frac{0,69}{6,9 \times 10^{-2}} = 10 \text{ jrs} \quad \text{ هو زمن نصف العمر لـ B}$$

$$4 - \text{ المعادلة التفاضلية الخاصة بتفكك A هي } \frac{dN_{(A)}}{dt} = -\lambda N_{(A)}$$

المعادلة التفاضلية الخاصة بتفكك B هي  $\frac{dN_{(B)}}{dt} = -\lambda N_{(B)} + \lambda_A N_{(A)}$  ، لأن في نفس الوقت B يتفكك ويزداد جرّاء تفكك A .

$$5 - \text{ يؤدي حل هاتين المعادلتين التفاضليتين إلى : } N_{(B)} = \frac{\lambda_A}{\lambda_A - \lambda_B} N_{(A)_0} (e^{-\lambda_B t} - e^{-\lambda_A t}) \quad \text{ حيث } K = \frac{\lambda_A}{\lambda_A - \lambda_B} N_{(A)_0}$$

هذا الحل معطى في التمرين  $N_{(B)} = \frac{\lambda_A}{\lambda_A - \lambda_B} N_{(A)_0} (e^{-\lambda_A t} - e^{-\lambda_B t})$  ، وهو حل خطأ .

**نعيد صياغة السؤال الأخير :** ... أثبت أنه في اللحظة  $t = t_0$  يمر  $N_B$  بقيمة عظمى ، ثم احسب قيمة  $t_0$  بالأيام .

القيمة العظمى لـ  $N_{(B)}$  تكون من أجل مشتق  $N_{(B)}$  بالنسبة للزمن يساوي الصفر .

$$\frac{dN_{(B)}}{dt} = -K \lambda_B e^{-\lambda_B t} + K \lambda_A e^{-\lambda_A t} \quad \text{ المشتق هو :}$$

من أجل  $\frac{dN_{(B)}}{dt} = 0$  يكون  $\lambda_B e^{-\lambda_B t} = \lambda_A e^{-\lambda_A t}$  ، ومنه  $\frac{\lambda_B}{\lambda_A} = \frac{e^{-\lambda_A t}}{e^{-\lambda_B t}}$

وبادخال اللوغاريتم النبيري على الطرفين نكتب :  $\ln \frac{\lambda_B}{\lambda_A} = (\lambda_B - \lambda_A)t$  ،  $\frac{\lambda_B}{\lambda_A} = \frac{e^{-\lambda_A t}}{e^{-\lambda_B t}} = e^{(\lambda_B - \lambda_A)t}$

القيمة  $t_0$  المطلوبة هي  $t_0 = \frac{\ln \frac{\lambda_B}{\lambda_A}}{\lambda_B - \lambda_A} = \frac{\ln \lambda_B - \ln \lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} = \frac{0,405}{2,3 \times 10^{-2}} = 17,6 \text{ jrs}$

## التمرين 24

1 - أ) من  $t = 0$  إلى  $t = t_0$  :

عدد الأنوية المتواجدة في كل ثانية هو عدد الأنوية الذي تنتجه في كل ثانية ( $\rho$ ) منقوص منه عدد التفككات في الثانية ( $\lambda N$ ) ، أي

$$\frac{dN}{dt} = \rho - \lambda N$$

، وبضرب طرفي هذه المعادلة في  $e^{\lambda t}$  نحصل على  $e^{\lambda t} \left( \frac{dN}{dt} + \lambda N \right) = \rho e^{\lambda t}$

$$\frac{dN}{dt} e^{\lambda t} + \lambda N e^{\lambda t} = \rho e^{\lambda t}$$

العبارة  $\frac{dN}{dt} e^{\lambda t} + \lambda N e^{\lambda t}$  تمثل مشتق جداء دالتين هما  $N$  و  $e^{\lambda t}$  ، وبالتالي نكتب  $\frac{d}{dt} (N e^{\lambda t}) = \rho e^{\lambda t}$

نكامل طرفي هذه المساواة (إيجاد الدالة الأصلية) :  $\int \frac{d}{dt} (N e^{\lambda t}) = \int \rho e^{\lambda t}$

، حيث  $K$  عبارة عن ثابت التكامل .  $N e^{\lambda t} = \rho \frac{e^{\lambda t}}{\lambda} + K$

من هذه العبارة نجد  $N = \frac{\rho}{\lambda} + K e^{-\lambda t}$  (1)

تحديد الثابت  $K$  : نعلم أنه في اللحظة  $t = 0$  يكون  $N = 0$  (ما زالت أنوية الكربون لم تُصنع)

وبالتعويض في العلاقة (1) :  $0 = \frac{\rho}{\lambda} + K$  ، ومنه  $K = -\frac{\rho}{\lambda}$

نعوّض عبارة  $K$  في المعادلة (1) ونجد  $N = \frac{\rho}{\lambda} (1 - e^{-\lambda t})$

(ب) من أجل  $t > t_0$  :

إنتهى تصنيع الكربون في اللحظة  $t_0$  ، فبعد هذه اللحظة تبدأ أنوية الكربون في التناقص فقط ولا تزداد .

$$\frac{dN}{N} = -\lambda dt \quad \text{، ومنه} \quad \frac{dN}{dt} = -\lambda N$$

نكامل طرفي هذه المساواة (إيجاد الدالة الأصلية) :  $\int \frac{dN}{N} = -\lambda \int_0^t dt$  ، وبالتالي  $\ln N + K = -\lambda [t]_0^t$

حيث  $K$  هو ثابت التكامل

$$N = e^{-\lambda t - K} \text{ ، وبالتالي } \ln N = -\lambda t - K \text{ ، ومنه } \ln N + K = -\lambda t$$

$$(2) \quad N = e^{-\lambda t} \times e^{-K} \text{ يمكن كتابة هذه العلاقة بالشكل}$$

تحديد الثابت K :

$$\frac{\rho}{\lambda}(1 - e^{-\lambda t_0}) = e^{-\lambda t_0} \times e^{-K} \text{ نكتب (2) وبالتعويض في العلاقة} \quad N = \frac{\rho}{\lambda}(1 - e^{-\lambda t}) \text{ يكون } t = t_0 \text{ عندما}$$

$$\text{ومنه} \quad e^{-K} = \frac{\frac{\rho}{\lambda} - \frac{\rho}{\lambda} e^{-\lambda t_0}}{e^{-\lambda t_0}} = \frac{\rho}{\lambda}(e^{\lambda t_0} - 1) \text{ ، وبالتعويض في العلاقة (2) نجد}$$

$$N = \frac{\rho}{\lambda}(e^{\lambda t_0} - 1)e^{-\lambda t}$$

$$2 - \text{ ثابت التفكك : } \lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{0,69}{5600} = 1,23 \times 10^{-4} \text{ an}^{-1}$$

3 - إذا كان المقصود هو أن  $\frac{3}{4}$  من القيمة الابتدائية قد تفككت ، فهذا معناه أن الـ  $\frac{1}{4}$  من القيمة الابتدائية يتواجد في اللحظة  $t$  ، لأن :

$$N = N_0 - \frac{3}{4}N_0 = N_0 \left(1 - \frac{3}{4}\right) = \frac{N_0}{4}$$

نعوض في معادلة التناقص :  $\frac{N_0}{4} = N_0 e^{-\lambda t}$  ، ومنه  $\frac{1}{4} = e^{-\lambda t}$  ، وبإدخال اللوغاريتم النبيري على الطرفين نكتب

$$t = \frac{\ln 4}{\lambda} = \frac{1,38}{1,23 \times 10^{-4}} = 11201 \text{ ans} \text{ ، ومنه } -\lambda t = -\ln 4$$

$$\text{أو بما أن } N = \frac{N_0}{4} = \frac{N_0}{2^2} \text{ فإن } t = 2t_{1/2} = 5600 \times 2 = 11200 \text{ ans}$$

الزمن الموافق لـ 0,1 % من النشاط الابتدائي : لدينا  $A = A_0 e^{-\lambda t}$  (3)

$$\text{لدينا } A = \frac{0,1}{100} A_0 = \frac{A_0}{1000} \text{ ، وبالتعويض في العلاقة (3) نكتب } \frac{A_0}{1000} = A_0 e^{-\lambda t} \text{ ، ومنه } \frac{1}{1000} = e^{-\lambda t}$$

$$\text{بإدخال اللوغاريتم النبيري على الطرفين } -6,9 = -\lambda t \text{ ، ومنه } t = \frac{6,9}{1,23 \times 10^{-4}} = 56160 \text{ ans}$$

#### 4 - تصحيح السؤال 4 :

ما هي كتلة هذا النظير الموافقة لنشاط قدره  $3 \times 10^7 \text{ Bq}$  ؟ (يجب أن تعطى قيمة للنشاط وليس للكتلة) .

$$(4) \quad m = \frac{N(t) \times 14}{N_A}$$

$$\text{ولدينا } A = \lambda N \text{ ، وبالتعويض في العلاقة (4) نجد } m = \frac{A \times 14}{\lambda N_A} = \frac{3 \times 10^7 \times 14}{3,9 \times 10^{-12} \times 6,023 \times 10^{23}} = 1,8 \times 10^{-4} \text{ g}$$



في هذا الحساب حولنا  $\lambda$  لـ  $s^{-1}$  :  $\lambda = \frac{1,23 \times 10^{-4}}{365,25 \times 24 \times 3600} = 3,9 \times 10^{-12} s^{-1}$

الزمن اللازم لتفكك  $\frac{7}{8}$  من العينة ( أي يبقى  $\frac{1}{8}$  منها )

، ومنه  $N = \frac{N_0}{8} = \frac{N_0}{2^3}$  ،  $t = 3t_{1/2} = 3 \times 5600 = 16800 \text{ ans}$