

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

دورة: 2016

وزارة التربية الوطنية

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: رياضيات

اختبار في مادة: الرياضيات

المدة: 04 سا و 30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع الأول على 03 صفحات (من الصفحة 1 من 5 إلى الصفحة 3 من 5).

التمرين الأول: (04,5 نقطة)

النضاء منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

نعتبر النقط $H\left(\frac{5}{4}; \frac{7}{4}; -\frac{1}{2}\right)$, $E(0;1;1)$, $D\left(\frac{1}{2}; 2; -\frac{1}{2}\right)$, $C(-1;0;1)$, $B(2;-1;1)$, $A(1;1;0)$

و المستوي (P) المعرف بالتشكيل الوسيطى: $\begin{cases} x=1+\alpha+\beta \\ y=2-\alpha \\ z=-1+2\alpha-\beta \end{cases}$ و α و β وسيطان حقيقيان.

(1) أ) بين أن النقط A , B و C تُعين مستويا.

ب) تحقق أن الشعاع $\vec{H}(1;3;5)$ ناظمي للمستوي (ABC) ثم اكتب معادلة ديكارتية له.

(2) أ) اكتب معادلة ديكارتية للمستوي (P) ثم بين أن المستويين (ABC) و (P) متقاطعان.

ب) نسمي (Δ) مستقيم تقاطع المستويين (ABC) و (P) .

- تحقق أن النقط D تنتمي إلى المستقيم (Δ) و أن شعاع توجيه للمستقيم (Δ) .

ج) اكتب تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ) .

د) بين أن النقط H هي النقط العمودي للنقط A على المستقيم (Δ) ثم استنتج المسافة بين A و (Δ) .

(3) أ) مرجح الجملة المغلقة: $\{(A,2);(B,-3);(C,2)\}$.

نسمي (Γ) مجموعة النقط M من النضاء التي تحقق: $\overline{EM} \cdot \overline{GM} = 11$.

أ) عين إحداثيات النقط G .

ب) اكتب معادلة ديكارتية لمجموعة (Γ) ثم بين أنها سطح كرة يطلب تعيين مركزها و نصف قطرها.

ج) حدد الوضعية النسبية للمستوي (ABC) و المجموعة (Γ) .

التمرين الثاني: (04,5 نقطة)

(u_n) متتالية هذمية متزايدة تماما، حدودها موجبة تماما، حدّها الأول u_0 و أساسها q حيث: $\begin{cases} \ln(u_1) + \ln(u_2) = 11 \\ u_1 + u_2 = e^4(1+e^2) \end{cases}$

أ) احسب u_1 و u_2 ثم استنتج قيمة الأساس q .

ب) نضع: $u_1 = e^4$ و $u_2 = e^3$.

أ) غير عن u_n بدلالة n .

ب) نضع: $S_n = \ln(u_0) + \ln(u_1) + \ln(u_2) + \dots + \ln(u_n)$. احسب S_n بدلالة n .

(3) من أجل كل عدد طبيعي n نضع: $a_n = n+3$.

(أ) بين أن: $PGCD(2S_n, a_n) = PGCD(a_n, 14)$.

(ب) عين القيم الممكنة لـ: $PGCD(2S_n, a_n)$.

(ج) عين قيم الأعداد الطبيعية n التي من أجلها: $PGCD(2S_n, a_n) = 7$.

(4) ادرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n باقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 7.

(5) نضع: $b_n = 3na_n - 2S_n + 1437^{2016} + 1$.

عين قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون: $\begin{cases} b_n \equiv 0[7] \\ n \equiv 0[5] \end{cases}$.

(6) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، العدد $(1437^{9n+1} - 3 \times 4^{12n+1} + 52)$ يقبل القسمة على 7.

التمرين الثالث: (04,5 نقطة)

(1) أ) حل في مجموعة الأعداد المركبة \mathbb{C} المعادلة: $z^2 - 4z + 5 = 0$.

ب) استنتج حلول المعادلة ذات المجهول المركب z الزكية: $0 = (z-1+i(1-\sqrt{3}))^2 - 4z + 1 - 4i(1-\sqrt{3})$.

(2) θ عدد حقيقي حيث: $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ و z_0 عدد مركب طوله 1 و θ عمده.

(أ) اكتب العدد المركب $1+i\sqrt{3}$ على الشكل الأسّي.

(ب) عين θ علما أن: $\frac{z_0(1+i\sqrt{3})}{z_0} = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$ (z_0 مرافق العدد المركب z_0).

(ج) n عدد طبيعي، من أجل قيمة θ المتصل عليها، اكتب العدد المركب $\left[\frac{z_0(1+i\sqrt{3})}{2} \right]^n$ على الشكل الأسّي.

(د) عين قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون $\left[\frac{z_0(1+i\sqrt{3})}{2} \right]^n$ عددا حقيقيا موجبا تماما.

(3) المستوي المركب مضموب إلى المعلم المتعامد و المتجانس (O, \bar{u}, \bar{v}) . نعتبر النقط A, B, C التي لاحقاتها

على الترتيب: z_A, z_B, z_C حيث: $z_A = 2-i$ ، $z_B = 2+i$ و $z_C = 1+i\sqrt{3}$.

(أ) عين z_D لاحقة النقطة D مرجح الجملة المتكاملة $\{(A,1); (B,-1); (C,1)\}$.

(ب) استنتج أن الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع.

(ج) E النقطة من المستوي المركب ذات اللاحقة z_E حيث: $\begin{cases} \arg(z_E - z_A) - \arg(z_E - z_B) = \frac{\pi}{2} \\ \left| \frac{z_E - z_A}{z_E - z_B} \right| = 2 \end{cases}$.

- بين أن: $z_E = \frac{14}{5} + \frac{3}{5}i$.

- بين أن النقطة A هي صورة النقطة B بتشابه مباشر يطلب تعيين عناصره المميزة.

(4) M نقطة من المستوي المركب لاحقتها z ، النقطة I منتصف القطعة المستقيمة $[AB]$.

(أ) عين z_I لاحقة النقطة I .

(ب) α عدد حقيقي، نسمي (1) مجموعة النقط M من المستوي المركب التي تحقق: $z - z_I = e^{i\alpha}$.

- تحقق أن النقطة E تنتمي إلى المجموعة (Γ) .

- عين طبيعة المجموعة (Γ) و عناصرها المميزة عندما يتغير α في \mathbb{R} .

(I) $g(x) = 1 + x^2 + 2 \ln x$: $]0; +\infty[$ المجال على المعرقة على المجال $]0; +\infty[$: $g(x) = 1 + x^2 + 2 \ln x$.

(1) ادرس اتجاه تغير الدالة g .

(2) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل في المجال $]0,52; 0,53[$ حداً واحداً α .

(3) استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0; +\infty[$.

(II) $f(x) = -x + \frac{3 + 2 \ln x}{x}$: $]0; +\infty[$ المجال على المعرقة على المجال $]0; +\infty[$: $f(x) = -x + \frac{3 + 2 \ln x}{x}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

(2) (أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{-g(x)}{x^2}$.

(ب) شكل جدول تغيرات الدالة f .

(ج) تحقق أن : $f(\alpha) = 2\left(\frac{1}{\alpha} - \alpha\right)$ ثم عين حصراً له.

(3) (أ) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + x]$ ثم فسر النتيجة هندسياً.

(ب) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى مستقيمه المقارب المائل (Δ) .

(ج) بين أن (C_f) يقبل مماساً (T) بوازي (Δ) يطلب كتابة معادلة ديكارتية له.

(4) تقبل أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين قاصلتيهما x_0 و x_1 حيث :

$$0,22 < x_0 < 0,23 \quad \text{و} \quad 2,11 < x_1 < 2,13$$

أنشئ : (T) ، (Δ) و (C_f) .

(5) m بسيط حقيقي ، ناقش بواجباً و حسب قيم m ، عند حلول المعادلة : $3 + 2 \ln x - mx = 0$.

(III) من أجل كل عدد طبيعي n نضع : $u_n = \int_0^{\frac{1}{n}} [f(x) + x] dx$.

(1) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n > 0$.

(2) أعط تفسيراً هندسياً للحد u_0 .

(3) احسب u_n بدلالة n .

(4) نضع : $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$ احسب S_n بدلالة n .

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على صفتين (الصفحة 4 من 5 والصفحة 5 من 5).

التمرين الأول: (05 نقاط)

(1) الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر النقط $A(1;0;3)$ ، $B(1;2;4)$ ، $C(0;0;2)$ و $D(3;4;1)$.

(أ) عيّن العندين الحقيقيين α و β حتى يكون الشعاع $\vec{r}(2; \alpha; -\beta)$ ناظماً للمستوي (ABC) .
(ب) جد معادلة ديكرتية للمستوي (ABC) .

(2) $z = 2 \cdot x$ و $y = 2z - 2x - 4$ معادلتان ديكرتيتان للمستويين (P) و (Q) على الترتيب.
(أ) بين أن المستويين (P) و (Q) متعامدان.

(ب) أصط نميلاً وسطيلاً للمستقيم (Δ) تقاطع المستويين (P) و (Q) .
(ج) احسب المسافة بين النقطة D و المستقيم (Δ) .

(3) (S) سطح الكرة التي مركزها L و معيّن للمستوي (Q) .
(أ) اكتب معادلة ديكرتية لسطح الكرة (S) .

(ب) جد الطبيعة والعناصر المميزة لتقاطع (P) و (S) .

(4) λ عدد حقيقي، G_λ نقطة من الفضاء حيث: $2\vec{GA} - \vec{GB} + e^{\lambda} \vec{GC} = \vec{0}$ ، e يرمز إلى أسس اللوغاريتم الطبيعي).

(أ) عيّن (T) مجموعة للنقط M من الفضاء التي تحقق: $\|2\vec{MA} - \vec{MB} + e\vec{MC}\| = 2\|2\vec{MA} - \vec{MB} + e\vec{MC}\|$ (ب) مرجع الجملة $\{(A, 2); (B, -1)\}$ ، اكتب \vec{CG}_λ بدلالة \vec{CH} .

(ج) عيّن مجموعة النقط G_λ لما يتغير λ في المجموعة \mathbb{R} .

(د) جد قيمة λ التي تكون من أجلها G_λ منتصف القطعة $[CH]$.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

(1) حل في مجموعة الأعداد المركبة \mathbb{C} المعادلة: $z^2 - 2z + 2 = 0$.

(2) جد العندين المركبين z_1 و z_2 حيث: $\begin{cases} 2z_1 - 3z_2 = 5i\sqrt{2} \\ z_1 + 3z_2 = -2i\sqrt{2} \end{cases}$

(11) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ، النقط A, B, C, D و H لاحتائها على

الترتيب: $z_A = i\sqrt{2}$ ، $z_B = -i\sqrt{2}$ ، $z_C = 1+i$ ، $z_D = 1-i$ و $z_H = \frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}$ حيث E النقطة التي

تحقق: $\vec{DE} = 2\vec{DO}$.

(1) اكتب z_H على الشكل الأسّي و استنتج نوع المثلث BEC .

(2) تحويل نفطي في المستوي يرفق بكل نقطة M لاحتها z النقطة M' لاحتها z' حيث: $z' = z_A z + z_B$.

(أ) ما هي طبيعة التحويل S و ما هي عناصره المميزة ؟

(ب) احسب مساحة الدائرة (γ) التي مركزها C و نصف قطرها CD .

(ج) عيّن (γ') صورة (γ) بالتحويل S و استنتج مساحتها.

(3) عيّن (δ) مجموعة النقط M من المستوي (M) تختلف عن B و C ذات اللاحقات z التي يكون من أجلها

العدد $\frac{z_B - z}{z_C - z}$ حقيقياً سالباً تماماً.

التمرين الثالث: (04 نقاط)

- (I) أ) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n ، يواقي القسمة الإقليدية لكل من العددين 3^n و 7^n على 11.
 ب) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n : العدد $2 \times 2016^{5n+4} + 1437^{10n+1}$ مضاعف العدد 11.
 (2) نعتبر المعادلة (E) ذات المجهول $(x; y)$: $7x - 3y = 8$ ، حيث x و y عدنان طبيعيان.
 أ) حل المعادلة (E).
 ب) d القاسم المشترك الأكبر للعددين x و y حيث الثنائية $(x; y)$ حلا للمعادلة (E) .
 - ما هي القيم الممكنة للعدد d ؟
 .. عيّن الثنائيات $(x; y)$ حلول المعادلة (E) من أجل $d = 4$.
 ج) جد الثنائيات $(x; y)$ حلول المعادلة (E) التي تحقق : $2016^{7x} + 1437^{3y} = 0[11]$.

التمرين الرابع: (07 نقاط)

- (I) 1) φ انالة العددية المعرفة على \mathbb{R} كما يلي : $\varphi(x) = (x^2 - x + 1)e^{-x+1} - 1$
 أ) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x)$.
 ب) ادرس اتجاه تغير الدالة φ ثم شكّل جدول تغيراتها.
 (2) بين أن المعادلة $\varphi(x) = 0$ تقبل في \mathbb{R} ، حلًا α يختلف عن 1 ثم تحقق أن : $2,79 < \alpha < 2,80$.
 (3) استنتج إشارة $\varphi(x)$ على \mathbb{R} .
 (II) f و g اندالتان العدديتان على \mathbb{R} كما يلي : $f(x) = (2x-1)e^{-x-1}$ و $g(x) = \frac{2x-1}{x^2-x+1}$.
 أ) (C_f) و (C_g) تمثيلاهما البيانيان في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
 أ) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
 ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
 (2) بين أن للمنحنيين (C_f) و (C_g) مماسًا مشتركًا (T) في النقطة ذات انفاصلة 1 ثم جد معادلة له.
 (3) ارسم المماس (T) و المنحني (C_f) .
 (4) أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f(x) - g(x) = \frac{(2x-1)\varphi(x)}{x^2-x+1}$.
 ب) ادرس إشارة الفرق $f(x) - g(x)$ على \mathbb{R} ثم استنتج الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (C_g) .
 ج) باستعمال مكاملة بالتجزئة ، احسب بدلالة العدد الحقيقي x : $\int_1^x f(t) dt$.
 د) احسب مساحة الحيز المستوي المحدّد بالمنحنيين (C_f) و (C_g) و المستقيمين اللذين معادلتهما : $x=1$ و $x=2$.
 (III) 1) احسب $f''(x)$ ، $f^{(3)}(x)$ و $f^{(4)}(x)$. أعط تخمينًا لعبارة $f^{(n)}(x)$ حيث n عدد طبيعي غير معلوم.
 ($f^{(n)}$ الدالة المشتقة من المراتبة n للدالة f)
 (2) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معلوم n : $f^{(n)}(x) = (-1)^n [2x - (2n+1)] e^{1-x}$.
 (3) (u_n) المتتالية العددية المعرفة من أجل كل عدد طبيعي غير معلوم n : كما يلي : $u_n = f^{(n)}(1)$.
 أ) احسب بدلالة العدد الطبيعي غير المعلوم k ، المجموع : $u_k + u_{k-1}$.
 ب) استنتج بدلالة n ، المجموع : $u_1 + u_2 + \dots + u_{2n}$.

انتهى الموضوع الثاني